



Harmonix®

Pasta

RODENTICIDA



Cebo listo para su uso para el control de ratas y ratones



Isco pronto a usar no controlo de ratos e ratazanas

Composición:

Colecalciferol 0,077 (% p/p) – técnico
..... 0,075 (% p/p) – puro

Registrado en el R.O.B con el n° – ES/MR(NA)-2020-14-00720

5 kg e

Composição:

Colecalciferol 0,077 (% p/p) – técnico
..... 0,075 (% p/p) – puro

Autorização de venda N° PT/DGS mrp-48/2021

Harmonix Pasta es un cebo listo para su uso para el control de diferentes tipos de ratas y ratones (ratón doméstico, rata parda, rata negra) **por personal profesional especializado**.

Se utiliza como método de control de uso profesional en espacios tales como:

- Interior.
- Exterior: Alrededor de edificaciones.
- Exterior: Espacios abiertos y vertederos de residuos.

Instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Recomendaciones generales (traducción del SPC acordado entre EE MM):

En caso de:

- Exposición cutánea, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente; tener a mano la etiqueta o el envase y consultar al **SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** (Teléfono 91 562 04 20). Contactar con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota [incluir información específica del país].

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

• Peligroso para la fauna salvaje.

Instrucciones de uso:

Generales:

- Leer y seguir la información del producto, así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.
- El producto debe ser usado exclusivamente como parte de un plan integral de control de plagas, que incluya, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control.
- Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras.
- Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.
- No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
- Los portacebos deben estar claramente etiquetados indicando que contienen rodenticidas y que no deben ser movidos o abiertos (ver sección 5.8, para consultar la información que se debe incluir en la etiqueta).
- Durante el uso del producto no se debe comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.
- Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación de cebo.
- **Harmonix Pasta** no deberá utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento. Si después de un período de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida anticoagulante. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa.

• Cebo embolsado: **No abrir la bolsa** que contiene el cebo.

- Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilizar guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.

• El producto contiene un agente amargante y un colorante.

Instrucciones para la eliminación segura del producto y del envase:

- Al final del tratamiento, desechar el cebo no ingerido y el envase de acuerdo con la normativa local.

Almacenamiento y conservación:

- Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de la luz.
- Mantener alejado de los niños, pájaros y animales de compañía y granja.

Etiquetado de portacebos

En caso de:

Exposición cutánea, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. Exposición ocular, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos. Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente; tener a mano la etiqueta o el envase y consultar al **SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** (Teléfono 91 562 04 20). Contactar con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota. Peligroso para la fauna salvaje.

Dosis y modo de empleo

Se aplica el cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación.

Para ratas:

100-200 g de cebo por punto de cebado, en función del nivel de infestación. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 10-20 metros lineales (en caso de baja infestación) y de 3-10 metros lineales (en caso de alta infestación).

Se debe añadir una cantidad de 200 g de producto cuando el cebo se haya consumido totalmente entre los intervalos de control.

Para ratones:

20 g de cebo por punto de cebado, en función del nivel de infestación. Si se necesita utilizar más de un portacebo, la distancia mínima entre portacebos será de 5-20 metros lineales (en caso de baja infestación) y de 2-5 metros lineales (en caso de alta infestación).

Se debe añadir una cantidad de 20 g de producto cuando el cebo se haya consumido totalmente entre los intervalos de control.

Instrucciones de uso específicas para:

Interiores

Realizar un estudio previo al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determinar la causa y la extensión de la infestación. El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...). Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebo.

Alrededor de edificios, espacios abiertos y vertederos de residuos

Colocar los puntos de cebado en áreas no sujetas a inundaciones. Rellenar los puntos de cebado que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Realizar un estudio previo al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determinar la causa y la extensión de la infestación.

El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...). Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebo.

Elementos adicionales que deben tenerse en cuenta para la aplicación directa en madrigueras:

Los cebos deben colocarse de modo que se minimice la exposición a especies no objetivo y a niños. Cubrir o bloquear las entradas de las madrigueras con cebo para reducir los riesgos de que se rechace o se derrame el cebo.

Medidas de mitigación de riesgo específicas para:

Interiores y alrededor de edificios

No usar el producto en tratamientos de cebado por pulpos.

No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa. No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebado cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.

espacios abiertos y vertederos de residuos

Buscar y desechar los roedores muertos del área infestada en cada visita para evitar el envenenamiento secundario. Al inicio de la campaña, revisar los puntos de cebado como máximo cada 1-2 días, y al menos una vez a la semana posteriormente. Lo mismo se aplica a las campañas de cebado con una duración superior a 35 días.

No usar este producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. No usar este producto en tratamientos de cebado por pulpos. No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa. No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebado cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones.

Advertencias al Usuario: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

4.

Harmonix Pasta es un isco rodenticida de uso profesional, pronto a usar no control de diferentes especies de ratos e ratazanas (rato doméstico, ratazana cinzenta e preta).

Utiliza-se em espaços como:

- Interior de habitações e edifícios de escritórios, armazéns, etc.
- Exterior: Em redor de edificações.
- Exterior: Espaços abertos e estações de tratamento de lixo.

Efeitos diretos ou indiretos prováveis. Instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente:

1) Em caso de:

- Exposição cutânea, lavar a pele com água e, em seguida, com água e sabão.
- Exposição ocular, enxaguar os olhos com uma solução de lavagem ocular ou água, manter as pálpebras abertas durante pelo menos 10 minutos.
- Exposição oral, enxaguar a boca cuidadosamente com água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Se o produto for engolido, procurar assistência médica de imediato e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto. Contactar um médico veterinário em caso de ingestão por um animal.

2) As estações de isco devem estar identificadas com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém um rodenticida"; "nome do produto"; "substância(s) ativa(s)" e "em caso de incidente, contactar um centro antivenenos (CIAP 800 250 250).

3) Perigo para a vida selvagem.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGAR PARA O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: CIAP – Tel. 800 250 250

Instruções de utilização

- Leia e siga as informações do produto, assim como quaisquer informações que acompanham o produto ou que sejam fornecidas no ponto de venda antes de o utilizar.
- O produto só deve ser utilizado como parte de um sistema de gestão integrada de pragas (GIP), incluindo, entre outras, medidas de higiene e, quando possível, métodos físicos de controlo.
- Quando possível, as estações de isco devem ser presas ao chão ou a outras estruturas.
- Manter o produto fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação e animais de criação e outros animais não alvo.
- Manter o produto afastado de alimentos, bebidas e rações de animais, bem como de utensílios ou superfícies que estejam em contacto com os mesmos.
- As estações de isco devem estar claramente identificadas de forma a mostrar que contém rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas.
- Não comer, beber ou fumar enquanto estiver a usar o produto. Lavar as mãos e a pele diretamente exposta após utilizar o produto.
- Se a ingestão do isco for baixa em relação ao tamanho aparente da infestação, considerar a substituição das estações de isco em locais e a possibilidade de mudar para outra fórmula de iscos.
- Se após um período de tratamento de 35 dias os iscos continuarem a ser consumidos e não for observada uma diminuição na atividade de roedores, terá de ser determinada a causa provável. Se tiverem sido excluídos outros elementos, é provável que existam roedores resistentes, por isso deve ser considerada a utilização de um rodenticida (anticoagulante), ou de raterais com uma medida de controlo alternativa.
- Para o rótulo e/ou o folheto, o titular da autorização tem de especificar como é que o equipamento (p.ex. caixas de isco) deve ser limpo e como é que os resíduos dos iscos devem ser recolhidos. Os métodos recomendados devem conduzir a uma exposição mínima.
- Isco em saquetas: Não abrir as saquetas que contém o isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não toque nos roedores mortos com as mãos nuas, use luvas ou ferramentas, como pinças, quando os estiver a eliminar.
- O produto contém um agente amargante e um corante.

Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

- 1) No fim do tratamento, eliminar o isco não consumido e a embalagem em conformidade com os requisitos locais.
- 2) Evitar o contacto com a pele quando eliminar os restos dos iscos.

Armazenamento e conservação:

- 1) Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e afastada da luz direta do sol.
- 2) Armazenar em locais que impeçam o acesso de crianças, pássaros, animais de estimação e animais de criação.
- 3) Manter afastado de alimentos, bebidas e rações de animais.

Rotulagem das caixas porta-isco

Em caso de:

Exposição cutânea, lavar a pele com água e em seguida com água e sabonete. Exposição ocular, enxaguar os olhos com solução apropriada ou com água. Manter os olhos abertos pelo menos 10 minutos. Exposição oral, lavar a boca cuidadosamente com água. Não administrar nada por via oral a uma vítima inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico. Consultar o Centro Antivenenos (CIAP) Tel. 800 250 250. Ter à mão o rótulo ou a embalagem. Contactar um veterinário no caso de ingestão por animais domésticos. Perigoso para a fauna selvagem.

Dosagem e modo de emprego:

Isco pronto a usar em estações de iscos invioláveis.

Para ratazanas:

100-200 g de isco por ponto de isco, dependendo do nível de infestação. Se for necessária mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre estações de isco deve ser de 10-20 metros lineares (no caso de uma infestação baixa) e de 3-10 metros lineares (no caso de uma infestação alta). Tem de ser adicionada uma quantidade de 200 g do produto sempre que o isco for totalmente consumido dentro de um intervalo de controlo.

Para ratos:

20 g de isco por ponto de isco, dependendo do nível de infestação. Se for necessária mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre estações de isco deve ser de 5-20 metros lineares (no caso de uma infestação baixa) e de 2-5 metros lineares (no caso de uma infestação alta). Tem de ser adicionada uma quantidade de 20 g do produto sempre que o isco for totalmente consumido dentro de um intervalo de controlo.

Instruções de uso específicas para:

Tratamentos em interiores

Antes do tratamento monitorizar e avaliar a área infestada para identificar as espécies de roedores presentes, a sua atividade e determinar causas e extensão da infestação. O produto deve ser aplicado próximo dos lugares onde se observou a atividade dos roedores (carreiros, tocas, pontos de comida, buracos, ninhos, etc). Os iscos devem estar fixos para evitar a sua mobilização.

Tratamentos em redor de edifícios, espaços abertos e áreas de tratamentos de lixo.

Colocar os pontos de iscagem em áreas não sujeitas a alagamento/inundações. Substituir as caixas ratagem que tenham sido danificadas pela água ou contaminadas pela sujidade. Antes do tratamento monitorizar e avaliar a área infestada para identificar as espécies de roedores presentes, a sua atividade e determinar causas e extensão da infestação. O produto deve ser aplicado próximo dos lugares onde se observou a atividade dos roedores (carreiros, tocas, pontos de comida, buracos, ninhos, etc). Os iscos devem estar fixos para evitar a sua mobilização.

Para aplicação direta em ninhos, a colocação dos iscos deve ter em conta a não exposição a crianças e espécies não objetivo.

Cobrir ou bloquear as entradas dos ninhos tratados para reduzir o risco de rejeição ou derrame do isco.

Medidas de mitigação de risco específicas para:

Interiores e em redor de edifícios

Não usar o produto em tratamentos de dose única (impulso). Não utilizar em áreas onde se suspeite existir resistência à substância ativa. Não lavar as caixas porta-isco e outros utensílios utilizados nos pontos de iscagem cobertos ou protegidos, com água entre as aplicações.

Espacos abertos e áreas de tratamentos de lixo

Recolher e eliminar os roedores mortos em cada visita, para evitar envenenamento secundário. No início da campanha de tratamento verificar os pontos de iscagem a cada 1-2 dias no máximo, e pelo menos uma vez na semana subsequente. O mesmo se aplica nas campanhas com duração superior a 35 dias. Não usar **Harmonix Pasta** como isco permanente o para detetar a atividade de roedores. Não utilizar este produto em tratamentos por impulso (dose única). Não utilizar em áreas onde se suspeite de resistências à substância ativa. Não lavar as caixas porta-isco e outros utensílios utilizados nos pontos de iscagem cobertos ou protegidos, com água entre as aplicações.

Advertencia ao utilizador: Os resultados da aplicação deste produto, são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

Inscrito y distribuido por: Bayer CropScience S.L.

Avda. Baix Llobregat, 3-5
08970 – Sant Joan Despí (Barcelona) - España
Tel.: 93 228 40 00

Nº de Lote y fecha de fabricación: ver marcaje en el envase
Fecha de caducidad – 3 años después de la fecha de fabricación

UF: TD41-004K-T00W-CJ4Y

Registrado e distribuido por: Bayer CropScience (Portugal),

Produtos para a Agricultura, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 CARNAXIDE
Telefone: 21 4172121

Lote e data de fabrico: marcados na embalagem.
Data de validade: 3 anos após a data de fabrico.

EUS87357775A - Ed.0721

Bayer