

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**PRECAUCIONES:**

- Evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel.
- No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
- No fumar, beber, ni comer durante la aplicación.
- No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.
- No volver a utilizar los envases vacíos.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.
- Destruya los envases vacíos.
- Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
- En caso de intoxicación, concorra al médico llevando esta etiqueta.
- Mujeres embarazadas no pueden manipular, ni exponerse al raticida.
- Materia fecal del roedor puede contener raticida, por tanto debe realizarse limpieza permanente del lugar desratizado.

**USOS:** Restaurantes, casas, edificios, hoteles, hospitales, escuelas, barcos, aviones, micros, salones en general, fabricas, galpones, parques, instalaciones deportivas, alcantarillados, orillas de acequias.

**SENASA:** Argentina autoriza el uso exclusivamente para los exteriores de los departamentos, para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de ciberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, huesos y harinas incomedibles, depósitos de comestibles cuando se encuentren vacíos.

**PLAGAS QUE CONTROLA:** Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), Rata del tejado (*Rattus rattus*), Rata gris (*Rattus norvegicus*), Rata alejandrina (*Rattus variegatus alexandrinus*), Ratones de campos (*Akodon spp.*; *Oryzomys spp.*; *Holochilus spp.*).

**RECOMENDACIONES DE USO:** Rodilon Bloque Extrusado es un rodenticida anticoagulante monodósico, listo para usar. Con una sola ingestión, elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

**PRECAUCIONES GENERALES DE USO:** Este producto es tóxico para todos los mamíferos incluso el hombre. Los roedores deberán ser enterrados. Eliminar los restos del producto en forma segura. Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Los profesionales que manipulen este producto deben utilizar ropa de protección y guantes impermeables.

**MODO DE EMPLEO:** Colocar los cebos donde se observen signos de presencia (excrementos, manchas grasosas, pelos, pisadas); en la vecindad de las madrigueras y sitios de tránsito. Mantener interrumpida la cantidad de cebo hasta que no se evidencien signos de presencia. Colocar el cebo dentro de tubos o cajas cebaderas que permitan el acceso exclusivo a los roedores y sean inaccesibles para niños y mascotas. Se recomienda fijar los bloques a través de su orificio central por medio de alambres a fin de evitar pérdidas por acarreo. Para prevenir nuevas invasiones mantener cebaderos en forma permanente.

**DOSIFICACIÓN:** Ratas: colocar de 3 a 5 bloques cada 4 - 10 m lineales (dependiendo de la infestación presente). Ratones colocar de 1 a 2 bloques cada 2 - 4 m² (dependiendo de la infestación presente).

**SEGURIDAD:** Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:** DL 50 oral ratas > 5000 mg/kg - DL 50 dermal ratas > 2000 mg/kg  
Irritación de la piel en conejos: no irritante. No sensibilizante dermal.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos -perros, gatos, otros- (inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo). No se debe contaminar los cursos de agua.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE:** Colóquelo en la basura domiciliaria o entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Los anticoagulantes monodósicos de acción prolongada pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación de tiempos de protombina, con una duración de hasta 20 a 30 días después de la exposición al raticida. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. En caso de ingestión no provoque el vómito. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el médico profesional interviniente. No administrar nada por vía oral, especialmente si el paciente se encuentra inconsciente. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA:** Clase III

**Nombre común:** difethialone

**ADVERTENCIA AL MÉDICO:** Clasificación química: cumarina. Contiene el anticoagulante monodósico difetialone. Administrar vitamina K1. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** **Argentina:** Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; **CABA:** Hospital Escuela "José de San Martín"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor María Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; **Rosario:** Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; **Rosario:** Centro Toxicológico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; **Cordoba:** Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; **Cordoba:** Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; **Mendoza:** Hospital Central: (0261) 385 5509; **CABA:** Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; **CABA:** Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; **Hospital Italiano:** 11 4959 0200; **Cordoba:** Hospital de Niños: (0351) 458 6400; **Neuquen:** Hospital Regional: (0299). **Uruguay:** C.I.A.T. (Hospital de clínicas 7° piso) Tel: (02) 1722.

**GARANTÍA:** Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

**Uruguay:**  
Reg.M.S.P.N° 73623; Reg.IMM S de S.P.N°144  
Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.  
Magallanes 1910, CP.11800  
Tel:29245321  
Montevideo, Uruguay  
maisor@maisor.com.uy

**Argentina:**  
R.N.P.U.D. N° 0520003  
SENASA C-2541  
Importado y distribuido por:  
2022 Environmental Science Ar SA Legajo DM N°33  
Juana Manso 205, 7° piso, Buenos Aires, Argentina.  
TEL: 08003451957.  
www.ar.envu.com



AR-80951728a

**Ratas y Ratones**



Origen: Estados Unidos

Legajo DM N°33  
2022 Environmental Science Ar SA  
Importado y distribuido por:

R.N.P.U.D. N°: 0520003

Reg.M.S.P.N° 73623; Reg.IMM S de S.P.N° 144

Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.

Magallanes 1910, CP.11800  
Tel:29245321  
Montevideo, Uruguay  
maisor@maisor.com.uy

**Contenido Neto: 1 kg**

Lote N°:

Vto:

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

**SOLO UTILIZAR EN CAJAS CEBADERAS EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO.**

**ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO**

**PROHIBIDA LA VENTA LIBRE**

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**

**Difethialone** ..... 0,0025 g

denatoniun, saborizantes, antioxidante, c.s.p. .... 100 g



**Rodenticida - Raticida**

**RODILON®**

**Bloque Extrusado**



**Rodenticida  
Raticida**

**RODILON®**  
Bloque Extrusado