

PRECAUCIONES:
CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN U ABSORCIÓN POR LA PIEL

No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios. No fumar, beber ni comer durante la aplicación. No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

No volver a utilizar los envases vacíos. Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales. En caso de intoxicación, concurra al médico llevando esta etiqueta.

Mujeres embarazadas no pueden manipular ni exponerse al raticida.

Materia fecal del roedor puede contener raticida, por lo tanto debe realizarse limpieza permanente del lugar desratizado.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO: Este producto es tóxico para todos los mamíferos, incluso el hombre. Los roedores deberán ser dispuestos según la normativa vigente. Eliminar los restos del producto en forma segura. Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Usar guantes, máscara y protección ocular.

RIESGOS AMBIENTALES: Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos - perros, gatos, otros - (inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo).

No contaminar fuentes de agua.

ALMACENAMIENTO: Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

PRIMEROS AUXILIOS: Los anticoagulantes monodósicos de acción prolongada pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación de tiempos de KT, con duración de hasta 20 a 30 días después de la exposición al raticida. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el medico profesional interviniente. En caso de ingestión no provoque el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Clase IV.
Nombre comun: Difetialone.

ADVERTENCIA AL MEDICO: Clasificacion quimica: Cumarina.

Contiene el anticoagulante monodosico Difetialone. Administrar vitamina K1. El monitoreo de tiempo protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs y retirarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicologo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Argentina:
RNPUD N° 0520002 SENASA C-2542
Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science AR S.A.
Legajo N° DM 33, 205 Juana Manso 205, 7° piso, Buenos Aires, Argentina. TEL: 08003451957.
www.cr.envu.com

Uruguay:
Reg.M.S.P.N° 57064; Re.IMM S de S.P.N°130
Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.
Magallanes 1910, CP.11800, Tel:29245321, Montevideo, Uruguay
maisor@maisor.com.uy

RECOMENDACIONES DE USO: Rodilon® Pellet es un rodenticida anticoagulante monodósico listo para usar. Con una sola ingestión controla ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y de ese modo sus congéneres no recelan el alimento.

USOS: Restaurantes, casas, edificios. hoteles, hospitales, escuelas, barcos, aviones, micros, salones en general fábricas, galpones, parques , instalaciones deportivas, alcantarillados, orlas de acequias, canales, corrales, establos y studes (caballerizas). Cuando se encuentren vacíos.

PLAGAS QUE CONTROLA: Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), Rata del tejado (*Rattus rattus*), Rata gris (*Rattus norvegicus*), Rata alejandrina (*Rattus variedad alexandrinus*), Ratones de campo (*Akodon* spp.; *Oryzomys* spp.; *Holochilus* spp.) **FORMA DE USO:** Colocar los pellets (cebo) dentro de cajas cebadoras de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser inviolables y proteger el cebo de condiciones ambientales.

DOSIFICACIÓN: Ratas: colocar de 25 a 50 g cada 4 a 10 m lineales (dependiendo de la infestación presente). Ratones: colocar de 10 a 25 g cada 2-4 metros lineales (dependiendo de la infestación presente).

SEGURIDAD: Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicionen la presencia del raticida en el ambiente.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DL 50 oral ratas > 5000 mg/kg
DL 510 dermal ratas > 2000 mg/kg
Irritación de la piel en conejos: leve irritante.
No sensibilizante dermal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:


Argentina: Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; **CABA:** Hospital Escuela "José de San Martín"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor María Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; **Rosario:** Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicológico IAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; **Cordoba:** Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Cordoba: Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; **Mendoza:** Hospital Central: (0261) 385 5509; **CABA:** Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; **CABA:** Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; **Cordoba:** Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquen: Hospital Regional: (0299).
Uruguay: C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7° piso) Tel: (02) 1722.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Environmental Science U.S. LLC., 5000 CentreGreenWay,
Suite 400, Cary, NC 27513.
Envu y su logo son marcas comerciales
propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.
©2022 Environmental Science U.S. LLC

AR-008E2114a



Rodenticida

Pellets

RODILON®



Rodenticida

RODILON®
Pellets

1.5"

10.75" PACKAGE LENGTH (BACK)

9.25" FILLABLE CAVITY

1"

2" BOTTOM GUSSET

1"

23.5" CUT WEB

25" WEB WITH

9.25" FILLABLE CAVITY

10.75" PACKAGE LENGTH (FRONT)

1.5"