



FICHA TÉCNICA

Resumen del producto

Rodilon® Bloque Extrusado por su formulación exclusiva presenta mayor cantidad de componentes atrayentes y menor cantidad de parafina, brindando más atracción y palatabilidad para los roedores. El bloque tiene más dureza que se traduce en una mayor resistencia a la humedad, al moho e incrementa también la resistencia a la temperatura especialmente en los meses de verano dentro de cajas cebaderas.

Composición	Difetialone: 0,0025 %
Uso	Profesional
Preventivo Ingesta Humana	CONTIENE AMARGANTE QUE EVITA LA INGESTIÓN ACCIDENTAL EN HUMANOS
Antídoto	Vitamina K1
Formulación	Bloque Extrusado
Registro SENASA-CAPA y ANMAT	N° C-2541 y N° 0520003
Clase Toxicológica	III
Formato (Presentación)	Bolsa por un kilo (66 – 67 BB)

Modo de Acción

Anticoagulante monodósico por ingestión bloqueando la acción de la vitamina K1, listo para usar: con una ingestión controla ratas y ratones a partir del cuarto/quinto día de consumido. La muerte del roedor se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y, de este modo sus congéneres no recelan el cebo. La mayoría de las veces el roedor muere dentro de la madriguera.

Plagas que controla

Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), Rata del tejado (*Rattus rattus*), Rata gris (*Rattus norvegicus*), Rata alejandrina (*Rattus variedad alejandrinus*), Ratones de campo (*Akodon* spp.; *Holochylus* spp.).

Modo de Uso

1. Ratas: Colocar 3 a 5 Bloques extrusados cada 4-10 metros lineales (dependiendo de la infestación presente) Ratones: colocar 1 a 2 bloques extrusados cada 2 a 4 metros cuadrados (dependiendo de la infestación presente. Colocar los cebos donde se observen signos de presencia (excrementos, manchas grasosas, pelos y pisadas) en la vecindad de las madrigueras y sitios de tránsito.
2. Se recomienda al comienzo del tratamiento efectuar un cebado con gran cantidad de bloques, para luego ir reduciendo los mismos a medida que disminuye la población de roedores.
3. Utilizar cajas cebaderas para que el roedor se sienta protegido cuando come y así proteger la vida útil del rodenticida (especialmente en exteriores) y no permitir que niños, personas inexpertas o animales domésticos lleguen al cebo.
4. Dependiendo de la infestación presente, verificar el estado de los cebos cada 7 a 15 días, reponer los que fueron consumidos.
5. Se deben mantener puntos de cebado permanente como elementos preventivos.
6. Para mantener una atracción permanente, se sugiere en planes preventivos, el recambio total de los cebos cada 2 - 3 meses.

Recomendaciones pre - aplicación

Importante trabajar en todos los puntos referidos a prevención en el Manejo Integrado de Plagas (M.I.P): exclusión (principalmente retirar comida alternativa y fuentes de agua), higiene, orden y mantenimiento.

Recomendaciones en la aplicación

- Los profesionales que manipulen los cebos deben utilizar ropa de protección y guantes ya que los cebos deben manipularse con los mismos.
- No comer, beber, ni fumar durante la instalación de los cebos.
- Mantener fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos.

Recomendaciones post - aplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Este producto es tóxico para aves, peces, perros, gatos y humanos; inclusive si se alimentan de roedores que han consumido el cebo.
- No tocar los roedores, excrementos, ni orina con las manos, utilizar siempre guantes.
- La disposición final de los roedores controlados debe seguirse según la normativa local.
- Eliminar los restos del producto en forma segura.
- Destruya los envases vacíos, evitando su reciclado.
- Eliminar roedores muertos y sus excrementos ya que pueden tener restos del rodenticida.

Intervalo entre aplicaciones

Verificar el estado de los cebos cada 7 a 15 días, reponer los que fueron consumidos.

Efecto Rodenticida

La muerte del roedor es causada por hemorragias internas y se produce de tres a diez días de la ingestión, no apareciendo síntomas durante 24 horas. Rara vez, en caso de presentarse síntomas, se puede observar sangrado de nariz o ano.

Seguridad

- Informar a los usuarios de las instalaciones sobre la implementación del plan preventivo / control de roedores, las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito.
- Advertir a los usuarios con animales domésticos (u otros) sobre las intoxicaciones primarias (comer el cebo) o secundarias (comer el roedor muerto) que causan los rodenticidas anticoagulantes.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicionen la persistencia del raticida en el ambiente.

Riesgos ambientales

Evitar que restos de la composición del cebo queden esparcidos sobre la zona tratada.

Almacenamiento

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños, mascotas y personas inexpertas.

Primeros Auxilios

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental no provocar el vómito; acudir inmediatamente al médico toxicólogo llevando la etiqueta, o esta ficha técnica. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el médico interviniente. No administrar nada por vía oral, especialmente si el paciente se encuentra inconsciente.

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Si entra en contacto con la piel o la ropa, retire la ropa contaminada y enjuague la piel con agua durante 15 minutos. Causa irritación moderada.

Consultas en Caso de Intoxicación

Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102;
CABA: Hospital Escuela "José de San Martín"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; La Plata: Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor María Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; Rosario: Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicológico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Córdoba: Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; Mendoza: Hospital Central: (0261) 385 5509; CABA: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; Córdoba: Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquén: Hospital Regional: (0299) 44-90800/44-90890.

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Argentina por: 2022 Environmental Science AR SA.

envu®



+0800 345 1957



www.ar.envu.com



@envuprofesional



controlprofesional@envu.com

Titular Registro:

Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales.
©2024. Environmental Science U.S. LLC. Avenida Corrientes 800, Piso 39°, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Código Postal: C1008