TEMPRID® SC



FICHA TÉCNICA

Resumen del Producto

Temprid SC® combina dos principios activos exclusivos con la tecnología Envu®, que actúan de manera simultánea sobre el sistema nervioso del insecto. Esta acción dual permite un control eficaz y sostenido, resultando fundamental para el manejo de resistencia y su incorporación en programas de rotación de productos.

Composición	Imidacloprid 21%- Beta-Ciflutrina 10,5%
Uso	Profesional
Denominación	Insecticida Residual para Rastreros y Voladores
Formulación	Suspensión Concentrada
Registro SENASA-CAPA y ANMAT	N° C-2471 y N° 0520009
Clase Toxicológica	II
Formato (Presentación)	250 cm^3

Modo de Acción

Por contacto e ingestión, a nivel de sistema nervioso central.

TEMPRID® SC

Plagas que controla

Plagas	Dilución cm^3 Temprid en 1 litro agua	Rendimiento frasco 250 cm^3
Cucarachas *Blattella sp. Periplaneta sp.*	2	*2500 m^2*
Garrapata *Amblyomma sp.*	4	*1250 m^2*
Pulga *Ctenocephalides sp.*	4	*1250 m^2*
Araña *Loxosceles sp.*	4	*1250 m^2*
Mosca *Musca domestica*	4	*1250 m^2*
Mosquitos *Culex sp. Aedes aegypti*	4	*1250 m^2*
Hormigas Invasoras de Int. *Monomorium sp.*	2	*2500 m^2*
Chinches de la Cama *Cimex sp.*	2	*2500 m^2*
Pescadito de Plata *Lepisma sp.*	2	*2500 m^2*
Hormiga de la Madera *Camponotus sp.*	4	*1250 m^2*

envu®

TEMPRID® SC

Modo de Uso

- Agitar el frasco
- Utilizar la dosis correcta dependiendo de la plaga y la cantidad de emulsión a preparar.
- Pulverizar las superficies previamente identificadas. Interiores: zócalos, rejillas cajones, alacenas, bajo mesadas, pisos, paredes, muebles. Exteriores: paredes, zócalos, pasto y arbustos perimetrales.
- Para el control de insectos voladores en exteriores establecer los horarios de mayor actividad de los mismos. Ej: Mosquitos, en exteriores efectuar los tratamientos temprano por la mañana (5 a 8 h) o por la tarde (18 a 21 h). Y en interiores, efectuar los tratamientos durante todo el día.

Recomendaciones pre - aplicación

Mediante el monitoreo de plaga Identificar los posibles lugares a tratar.
Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto.
Retirar todo tipo de alimentos.

Recomendaciones en la aplicación

Durante la aplicación solo el operario estará presente en el lugar a tratar.
Preferentemente usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara
No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.

Recomendaciones post - aplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
- Dejar transcurrir un lapso mínimo de aproximadamente 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.
- Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad ancianos, alérgicos y asmáticos.
- Prolongar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales domésticos tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc.
- No lavar las superficies aplicadas durante 3 a 10 días posteriores a la aplicación

Intervalo entre aplicaciones

Cada 10 - 20 a 30 días dependiendo de la infestación presente.

Efecto Insecticida

El efecto insecticida de Temprid® SC comenzará inmediatamente después de aplicarse.

envu®

TEMPRID® SC

Seguridad

No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas), entre otros.

Riesgos ambientales

Evitar que entre en contacto con las aguas superficiales, alcantarillado y aguas subterráneas.

Almacenamiento

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños, personas inexpertas y mascotas.

Primeros Auxilios

- En caso de ingestión accidental, concurrir al médico llevando este prospecto y el envase.
- Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos, en piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Si se inhala el olor en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.
- En piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos.

TEMPRID® SC

Consultas en Caso de Intoxicación

Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; CABA: Hospital Escuela "José de San Martin"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; La Plata: Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor Maria Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; Rosario: Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicológico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; Cordoba: Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Cordoba: Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; Mendoza: Hospital Central: (0261) 385 5509; CABA: Hospital de Niños Ricardo Gutierrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; Cordoba: Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquén: Hospital Regional: (0299) 44-90800/44-90890.

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Argentina por: 2022 Environmental Science AR SA.

envu®

+0800 345 1957

@envuprofesional

www.ar.envu.com

controlprofesional@envu.com

Titular Registro:
Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales.
©2024. Environmental Science U.S. LLC. Avenida Corrientes 800, Piso 39°, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Código Postal: C1008.