



FICHA TÉCNICA

Resumen del producto

Starycide® SC es un nuevo concepto en insecticidas - larvicidas que tiene como ingrediente activo Triflumurón. Después de la absorción por el insecto, el Triflumurón interfiere en la producción de quitina (piel de la larva) y produce disturbios en las mudas; causando la muerte del mismo.

La cutícula tiene una extensibilidad limitada, por eso los insectos deben cambiarla (la muda) regularmente mientras van creciendo.

Composición	Triflumurón 39% p/p
Uso	Profesional
Usos	Insecticida, Larvicida y Ninficida
Antídoto	No existe antídoto específico
Formulación	Suspensión Concentrada
Registro SENASA-CAPA	N° P-917/21
Registro ANMAT	N° 250008
Clase Toxicológica	IV
Formato (Presentación)	250 cm ³

Modo de Acción

Starycide® SC es un regulador del crecimiento de insectos, (IGR por sus siglas en inglés). Gracias a su ingrediente activo, Triflumurón, es capaz de romper con el ciclo de vida de los insectos, inhibiendo la formación de quitina en el momento de la muda, componente básico de la cutícula de los insectos.

Plagas que Controla

Larvas de insectos voladores: mosquitos, moscas y polillas.

Larvas y ninfas de insectos rastreros: cucarachas, pulgas y escarabajo de las camas de las aves

Modo de Uso y Cálculo de la dosis

Plagas	Dosis	
Ninfas de cucarachas	1 cm ³ por litro de agua para 20 m ²	Se debe aplicar en grietas y lugares frecuentados por las mismas
Larvas de Pulgas		Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Larvas de mayor edad se ven afectadas con menor intensidad: las pupas no se ven afectadas en absoluto.
Larvas de polillas		Combatelas larvas de polillas que se esconden en los recovecos o caminan por la superficie en busca de alimentos.
Larvas de escarabajo de la cama de los Pollos	2 cm ³ /50 cm ³ de agua por m ²	SENASA: se debe aplicar en los bordes de los galpones cerca de los calefactores, hornos, debajo de los comederos y todo lugar donde exista concentración de larvas.
Larvas de Moscas	20/40 cm ³ por litro de agua para 20 m ² de guano o materia orgánica	Actúa contra los huevos y larvas jóvenes. Las larvas de mayor edad se transforman en pupa a pesar del tratamiento, aunque las pupas en general se deforman y no logran escapar de la coraza, y convertirse en moscas adultas. La superficie tratada debe quedar humedecida repitiéndose cuando se acomode el nuevo estiércol sobre la capa ya tratada.
Larvas de Mosquitos	10 cm ³ /10 L de agua para 500 m ² de sup. acuática	Pulverización Manual
	125 cm ³ 10 L de agua para 5000 m ² de sup. acuática	Pulverización Motorizada
	250 cm ³ /10 L de agua para 2 ha de sup. acuática	ULV terrestre

Recomendaciones Pre - Aplicación

Advertir a los usuarios de las instalaciones las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto. Retirar todo tipo de alimentos y utensilios de cocina.

Recomendaciones en la aplicación

- No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.
- Durante la aplicación solo el operario estará presente en la misma
- No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos y plantas.
- No aplicar en presencia de personas.
- No contaminar aguas quietas o en movimiento con el producto o su envase
- No reutilizar el envase.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos.

Recomendaciones post - aplicación

- Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
- Dejar entre la aplicación y el reingreso al lugar tratado un mínimo de 2 horas.
- Verificar el secado del producto antes del reingreso al lugar.
- Ventilar el lugar durante todo este tiempo.
- No lavar las superficies aplicadas durante 10 a 15 días posteriores a la aplicación.
- Preferentemente manipular con guantes y ropa protectora.

Intervalo entre aplicaciones

- Al ser un insecticida larvicida residual se recomienda en interiores hacer aplicaciones cada 20, 30, 60 días dependiendo de la infestación presente.
- En exteriores se recomienda aplicar cada 7, 15 o 30 días dependiendo de la plaga a tratar.

Efecto Insecticida

El efecto larvicida / ninficida de Starycide® SC comenzará inmediatamente después que las larvas y ninfas tomen contacto con el producto.

Starycide® SC tiene una residualidad prolongada de entre aproximadamente 60 y 180 días.

Seguridad

No pulverizar artefactos eléctricos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos.

Los insectos y otros invertebrados son únicos en poseer un esqueleto externo compuesto de quitina; éste está ausente en animales, pájaros y seres humanos, por lo tanto, es totalmente inocuo para estos.

Starycide® SC no puede ser usado en aguas para consumo o en aguas con vida acuática.

Producto no Inflamable.

Riesgos ambientales

Evitar que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas.

Almacenamiento

- Almacenar en el envase original. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Mantener alejado de la luz directa del sol. Mantenerse separado de alimentos, bebidas y piensos.

Primeros Auxilios

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire

Consultas en Caso de Intoxicación

Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; CABA: Hospital Escuela "José de San Martín"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; La Plata: Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor María Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; Pergamino: Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; Rosario: Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicológico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Córdoba: Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; Mendoza: Hospital Central: (0261) 385 5509; CABA: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; Córdoba: Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquén: Hospital Regional: (0299) 44-90800/44-90890.

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Producido a través de terceros en Argentina

envu®



+0800 345 1957



www.ar.envu.com



@envuprofesional



controlprofesional@envu.com

Titular Registro:

Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales.
©2024. Environmental Science U.S. LLC. Avenida Corrientes 800, Piso 39°, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Código Postal: C1008