




La evolución en control Flexible y Sistémico

Residura® es un herbicida sistémico de pre y post-emergencia con una amplia acción residual y espectro de control.

Residura® puede aplicarse con equipos manuales y mecánicos, estando debidamente calibrados. Preferiblemente con un sistema de agitación incorporado. Se debe tener una cobertura homogénea y uniforme de no menos de 30 gotas/cm² con un espectro de gotas medianas a gruesas (200 - 400 µm).
Aplicar con condiciones atmosféricas favorables.

Atributos principales y características específicas:

Ingrediente activo	Imazapyr: 80%
Formulación	Gránulos dispersables
Contenido	500g (5 x 100g)
Dosis Recomendada	500g/ha



Ventajas:



Control residual inteligente: elimina la germinación de malezas provenientes de semillas y de la propagación vegetativa.

La interrupción del crecimiento de las malezas ocurre poco tiempo después de la aplicación.

Su modo de acción es específico para plantas, por lo que no actúa sobre procesos metabólicos de insectos ni animales, ni afecta la fauna que habita alrededor de la plantación forestal.

Se absorbe por hojas y raíces y se transloca rápidamente a través del xilema y floema.

Baja dosis por hectárea.

Compatibilidad con otros productos como por ejemplo: Glifosato, Triclopyr y Fluroxypyr.

No es volátil, no despidе vapores y una lluvia a 2h de la aplicación no afecta el rendimiento.

Malezas:

Espectro de control: gramíneas, ciperáceas, hojas anchas, anuales y perennes.

Ambay (<i>Cecopria adenopus</i>)	Ortiga gigante (<i>Urena baccifera</i>)
Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	Paitén (<i>Cenchrus parviorus</i>)
Bananita (<i>Maranta divaricata</i>)	Pasto bandeira (<i>Digitaria insularis</i>)
Cebadilla del campo (<i>Hordeum leporinum</i>)	Pasto de cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>)
Charrúa (<i>Mikania micrantha</i>)	Pasto jesuita (<i>Axonopus compressus</i>)
Flor de San Juan (<i>Pyrostegia venusta</i>)	Pasto yacaré (<i>Paspalum paniculatum</i>)
Fumo bravo (<i>Solanum granuloso-leprosum</i>)	Peludilla (<i>Gnaphalium spicatum</i>)
Horqueta (<i>Peschiera australis</i>)	Setaria (<i>Setaria poiretana</i>)
Lecherón (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	Tartago (<i>Ricinus communis</i>)
Maria mola (<i>Senecio brasiliensis</i>)	Yuqueri (<i>Acacia rucumanensis</i>)
Matacampo (<i>Vernonia scorpioides</i>)	