



Cucargachas

GENERALIDADES: Maxforce® Forte es una formulación específica para el control de cucarachas. Ofrece innovación tecnológica en el desarrollo de geles para los profesionales en el control de plagas. Su especial formulación brinda simplicidad en la aplicación, asegurando una prolongada residualidad, poder de atracción y eficacia del producto.

INGREDIENTE ACTIVO: Maxforce® Forte contiene fipronil, un ingrediente activo perteneciente al grupo químico fenilpirazol.

Origen: Estados Unidos	No Inflamable
------------------------	---------------

APARENCIA: Maxforce® Forte es un cebo de color marrón claro y excelente adherencia que permite una aplicación poco perceptible en todo tipo de superficies.

SEGURIDAD: Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. Dada su especial formulación, Maxforce® Forte posibilita efectuar una aplicación selectiva en todos aquellos lugares donde se requiera un cucarachicida específico.

EFICACIA: La acción letal de Maxforce® Forte comienza de inmediato, produciendo la muerte de las cucarachas a las pocas horas de haberlo ingerido. Maxforce® Forte garantiza el control de cucaracha alemana, manteniendo esta actividad a lo largo de aproximadamente 30 a 60 días post-aplicación dependiendo de la infestación presente.

En aplicaciones de exteriores, la acción del sol directo y el agua reducen la residualidad del gel.

No aplicar gel en áreas donde recientemente se haya aplicado insecticida. No aplicar insecticida sobre el gel ya que actuaría como repelente.

INSTRUCCIONES DE USO: La dosis de Maxforce® Forte a aplicar dependerá del grado de infestación de la plaga. Efectuar un minucioso monitoreo previo de la zona afectada, definiendo los lugares (refugios y lugares de tránsito de las cucarachas) donde aplicaremos los puntos dosis / gotas de gel.

Dosificación recomendada por m² o lineal:

*La gota de un tamaño de 5mm pesa aproximadamente 0,1g.

Pequeñas cantidades de gotas del gel bien distribuidas, proveerán un control más rápido de la infestación.

Utilizar las dosis más altas con alta infestación de cucarachas donde el gel compita con fuentes alternativas de alimento para el insecto y en lugares con poco aseo.

Aplicar Maxforce® Forte donde se refugian y/o agrupan las cucarachas, en esquineros, rendijas, grietas, bajo mesadas, cajoneras, alacenas, cocina, heladera artefactos eléctricos y todo otro lugar donde se puede observar actividad de las cucarachas. Identificar y controlar los puntos de aplicación a los siete días de apliado y responder el cebo consumido. Reaplicar a los 30 a 60 días hasta que se observe que la infestación ha sido controlada. En zonas con alto riesgo de reinfestación conviene mantener el cebado como medida preventiva, revisar los puntos / gotas cada 30 a 60 días.



produto / product

Maxforce Forte - bula UY

arquivo / file

bula-Maxforce

medidas / dimensio

124 x 197 mm

data / date
28/05/26

cliente / client

Envu

cores / colors

1 x 1

cod. barras / bar code

0000-0001-9331-3331

contato / ns
Carolina

revisão / review

05

change

cod. prod.

84489727

aprovado / approved

Esta prova não pode ser utilizada como referência de cores. Esta prova é cópia exata do arquivo digitalizado a partir de uma fonte verificada e revisada, e essencial ao cliente, antes de aprovar, checar todos os detalhes. As responsabilidades deste prestador de serviços sobre as provas e arquivos cessam após a aprovação das mesmas pelo cliente e sem envio para reprodução. Favor checar 2 vezes. This sampler can not be used as a colors reference. These samplers are faithful copies of the digital files, and even though they have been checked and revised, it is fundamental to the client, before signing, checking all the details. The service provider's responsibilities regarding the samples and final art cease after the same are approved by the client and sent for reproduction. Please check twice.

PRECAUCIONES DE USO: Evitar aplicar Maxforce® Forte en áreas que se lavan en forma rutinaria. No aplicar en áreas de excesiva suciedad/grasitud ya que disminuye la atracción del gel. No aplicar en áreas que han sido pulverizadas recientemente con insecticidas, como así tampoco pulverizar directamente sobre el gel ya que el producto se desactivará. No aplicar aerosoles directos o de descarga total en zonas donde se aplicó. No utilice este producto en o sobre equipos eléctricos donde existe la posibilidad de riesgo de electrocución. En caso de ser necesaria la remoción del gel de los lugares donde ha sido colocado, utilizar una solución de cloruro de sodio al 5% (sal común). El producto puede manchar materiales textiles y prendas de vestir.

El SENASA autoriza el uso del producto para los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de beberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles, huesos y harinas incomedibles, depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

DL 50 oral ratas > 2000 mg/kg
DL 50 dermal ratas > 2000 mg/kg
Irritación de la piel en conejos: leve
Irritación ocular en conejo: mínimo
No sensibilizante demal

RENDIMIENTO: El contenido de una jeringa de Maxforce® Forte de 30 g es suficiente para tratar un área de 120 m² en infestaciones normales.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con la ropa o la piel, quitar la ropa contaminada y lavarla en forma separada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de intoxicación concurrir al médico toxicólogo llegando a la etiqueta y/o folleto adjunto.

EMININACIÓN DEL ENVASE: Si está vacío no reutilice la jeringa. Colóquelo en la basura domiciliaria o entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase III

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; **CABA:** Hospital Escuela "José de San Martín"/UBA/Hospital de Clínicas: 5950 8000; **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor María Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; **Rosario:** Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicológico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; **Cordoba:** Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Cordoba: Hospital de Niños de Santísima Trinidad: (0351) 458 6400; **Mendoza:** Hospital Central: (0261) 385 5509; **CABA:** Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; **Cordoba:** Hospital de Niños: (0351) 458 6400; **Neuquen:** Hospital Regional: (0299).

Uruguay: CIAT Hospital de clínicas 7º piso. Tel (02)1722.



Argentina:

RNPUD N°: 0520006

Autorizado por SENASA: C-2719

Importado y distribuido por:

2022 Environmental Science AR SA, Legajo N° DM 33.

Juana Manso 205, 7° piso, Buenos Aires, Argentina.

TEL: 08003451957

Uruguay:

Reg. M.S.P. N° 80861

Reg. I.M.M. de S.P. N° 172

Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.

Magallanes 1910 CP11800 Tel 292245321

Montevideo, Uruguay

maisor@maisor.com.uy

Environmental Science U.S. LLC., 5000 CentreGreen Way, Suite 400, Cary, NC 27513.

Envu y su logo son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.

©2022 Environmental Science U.S. LLC.