emi shibata
emishibata@uol.com.br
emi_shibata@hotmail.com
cel 11 98271081

produto / product: Rodilon Pellets
arquivo / file: FP-Rodilon-Pellets_1kg.ai
medidas / dimensions: 220 x 51 x 273 mm
data / date: 12/05/26
cliente / client: Envu
cores / colors: 4 x 0
contato / name: Alejandro
revisão / review: 06
change
cód. barras / bar code
cód. prod.
aprovado / approved
obs.:
pantones
C M Y K

Este prova não pode ser utilizada como impressão de cores. Esta prova é cópia exata do arquivo digital e apenas de seu conteúdo e resolução e representa as cores dentro dos limites de desta prensagem de amostra sobre as provas e entre-nas cessão após a impressão das mesmas pelo cliente e seu erro para reprodução. Favor checar 2 vezes. This samples can not be used as a color reference. These samples are digital copies of the digital files and even though they have been checked and revised, it is impossible that colors appear exactly as the digital samples. The service provider is responsible regarding the samples and final art cause after the same are approved by the client and sent for reproduction. Please check twice.

.125" CLEAR (NO INK)

8.6395" CUT OFF 2 AROUND 17.279" CYLINDER

.125" CLEAR (NO INK)

1.5"

RODILON® Pellets

Rodenticida
Raticida

9.25" FILLABLE CAVITY

10.75" PACKAGE LENGTH (FRONT)

RODILON®
Pellets

Rodenticida

envu™

COMPOSICIÓN

Difetialone ..... 0,0025 g
Harinas de cereales, parafina, azúcar, colorante, benzoato de denatonium, saborizantes, antioxidante, c.s.p ..... 100 g

PREVIENE AMARGANTE INGESTIÓN HUMANA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO
SOLO UTILIZAR EN CAJAS CEBADERAS EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO.
Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones.
a tener en cuenta para evitar accidentes.

Lote N°:
Fecha de elaboración:
Vto:

Argentina:
RNPUD N° 0520002 SENASA C-2542
Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science AR S.A.
Legajo N° DM 33, 205 Juana Manso, 7°piso, Buenos Aires, Argentina.
TEL: 08003451957.
www.ar.envu.com

Uruguay:
Reg.M.S.P.N° 57064; Re.IMM S de S.P.N°130
Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.
Magallanes 1910, CP.11800, Tel:29245321, Montevideo, Uruguay
maisor@maisor.com.uy

Origen: Estados Unidos.

No Inflamable

Contenldo Neto: 1 kg

CUIDADO! VENENO!

Ratas y Ratones

1"

2" BOTTOM GUSSET

23.5" CUT WEB

25" WEB WITH

9.25" FILLABLE CAVITY

10.75" PACKAGE LENGTH (BACK)

PRECAUCIONES:
CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN U ABSORCIÓN POR LA PIEL
No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
No fumar, beber ni comer durante la aplicacion.
No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
No volver a utilizar los envases vacíos.
Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
En caso de intoxicación, concurra al médico llevando esta etiqueta.
Mujeres embarazadas no pueden manipular ni exponerse al raticida.
Materia fecal del roedor puede contener raticida, por lo tanto debe realizarse limpieza permanente del lugar desratizado.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO: Este producto es tóxico para todos los mamíferos, incluso el hombre. Los roedores deberán ser dispuestos según la normativa vigente. Eliminar los restos del producto en forma segura. Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Usar guantes, máscara y protección ocular.

RIESGOS AMBIENTALES: Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos - perros, gatos, otros - (inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo).
No contaminar fuetes de agua.

ALMACENAMIENTO: Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

PRIMEROS AUXILIOS: Los anticoagulantes monodósicos de acción prolongada pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación de tiempos de KT, con duración de hasta 20 a 30 días después de la exposición al raticida. En caso de intoxicación, diríjirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el medico profesional intervinienie. En caso de ingestión no provoque el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Clase IV.
Nombre comun: Difetialone.

ADVERTENCIA AL MEDICO: Clasificacion quimica: Cumarina.

Contiene el anticoagulante monodosico Difetialone. Administrar vitamina K1. El monitoreo de tiempo protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs y retirarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicologo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Argentina:
RNPUD N° 0520002 SENASA C-2542
Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science AR S.A.
Legajo N° DM 33, 205 Juana Manso 205, 7°piso, Buenos Aires,
Argentina. TEL: 08003451957.
www.ar.envu.com

Uruguay:
Reg.M.S.P.N° 57064; Re.IMM S de S.P.N°130
Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.
Magallanes 1910, CP.11800, Tel:29245321, Montevideo, Uruguay
maisor@maisor.com.uy

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Argentina: Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; **CABA:** Hospital Escuela "José de San Martin"/UBA/Hospital de Clinicas: 5950 8000; **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor Maria Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; **Rosario:** Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicologico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; **Cordoba:** Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Cordoba: Hospital de Niños de Santisima Trinidad: (0351) 458 6400; **Mendoza:** Hospital Central: (0261) 385 5509; **CABA:** Hospital de Niños Ricardo Gutierrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; **Cordoba:** Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquen: Hospital Regional: (0299).
Uruguay: C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7° piso) Tel: (02) 1722.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

envu™

Environmental Science U.S. LLC., 5000 CentreGreenWay,
Suite 400, Cary, NC 27513.
Envu y su logo son marcas comerciales
propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.
©2022 Environmental Science U.S. LLC

AR-80882114a

RECOMENDACIONES DE USO: Rodilon® Pellet es un rodenticida anticoagulante monodósico listo para usar. Con una sola ingestión controla ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por debilidad o vejez y de ese modo sus congéneres no reclan el alimento.

USOS: Restaurantes, casas, edificios. hoteles, hospitales, escuelas, barcos, aviones, micros, salones en general fábricas, galpones, parques , instalaciones deportivas, alcantarillados, orillas de acequias, canales, corrales, establos y studes (caballerizas). Cuando se encuentren vacíos.

PLAGAS QUE CONTROLA: Lauchа o ratón doméstico *(Mus musculus)*, Rata del tejado *(Rattus rattus)*, Rata gris *(Rattus norvegicus)*, Rata alejandrina *(Rattus variedad alexandrinus)*, Ratones de campo (*Akodon* spp.; *Oryzomys* spp.; *Holochilus* spp.) **FORMA DE USO:** Colocar los pellets (cebo) dentro de cajas cebadoras de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involcables y proteger el cebo de condiciones ambientales.

DOSIFICACIÓN: Ratas: colocar de 25 a 50 g cada 4 a 10 m lineales (dependiendo de la infestation presente). Ratones: colocar de 10 a 25 g cada 2-4 metros lineales (dependiendo de la infestación presente).

SEGURIDAD: Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando las aplicaciones del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar, entregándolas por escrito. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilation que condicionen la presencia del raticida en el ambiente.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
DL 50 oral ratas > 5000 mg/Kg
DL 510 dermal ratas > 2000 mg/Kg
Irritación de la piel en conejos: leve irritante.
No sensibilizante dermal.

PRECAUCIONES:
CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN U ABSORCIÓN POR LA PIEL
No aplicar en superficies en contacto con alimentos ni utensilios de cocina, platos, plantas ni acuarios.
No fumar, beber ni comer durante la aplicacion.
No transportar ni almacenar con medicamentos ni alimentos.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.
No volver a utilizar los envases vacíos.
Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales.
En caso de intoxicación, concurra al médico llevando esta etiqueta.
Mujeres embarazadas no pueden manipular ni exponerse al raticida.
Materia fecal del roedor puede contener raticida, por lo tanto debe realizarse limpieza permanente del lugar desratizado.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO: Este producto es tóxico para todos los mamíferos, incluso el hombre. Los roedores deberán ser dispuestos según la normativa vigente. Eliminar los restos del producto en forma segura. Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón. Usar guantes, máscara y protección ocular.

RIESGOS AMBIENTALES: Este es un producto tóxico para los peces, aves y mamíferos - perros, gatos, otros - (inclusive si se alimentan de animales que han consumido el cebo).
No contaminar fuetes de agua.

ALMACENAMIENTO: Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Entréguelo para reciclar en algún centro de acopio habilitado.

PRIMEROS AUXILIOS: Los anticoagulantes monodósicos de acción prolongada pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación de tiempos de KT, con duración de hasta 20 a 30 días después de la exposición al raticida. En caso de intoxicación, diríjirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. Las medidas de rescate del tóxico y posterior tratamiento serán indicadas exclusivamente por el medico profesional intervinienie. En caso de ingestión no provoque el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: Clase IV.
Nombre comun: Difetialone.

ADVERTENCIA AL MEDICO: Clasificacion quimica: Cumarina.

Contiene el anticoagulante monodosico Difetialone. Administrar vitamina K1. El monitoreo de tiempo protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs y retirarse a las 72 hs. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicologo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Argentina:
RNPUD N° 0520002 SENASA C-2542
Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science AR S.A.
Legajo N° DM 33, 205 Juana Manso 205, 7°piso, Buenos Aires,
Argentina. TEL: 08003451957.
www.ar.envu.com

Uruguay:
Reg.M.S.P.N° 57064; Re.IMM S de S.P.N°130
Registra, importa y distribuye: Maisor S.A.
Magallanes 1910, CP.11800, Tel:29245321, Montevideo, Uruguay
maisor@maisor.com.uy

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
Argentina: Hospital Posadas: 11 4658 7777, 4654 6648, 0800 333 0160, 4469 9300 INT 1102; **CABA:** Hospital Escuela "José de San Martin"/UBA/Hospital de Clinicas: 5950 8000; **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos/Hospital de niños "Sor Maria Ludovica": (0221) 451-5555/453-5901 INT 1312, 0800 222 9911; **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José: (02477) 42 9792/99 INT 259; **Rosario:** Hospital "J.M Cullen": (0342) 457 3357 INT 267/8; Rosario: Centro Toxicologico TAS: (0341) 424 2727, 0800 888 8694; **Cordoba:** Hospital Municipal de Urgencias: (0351) 427 6200 INT 259; Cordoba: Hospital de Niños de Santisima Trinidad: (0351) 458 6400; **Mendoza:** Hospital Central: (0261) 385 5509; **CABA:** Hospital de Niños Ricardo Gutierrez: 11 4962 2247, 11 4962 6666; CABA: Hospital Pedro Elizalde: 11 4300 2115; Hospital Italiano: 11 4959 0200; **Cordoba:** Hospital de Niños: (0351) 458 6400; Neuquen: Hospital Regional: (0299).
Uruguay: C.I.A.T. (Hospital de Clínicas 7° piso) Tel: (02) 1722.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños o perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

envu™

Environmental Science U.S. LLC., 5000 CentreGreenWay,
Suite 400, Cary, NC 27513.
Envu y su logo son marcas comerciales
propiedad de Environmental Science U.S. LLC. o una de sus filiales.
©2022 Environmental Science U.S. LLC

AR-80882114a

1.5"

RODILON® Pellets

Rodenticida
Raticida

DISTORTION CHECK (LINE = 100mm BEFORE DISTORTION)

DISTORTION CHECK (LINE = 100mm BEFORE DISTORTION)