



## Insecticide

- Pas d'agitation des guêpes
- Également contre frelons asiatiques
- Guêpes, frelons et fourmis

- Geen agitatie van wespen
- Ook tegen Aziatische hoornaars
- Wespen, hoornaars en mieren

**Composition:** Pouddre pour poudrage (DP) à base de 1,28% w/w (1,25% w/w pure) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

**Samenstelling:** Stuifpoeder (DP) op basis van 1,28% w/w (1,25% w/w zuiver) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:  
Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano) (CAS 112926-00-8)

**Numéro d'autorisation / Erkenningssnummer:**  
BE: BE2018-0028 - LUX: 351/17/L-000 - NL: NL-0004426-0000

**Contenu / Inhoud:**

**3 kg e  
envu™**



Guêpes, frelons et fourmis  
Wespen, hoornaars en mieren

**Utilisation:** lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant emploi.  
**Gebruik:** voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen



ATTENTION /  
WAARSCHUWING /  
ACHTUNG

**Mentions de danger:**  
H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence:**  
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.  
P391: Recueillir le produit répandu.  
P501: Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.

**Gevarenauwzingen:**  
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen:**  
P273: Voorkom lozing in het milieu.  
P391: Gelekte / gemorst stof opruimen.  
P501: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.

**Gefahrenhinweise:**  
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P501: Inhalt und Behälter in Einklang mit allen regionalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Centre Antipoisons / Antigifcentrum (BE): +32 (0)70 245 245 ; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500  
Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (NL) +31 (0)88 755 8000

**À usage professionnel uniquement**  
(pour le G.-D. du Luxembourg : professionnel & professionnel qualifié)  
TP18 – Insecticide - Exclusivement autorisé:

- la lutte contre les guêpes et les frelons (nids), y compris les nids de frelons asiatiques. Pour traitement des nids en intérieur, sur des surfaces protégées imperméables.
- l'application directe sur les fourmis en intérieur. Pour une application localisée, en particulier à proximité du matériel électrique, dans les vides, cavités et aérations (qui doivent être fermés/scellés après traitement).

**Uitsluitend voor professioneel en getrainde professioneel gebruik**  
PT18 – Insecticide - Uitsluitend toegelaten voor:

- de bestrijding van wespen en hoornaars (nesten), inclusief de nesten van Aziatische hoornaars. Voor toepassing als nestbehandeling binnen, te gebruiken met een ondoorlaatbare vloeropervlaktebedekking onder het te behandelen nest.
- rechtstreeks toepassing op mieren binnen. Voor pleksgewijze toepassing, met name rond elektrische apparatuur, in gaten, holle ruimtes en ventilatieroosters (die na toepassing gesloten/afgedicht moeten worden).

**Une autorisation de / Een toelating van:**  
Distribué par / Verdeeld door: (BE)  
2022 Environmental Science FR S.A.S.  
3 Place Giovanni Da Verazzano  
69009 Lyon - France  
C +33 451 081 508  
@www.be.envu.com

**Contact address / Contact:**  
De Kleetlaan 4 - 1831 Diegem  
Belgium  
C +33 451 081 508  
@www.nl.envu.com

Envu, the Envu logo and Ficam® D are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



N° de lot / num. emballage  
Date de péremption / vor emballage  
Lotnummer: zie verpakking  
Houdbaarheidsdatum : zie verpakking

BLX79871988G

**Mode d'emploi :** Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant emploi.

**Méthode d'application :** À appliquer avec un pulvérisateur de poudre (manuelle et/ou motorisée).

Organismes Cibles	Domaine d'utilisation	Dose	Nombres d'applications
1 <i>Vespinae</i> : nids de guêpes et frelons asiatiques	En intérieur	Pour les nids de guêpes accessibles : utiliser 20 à 60 g par nid, selon sa taille, répartir 20 à 60 g sur les points d'entrée identifiés du nid. Pour les nids de frelons asiatiques : utiliser 20 à 60 g par nid, selon sa taille.	11 applications maximum par an.
2 <i>Formicidae</i> : fournis (adultes)	En intérieur	Appliquer directement sur les fourmis à raison de 10 à 20 g de produit par mètre carré.	11 applications maximum par an.

#### Utilisation 1 - Traitement des nids de guêpes et de frelons - en intérieur - usage professionnel

**Consignes d'utilisation spécifiques :** Appliquer la zone sur l'entourant l'entrée du nid et à l'intérieur du nid, par l'entrée du nid. Si possible, perforer la paroi du nid et appliquer à l'intérieur du nid par l'ouverture ainsi créée. Bien que le produit n'excite pas les guêpes, procéder avec prudence, car la présence de l'opérateur pourrait les exciter. Par conséquent, porter des vêtements de protection. Dans le cas d'un traitement des nids en intérieur, utiliser une protection imperméable (tous les déchets doivent être éliminés selon les réglementations régionales/nationales en matière de gestion des déchets solides). Mesures de gestion des risques spécifiques. Éviter de contaminer des surfaces humides ou pouvant faire l'objet d'un nettoyage à l'eau. Recouvrir les surfaces adjacentes avec une protection imperméable (par ex. feuille de plastique) ou éliminer la poude par essuyage humide ciblé avec des mouchoirs stables. Des mesures doivent être prises pour empêcher l'accès des abeilles butineuses aux nids traités, de préférence en bloquant les entrées de nids. Si possible, le nid doit être retiré après le traitement et éliminé de manière contrôlée, c.-à-d. selon une méthode d'élimination des déchets pesticides.

#### Utilisation 2 - Application directe sur les fourmis - en intérieur - usage professionnel

**Consignes d'utilisation spécifiques :** Pour une application localisée, en particulier à proximité du matériel électrique, dans les vides, cavités et aérations (qui doivent être fermées/fermées/fermées après traitement). Appliquer directement sur les fourmis dans les vides, cavités et aérations. Mesures de gestion des risques spécifiques : Sceller/fermer les vides, cavités et aérations après application.

#### CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

**Mesures de gestion des risques :** Lors de la manipulation du produit : les opérateurs doivent porter des gants de protection résistants aux produits chimiques (matériau des gants : caoutchouc de nitrile (EN 374-1: 2003)). L'utilisation d'un équipement de protection respiratoire offrant un facteur de protection de 20 est obligatoire. Il convient de porter au minimum un appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé avec casque/capuche/masque (TH2/TM2) ou un masque complet équipé d'un filtre à gaz (A1, marron) + filtre à poussière (P3, blanc). Lors de l'application du produit : les opérateurs doivent porter une combinaison de protection (au minimum de type 4, EN 14605) imperméable au produit biocide et des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants : caoutchouc de nitrile). Ne pas appliquer au moyen d'un équipement de type souffleuse rotative motorisée. Appliquer uniquement dans les zones inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie. Pendant le traitement, l'accès à la zone doit être restreint au seul opérateur protégé. Aucun tiers ne doit pénétrer dans la zone pendant le traitement. Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture, les aliments pour animaux ou l'eau pourraient être contaminés. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit contient une anticholinesterase. NE PAS UTILISER si un avis médical INTERDIT de travailler avec ces composants. Recueillir le produit répandu. Éviter toute dispersion dans l'environnement.

**Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects et les instructions de premiers secours :** En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, provoquer des vomissements, sauf si le patient a un niveau de conscience réduit ou est sans connaissance. Le patient doit être placé au repos strict et être examiné par un médecin ou transporté immédiatement à l'hôpital.

**Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage :** Ne pas réutiliser le récipient vide. Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination ou de collecte des déchets dangereux autorisé, à l'exception des récipients vides et propres, qui peuvent être mis au rebut en tant que déchets non dangereux.

**Consignes de stockage :** Conserver dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien aéré. Ficam® D peut être conservé jusqu'à 2 ans après la date de production.

#### GARANTIE

Chaque fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous sommes cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat insuffisant et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf lorsqu'il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte seul tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.

**Gebruiksaanwijzing :** Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

**Toepassingsmethode :** Aan te brengen met een poederspuit of poederverstuiver (handmatig of middels compressor aangedreven).

Gebruikstafel

Doelorganismen	Toepassingsgebied	Dosering	Aantal toepassingen
1 <i>Vespinae</i> : nesten van wespen en Azatische hoornaars	Binnen	Voor een toegankelijk wespennest : gebruik 20-60 g per nest, afhankelijk van de grootte van het nest. Voor een niet-toegankelijk, verborgen wespennest : gebruik 20-60 g verdeeld over de gevonden nestgangen. Voor een nest van de Azatische hoornaar : gebruik 20-60 g per nest, afhankelijk van de grootte van het nest.	Maximaal 11 keer per jaar te gebruiken.
2 <i>Formicidae</i> : mieren (adulten)	Binnen	Rechtstreeks toepassen op mieren met een hoeveelheid van 10-20 g per vierkante meter.	Maximaal 11 keer per jaar te gebruiken.

#### Gebruik 1 - Behandeling van wespen- en hoornarnesten - binnen - professioneel gebruik

**Gebruikspartij gebruiksinstructies :** Breng het product aan rondom de nestgangen en via de ingang in het nest. Maak waar mogelijk een gat in de wanden van het nest en breng daar deze opening aan in het nest. Hoewel het product zelf geen agressief gedrag zal uitlokken bij wespen, kan de aanwezigheid van de toepasser dit wel doen. Draag daarom beschermende kledij. Voor de behandeling van een nest binnen, te gebruiken met een ondooraatbare vloeroppervlaktebedekking onder het te behandelen nest (verwijder na bestrijding al het afvalmateriaal als vast afval volgens de plaatselijke voorschriften). Alleen voor gebruik tegen wespen en hoornaars door middel van handmatige en/of middels compressor aangedreven toepassing. **Gebruikspartij risicobeperkende maatregelen :** Vermijd bestemming van oppervlakken die nat zijn of niet gereinigd kunnen worden. Aangrenzende oppervlakken afdekken met een ondoordringbare beschermfolie (bijv. kunststoffolie) of poeder verwijderen door gericht nat af te vegen met wegwerpdoekjes. Neem maatregelen die voorkomen dat naar voedsel zoekende bijen toegang krijgen tot behandelde nesten, bij voorkeur door de toegang tot de nesten te blokkeren. Na behandeling indien mogelijk het nest verwijderen en op een gecontroleerde wijze afvoeren, d.w.z. in overeenstemming met een afvalverwijderingssysteem voor pesticiden.

#### Gebruik 2 - Rechtstreeks toepassing op mieren - binnen - professioneel gebruik

**Gebruikspartij gebruiksinstructies :** Voor pleksgewisse toepassing, met name rond elektrische apparatuur, in gaten, holle ruimtes en ventilatieroosters (die na toepassing gesloten/afgedicht moeten worden). Rechtstreeks aambrengen op mieren in gaten, holle ruimtes en ventilatieopeningen. **Gebruikspartij risicobeperkende maatregelen :** Na toepassing gaten, holle ruimtes en ventilatieopeningen sluiten of afdichten.

#### ALGEMENE GEbruiksaanwijzingen

**Risicobeperkende maatregelen :** Bij het hanteren van het product: Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenmateriaal: nitrilrubber (EN 374-1: 2003)). Het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen met een beschermingsfactor 20 is verplicht. Er is ten minste een mechanisch luchtzuivende bedieningsapparaat met helm/kap/masker (TH2/TM2) of een volledig gelatasmasker met gasfilter vereist (combinatiefilter: gasfilter (A1, bruin) + stoffilter (P3, wit)). Bij het aanbrengen van het product: Draag een beschermende overall (ten minste type 4, EN 14605) die ondoordraagbaar is voor het biocid en chemicaliënbestendige handschoenen (handschoenmateriaal: nitrilrubber). Niet gebruiken met aange-dreven rotende blaasventilatoren. Uitsluitend te gebruiken in zones die niet toegankelijk zijn voor kinderen en huisdieren. Tijdens de behandeling van de ruimte moet de toegang worden beperkt tot de beschermde toepasser. Derden mogen tijdens de behandeling de ruimte niet betreden. Niet gebruiken op planten waar voedingsmiddelen, diervoeders of water vervuild kunnen raken. Op een veilige plek bewaren. Buitensbereik van kinderen houden. Dit product bevat een anticholinesterase-verinding. NIET GEBRUIKEN als u door een arts wordt geadviseerd NIET met dergelijke verbindingen te werken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Voorkom lozing in het milieu.

**Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten en EHBO instructies :** Bij een ongeval of onwel voelen onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk etiket tonen). Na inslikken, moet braken worden opgewekt, tenzij de persoon een verminderd bewustzijnsniveau heeft of bewusteloos is. De persoon moet strikt rustig worden gehouden en onmiddellijk door een arts worden onderzocht of naar het ziekenhuis worden gebracht.

**Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking :** Verpakking niet hergebruiken. Poederresten, besmette materialen en zo mogelijk het nest verzamelen en veilig afvoeren als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural).

**Voorwaarden voor opslag :** In de originele verpakking bewaren. De verpakking goed afgesloten op een koele, droge en goed geventileerde plek bewaren. Ficam® D kan tot 2 jaar na productie bewaard worden.

#### WAARBORG

Eike fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedaane toepassing van onze producten na te gaan, kunnen wij aan de koper geen enkele waarborg geven, wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvolledige resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werk具gen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico's over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteiten beslist.

BLX79915519G

**ARTICLE 79902964**



## Insecticide

- Pas d'agitation des guêpes
- Également contre frelons asiatiques
- Guêpes, frelons et fourmis
- Geen agitatie van wespen
- Ook tegen Aziatische hoornaars
- Wespen, hoornaars en mieren

**Composition:** Poudre pour poudrage (DP) à base de 1,289% w/w (1,25% w/w pure) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

**Samenstelling:** Stuifpoeder (DP) op basis van 1,289% w/w (1,25% w/w zuiver) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:  
Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano) (CAS 112926-00-8)

### Numéro d'autorisation / Erkenningssnummer:

BE: BE2018-0028  
LUX: 351/17/L-000  
NL: NL-0004426-0000

### Contenu / Inhoud:

**4 x 3 kg e**  
**envu™**



Guêpes, frelons et fourmis  
Wespen, hoornaars en mieren



## Insecticide

- Pas d'agitation des guêpes
- Également contre frelons asiatiques
- Guêpes, frelons et fourmis
- Geen agitatie van wespen
- Ook tegen Aziatische hoornaars
- Wespen, hoornaars en mieren

**Composition:** Poudre pour poudrage (DP) à base de 1,289% w/w (1,25% w/w pure) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

**Samenstelling:** Stuifpoeder (DP) op basis van 1,289% w/w (1,25% w/w zuiver) bendiocarb (CAS 22781-23-3)

Tot bezorgdheid aanleiding gevende stof:  
Synthetisch amorf siliciumdioxide (nano) (CAS 112926-00-8)

### Numéro d'autorisation / Erkenningssnummer:

BE: BE2018-0028  
LUX: 351/17/L-000  
NL: NL-0004426-0000

### Contenu / Inhoud:

**4 x 3 kg e**  
**envu™**



Guêpes, frelons et fourmis  
Wespen, hoornaars en mieren

**Utilisation:** lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant emploi.  
**Gebruik:** voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen

	<b>Mentions de danger:</b> H410: Très毒ique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	<b>Gefahrenhinweise:</b> H410: Sehr giftig für in het water levende Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
<b>Conseils de prudence:</b> P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P391: Recueillir le produit répandu. P501: Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.	<b>Veiligheidsaanbevelingen :</b> P273: Voorkom losing in het milieu. P391: Geleke / gemorste stof opruimen. P501: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.	<b>Sicherheitshinweise:</b> P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P391: Verschüttete Mengen aufräumen. P501: Inhalt und Behälter in Einklang mit allen regionalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
<b>ATTENTION / WAARSCHUWING / ACHTUNG</b>		

Centre Antipoisons / Antigifcentrum (BE): +32 (0)70 245 245 ; pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500  
Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (NL) +31 (0)88 755 8000

À usage professionnel uniquement  
(pour le G.-D. du Luxembourg : professionnel & professionnel qualifié)

TP18 - Insecticide - Exclusivement autorisé:  
1. la lutte contre les guêpes et les frelons (nids), y compris les nids de frelons asiatiques. Pour traitement des nids en intérieur, sur des surfaces protégées imperméables.  
2. L'application directe sur les fourmis en intérieur. Pour une application localisée, en particulier à proximité du matériel électrique, dans les vides, cavités et aérations (qui doivent être fermés/scellés après traitement).

Uitsluitend voor professioneel en getrainde professioneel gebruik

PT18 - Insecticide - Uitsluitend toegelaten voor:  
1. de bestrijding van wespen en hoornaars (nesten), inclusief de nesten van Aziatische hoornaars. Voor toepassing als nestbehandeling binnen, te gebruiken met een ondoorlaatbare vloeroppervlaktebedekking onder het te behandelen nest.  
2. rechtstreekse toepassing op mieren binnen. Voor pleksgewijze toepassing, met name rond elektrische apparatuur, in gaten, holle ruimtes en ventilatieroosters (die na toepassing gesloten/afgedicht moeten worden).

BLX79885237G

Een toelating van / Verdeeld door: (NL)  
2022 Environmental Science FR S.A.S.  
3 Place Giovanni Da Verrazzano  
69009 Lyon - France  
© +33 451 081 508  
@www.nl.envu.com

Contact address / Contact:  
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS  
De Kleetaan 4 - 1831 Diegem  
Belgium  
© +33 451 081 508  
@www.be.envu.com

Envu, the Envu logo and Ficam® D are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC.  
or one of its affiliates.

N° de lot : voir emballage  
Date de péremption: voir emballage  
Lotnummer: zie verpakking  
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking

