

Gids Groene ruimten





Een deskundige begeleiding !

De groene ruimten nemen een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in.

Als belangrijke speler in deze markt, biedt Bayer haar klanten haar expertise en know-how aan, zodat zij tegemoet kunnen komen aan de geldende milieu-eisen.

Innovatie is onze business en stelt ons in staat :

- **producten aangepast aan elk marktsegment aan te bieden**, met gunstige toxicologische en ecotoxicologische profielen,
- voor een steeds duurzamer beheer van de groene ruimten te zorgen, dit... vandaag en morgen, door optimalisatie van de productie-eenheden, vermindering van afval, bescherming van de gezondheid van de gebruikers en de bewoners via het geven van opleidingen, optimalisatie van de veiligheid van de gebruikers via het geven van informatie.

Onze verplichtingen en inspanningen naar de distributeurs en de gebruikers toe tonen duidelijk aan dat Bayer de bedoeling heeft **een echte partner in het duurzaam beheer van groene ruimten** te zijn. Dit dankzij een toegewijd, opgeleid en ervaren team, dat garant staat voor de Bayer-waarden.

Deze nieuwe “Gids Groene ruimten” laat u kennis maken met het productaanbod “Bayer Environmental Science – Groene ruimten”, een uniek assortiment producten en diensten voor het onderhoud en het beheersen van de vegetatie.



Benjamin Lebrun

Account Manager België – Luxemburg
benjamin.lebrun@bayer.com



Michel Wimmers

Business Manager Benelux
michel.wimmers@bayer.com

Bestellingen:

E-mail: orderdeskbe@bayer.com

☎ 02 535 66 09 (09u – 12u en 13u – 16u) - Fax: 02 535 64 55

Bayer – een wereldwijde, innovatieve groep	4
Bayer Groene Ruimten – Onderhoud en beheersen van de vegetatie	5
Innovatie – Verpakkingen	6
Nieuw design	7
Tuinaanleggers, greenkeepers	8
Boomkwekerijen en speciale teelten	9
Totale onkruidbestrijders – Pistol® Flex	10-13
Totale onkruidbestrijders – Zapper®	14-17
Selectieve onkruidbestrijder – Valdor® Expert	18-21
Insecticide – Merit® Turf	22-23
Fungicide – Chipco® Green	24-27
Fungicide – Interface™ Stressgard™	28-29
Kleurstof – Blauwe behandelingsindicator I.C. 001®	30-31


Bayer

Een wereldwijde, innovatieve groep

**Science For A Better Life**

Trouw aan haar engagement “Bayer : Science For a Better Life*”, is de Bayer-groep actief op het vlak van gezondheid, voeding en high-tech. Zij brengt producten en diensten op de markt die bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van éénieder.

* Wetenschap verbetert de levenskwaliteit

**Producten Bayer Environmental Science - Groene Ruimten**

Product	Classificatie	Gevarencinnen	Erkenningsnr.	Erkenningsnummer Luxemburg	Bufferzone
Chipco [®] Green	Xn, N	R40 - R50/53	7497P/B	L01902-017	20 m met klassieke techniek
Interface [®] STRESSGARD	Xn, N	R40 - R50/53	10270P/B	-	5 m met klassieke techniek
Pistol [®] FLEX	N	R50/53	9838P/B	L01900-017	Voor-opkomst: 20 m met 75% driftreducerende techniek Na-opkomst: 20 m met klassieke techniek
Merit [®] TURF	Xi, N	R36 - R50/53	10145P/B	L01940-017	5 m met klassieke techniek
Valdor [®] EXPERT	N	R50/53	10090P/B	L01939-017	20 m met 90% driftreducerende techniek
Zapper [®]	N	R50/53	9170P/B	L01518-017	20 m met 75% driftreducerende techniek

Bayer Environmental Science – Groene ruimten

Onderhoud en beheersen van de vegetatie



Binnen de Bayer-groep biedt de afdeling Bayer Environmental Science – Groene ruimten een waaier aan innovatieve en effectieve oplossingen, die beantwoorden aan de marktbehoeften.



Bayer Environmental Science – Groene ruimten heeft als hoofdactiviteit het onderhoud van niet agrarische zones zoals:

- groene ruimten (begraafplaatsen, paden,...),
- vervoersnetwerken (bermen, snelwegen, spoorwegen, trambeddingen,...),
- industrieterreinen,
- golfbanen en sportvelden,
- bosbouw,
- boomkwekerijen.



Steeds innovatievere en efficiëntere producten op de markt brengen

Doel : innovatie, know-how en expertise creëren, bevorderen en ter beschikking stellen van de professionelen, actief op het vlak van groene ruimten, teneinde hen in staat te stellen oplossingen aan te reiken, met aandacht voor de volksgezondheid en de veiligheid.

- Bestrijden van invasieve en allergene onkruiden,
- De troeven die groene ruimten bieden, optimaliseren: omdat wij deze planten beschermen, zijn ze in staat meer koolstofdioxide (CO₂) op te vangen en op te slaan,
- Het onderhouden van de groene ruimten zodat ze een gezellige leefruimte en een bron van recreatie en ontspanning worden,
- Het aanmoedigen van een duurzaam beheer van ons milieu,
- Bijdragen tot het veiliger maken van wegen, snelwegen, spoorwegen.

Innovatie

Verpakkingen

Nieuwe verpakkinglijn

Smartline

Met engagement naar duurzame ontwikkeling toe en met respect voor de toekomst van ons milieu, heeft Bayer een veiliger innovatief assortiment verpakkingen ontwikkeld. De gebruikers zullen kunnen genieten van de vele voordelen van dit unieke assortiment Smartline-verpakkingen.

Pluspunten



Betere visibiliteit

- **Bayer-logo** op de dop (bovenaan en op de zijkant), de fles en het etiket
- **Uniek sluitingssysteem** (verzegelde kindveilige dop)
- Garantie qua **veiligheid en kwaliteit** (voorkomt namaak)
- Herkenbaar etiket (groter formaat voor een **betere visibiliteit**)



Duidelijk in gebruik

- **Doorzichtigheid van de verpakking** (productniveau kan exact afgelezen worden)
- **Gradatie aangebracht op de verpakking** (duidelijke aanduiding inhoud)



Engagement duurzame ontwikkeling

- Vermindering van de gebruikte hoeveelheid grondstof (b.v.: besparing van 10% voor een 5L-verpakking)
- Vermindering van de koolstof-voetafdruk (energiebesparing qua productie en transport)
- Vermindering van de hoeveelheid te recycleren verpakkingsmateriaal



Gemakkelijk in gebruik

- **Stevige ergonomische handgreep** (vergemakkelijkt het uitgieten van het product)
- **Dop die gemakkelijk met handschoenen kan los- / vastgedraaid worden** (gemakkelijk te openen en terug te sluiten)
- **Gegroefde onderkant** (meer grip)



Veiliger in gebruik

- **Brede flessenhals** (vergemakkelijkt het gecontroleerd uitgieten van het product en voorkomt spatten van het product)
- **Vorm en binnenbekleding van de fles** (verzekert een grondige, perfecte reiniging)






Nieuw design

Nieuw logo

Bayer Environmental Science – Groene ruimten trekt resoluut de kaart van de vernieuwing en de modernisering. De verpakkingen ogen frisser dankzij de introductie van nieuwe productlogo's.

- Het productlogo is onmiskenbaar verbonden met het Bayer-logo,
- Dynamischer design,
- Betere productherkenning.



Nieuwe etiketten

In het kader van de Smartline-verpakkingslijn, introduceert Bayer eveneens nieuwe productetiketten.

Betere herkenning van het product en de productfamilie dankzij een kleurrijker en duidelijker etiket. De lay-out zal geleidelijk aan gewijzigd worden.



Multi-channel ondersteuning

Uitgebreide info op het web

Bayer Environmental Science – Groene ruimten wenst de gebruikers op een efficiënte manier wegwijs te maken in haar productassortiment en heeft diverse tools ontwikkeld.

Club-vert.be: vernieuwde website met nog meer informatie

- Productinformatie (assortiment Bayer Environmental Science – Groene ruimten):
 - productetiketten,
 - veiligheidsfiches (MSDS),
 - technische fiches in PDF-formaat,
 - productfoto's, ...
- Contactgegevens van de dichtstbijzijnde Bayer-verdeler.



www.club-vert.be
WEBSITE VOOR GROENE RUIMTEN

Professionalen Groene ruimten

Tuinaanleggers, greenkeepers, ...

Programma voor tuinaanleggers, greenkeepers,...

Bayer heeft een onderhoudsprogramma ontwikkeld voor tuinaanleggers en greenkeepers voor het onderhoud van golfterreinen, sportvelden, grasperken en andere groene ruimten.

Waar en wanneer welk product gebruiken ?

De keuze voor een totale onkruidbestrijder hangt af van de situatie.

Zapper® en **Pistol® Flex** zijn totaalherbiciden met lange werkingsduur en kunnen ingezet worden ter bestrijding van een groot aantal onkruiden.

Zapper® is een totaalherbicide dat curatief en preventief werkt dankzij zijn bladwerking en anti-kiemende werking.

Pistol® Flex heeft een preventieve anti-kiemende werking en kan ook ingezet worden bij vroegtijdige na-opkomst. Dit product kan eveneens ingezet worden op een met onkruid bedekte bodem, in combinatie met een onkruidbestrijder op basis van glyfosaat (langdurige werking – bladwerking).

Valdor® Expert kan ingezet worden voor onkruidbestrijding tussen struiken. Dit product heeft eveneens een lange werkingsduur en dient toegepast te worden met een spuittoestel tussen sierbomen en sierstruiken.

Voor het bestrijden van engerlingen en emelten in golfterreinen of grasperken kan u **Merit® Turf** toepassen.

Ziekten in grasperken kunnen behandeld worden met behulp van **Chipco® Green**.

Alle bovengenoemde producten zijn mengbaar met Blauwe behandelingsindicator. Hierdoor ziet u duidelijk waar u het product reeds heeft toegepast en waar niet.

Oplossing		Dosis	Hoeveelheid water	Oppervlakte	Meer info op pagina
 Zapper®	Dé technische referentie en het belangrijkste product voor onkruidbestrijding in niet-agrarische zones (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	7 L - 10 L 70 ml - 100 ml	400 L - 600 L 5 - 10 L	Ha 100 m²	14 - 17
 Pistol® FLEX	De nieuwe totale onkruidbestrijder met preventieve werking, flexibel in gebruik, met een lange werkingsduur (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	500 g 10 g	300 L - 500 L 10 L - 15 L	Ha 200 m²	10 - 13
 Valdor® EXPERT	De nieuwe onkruidbestrijder met preventieve en anti-kiemende werking te gebruiken tussen sierbomen en sierstruiken (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	330 g 6,6 g	300 L - 500 L 10 L - 15 L	Ha 200 m²	18 - 21
 Merit® TURF	Insecticide (uit te strooien) inzetbaar tegen engerlingen en emelten in sportvelden, golfterreinen en rolgazon.	30 kg	Uit te strooien	Ha	22 - 23
 Chipco® Green	Fungicide met contactwerking ter bestrijding van een groot aantal ziekten in grasperken: sneeuwschimmel of winterfusarium, typhula, dollar spot, rode draad, helminthosporiose, bruine vlekken, anthracnose. Het product wordt ingezet op sportvelden, golfterreinen en grasperken.	20 L (12 - 30 L) 200 ml (120 - 300 ml)	500 L 5 - 10 L	Ha 100 m²	24 - 27
 Interface™ STRESSGARD	Breedwerkend bladfungicide met preventieve en curatieve werking. Interface™ Stressgard™ werkt doeltreffend op winterfusariose (Microdochium nivale), rooddraad (Laetisaria fuciformis) en dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa) in gazon.	10 L 100 ml	400 L - 600 L 4 - 6 L	Ha 100 m²	28 - 29
Blauwe behandelingsindicator IC001®	Blauwe indicatorkleurstof voor fytosanitaire toepassingen. Is mengbaar met diverse producten uit ons assortiment.	5 - 10 L	10 L		30 - 31

Product	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni
 Zapper®						
 Pistol® Flex						
 Valdor® Expert						
 Merit® Turf						
 Chipco® Green						
 Interface® Stressgard						
Blauwe behandelingsindicator IC001®						

Boomkwekerijen en speciale teelten



Programma voor boomkwekerijen en speciale teelten

Dankzij haar grote ervaring inzake Groene ruimten, reikt Bayer Environmental Science – Groene ruimten eveneens innovatieve oplossingen aan voor het onderhoud van boomkwekerijen en speciale teelten (rolgazon,...).

Waar en wanneer welk product gebruiken?

Valdor® Expert is een selectief herbicide met preventieve werking, dat kan ingezet worden voor het bestrijden van ongewenste onkruiden tussen bomen en struiken (kerstbomen, ...).

Merit® Turf daarentegen is de ideale oplossing voor het efficiënt bestrijden van engerlingen en emelten in rolgazon.

Ingeval van onkruid op paden biedt **Zapper®** de oplossing. **Zapper®** is een herbicide met een curatieve en preventieve werking en heeft een lange werkingsduur van minimum 4 maanden.

Reeds vroeg in het seizoen is **Pistol® Flex** het aangewezen product, gekenmerkt door zijn preventieve werking en inzetbaarheid ingeval van vroegtijdige na-opkomst.

Oplossing	Dosis	Hoeveelheid water	Oppervlakte	Meer info op pagina
Valdor® Expert De nieuwe onkruidbestrijder met preventieve en anti-kiemende werking te gebruiken tussen sierbomen en sierstruiken (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	330 g 6,6 g	300 L - 500 L 10 L - 15L	Ha 200 m²	18 - 21
Merit® Turf Insecticide (uit te strooien) inzetbaar tegen engerlingen en emelten in sportvelden, golfterreinen en rolgazon.	30 kg	Uit te strooien	Ha	22 - 23
Zapper® Dé technische referentie en het belangrijkste product voor onkruidbestrijding in niet-agrarische zones (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	7 L - 10 L 70 ml - 100 ml	400 L - 600 L 5 - 10 L	Ha 100 m²	14 - 17
Pistol® Flex De nieuwe totale onkruidbestrijder met preventieve werking, flexibel in gebruik, met een lange werkingsduur (preventieve werking en inzetbaar ingeval van vroegtijdige na-opkomst).	500 g 10 g	300 L - 500 L 10 L - 15 L	Ha 200 m²	10 - 13

	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December

Aanbevolen
 Mogelijk
 Niet gebruiken

Totale onkruidbestrijders Pistol Flex®





**Pistol®
FLEX**

Totale onkruidbestrijder voor groene ruimten met een preventieve anti-kiemende werking en vroegtijdige curatieve werking.

Tot 4 maanden werking !

Voor gebruik op onverharde, permanent onbeteelde terreinen.

Dit product kan eveneens ingezet worden op een met onkruid bedekte bodem, in combinatie met een onkruidbestrijder op basis van glyfosaat voor een curatieve werking.

EIGENSCHAPPEN

Pistol® Flex is een breedwerkende preventieve en vroegtijdig curatieve onkruidbestrijder. Het product heeft een breed werkingsspectrum.

Het houdt uw grond tot 4 maanden na de behandeling onkruidvrij.

Pistol® Flex wordt gebruikt voor het onkruidvrij maken van een onverharde ondergrond die op korte termijn (12 maanden) niet voor inzaaien of beplanting zal gebruikt worden.

Pistol® Flex combineert 2 actieve bestanddelen met een aanvullende werking: iodosulfuron-methyl-natrium en diflufenican (DFF).

WERKINGSWIJZE

Iodosulfuron-methyl-natrium: werkt in op de bladeren. Het product zet zich vast in de bovenste centimeters van de bodem. Door de systemische werking wordt het product doorheen de plant getransporteerd. Enkele dagen na de behandeling stopt de groei en stimuleert het product de afsterving van de scheuten.

Diflufenican: werkt in op de jonge blaadjes. De planten verschrompelen en verdwijnen. Indien in voor-opkomst aangebracht, vestigt diflufenican zich in de eerste centimeters van de bodem. Het heeft een contactwerking op de jonge scheuten van ontkiemende graangewassen.

Zo controleert **Pistol® Flex** kleine onkruiden en verhindert het de groei van nieuwe monocotyle en breedbladige onkruiden.



GEBRUIKSAANWIJZING

✓ Bereiding van de spuitoplossing

Voor u met de onkruidverdelging begint, is het noodzakelijk om de goede werking van de spuitapparatuur te controleren en ze te ijken. Wanneer u ook de te behandelen oppervlakte opmeet, weet u precies hoeveel liter mengsel u moet klaar maken zodat u na de behandeling geen overtollig product moet elimineren.

- Vul de tank van het spuittoestel voor 3/4 met water.
- Schud de bus en voeg de vereiste dosis toe.
- Vul aan met water tot het nodige volume en meng.

Totale onkruidbestrijders

Pistol® Flex

✓ Weersomstandigheden

Raadpleeg de meteo van uw regio en pas het product toe op een windstille, droge dag.

✓ Toepassingsapparatuur

Gebruik een spuittoestel met geprojecteerde straal, uitgerust met jet nozzles, meerstraal- of ketsdoppen, ongeacht of het toestel gesleept of gedragen wordt.

De spuitdruk dient laag gehouden te worden, maximum 2 bar, teneinde spuitdrift op gevoelige naburige zones te vermijden. Het gebruik van een afschermkap is aanbevolen voor de toepassing in de nabijheid van aangeplante zones of grasvelden.

✓ Toepassingsperiode

J F M A M J J A S O N D



TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

De WG-formulering (wateroplosbare korrels) vergemakkelijkt de dosering en het gebruik van het product.

Tijdstip van toepassing	Product	Gewas	Dosis per hectare	Dosis voor rugsproeier
Februari tot april	Pistol® Flex	op naakte bodem of weinig ontwikkelde vegetatie (opkomst 4 tot 6 blaadjes)	0,5 kg voor 300 tot 500 L spuitoplossing	10 g in rugsproeier van 10 L - 15 L voor 200 m ²
Februari tot juni	Pistol® Flex + bladherbicide op basis van glyfosaat	op met onkruid begroeide bodem, ontwikkelde vegetatie	0,5 kg voor 300 tot 500 L spuitoplossing + bladherbicide volgens de aanbevolen dosering	10 g in rugsproeier van 10 L - 15 L voor 200 m ² + bladherbicide volgens de aanbevolen dosering

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

✓ Tijdens de opslag

Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking, in een met de sleutel afgesloten lokaal, uit de buurt van voedingsmiddelen en drank, met inbegrip van diervoeding, en buiten het bereik van kinderen. De lokalen moeten fris en goed verlucht zijn.

✓ Tijdens het gebruik

- Alleen de hoeveelheid mengsel klaar maken die u nodig hebt.
- Beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril dragen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- Gebruiken als er geen wind is.
- De tankresten nooit in een riool, op een verharde oppervlakte, in een sloot of in de buurt van een waterpunt uitgieten.
- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).
- Voor de behandeling, het etiket en de productinformatie lezen.

VERPAKKING

Flacon van 500 g, verpakt per 12
10 zakjes van 10 g, verpakt per 12

KLASSE

Geen toxicologische classificatie
N - Milieugevaarlijk



**Pistol®
FLEX**

TOEPASSING

Pistol® Flex is efficiënt tegen talrijke monocotyle en dictioyle onkruiden.

Overzicht onkruiden gevoelig aan **Pistol® Flex**

(voor-opkomst en vroegtijdige na-opkomst, volgens onze huidige kennis en ervaring):

In voor-opkomst

Amarantus retroflexus L.* (papegaaiekruid)
Anagallis arvensis L.* (guichelheil)
Arenaria serpyllifolia L.* (zandmuur)
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.* (herderstasje)
Dittrichia graveolens (L.) Greuter* (kamferalant)
*Echinochloa crus-galli** (plat handjesgras)
*Euphorbia maculata** (straatwolfsmelk)
Geranium dissectum L.* (slipblad - ooievaarsbek)
*Herniaria glabra** (kaal breukkruid)
*Holcus mollis** (gladde witbol)
Lotus corniculatus L.* (gewone rolklaver)

Matricaria inodora L.* (reukloze kamille)
*Matricaria recutita** (echte kamille)
Medicago lupulina (hopklaver)
Oxalis corniculata L.* (gehoornde klaverzuring)
Papaver rhoeas L.* (klaproos)
Pastinaca sativa L. subsp. *Sativa** (pastinaak)
*Persicaria maculata** (Raff.) S.F.Gray* (perzikkruid)
*Plantago major** (grote weegbree)
Poa annua (straatgras)
*Poa trivialis** (ruw beemdgras)
Polygonum aviculare L.* (varkensgras)

Saxifraga hypnoides (mossteenbreek)
Sonchus oleraceus L. (gewone melkdistel)
Sonchus arvensis L.* (akkermelkdistel)
Spergula arvensis L.* (spurrie)
Trifolium dubium Sibth.* (kleine klaver)
Trifolium repens L. (witte klaver)
Veronica arvensis L. (veldereprijs)
Veronica hederifolia L.* (klimop-ereprijs)
Veronica persica Poir.* (grote ereprijs)

In voor-opkomst en vroegtijdige na-opkomst:

*Arabidopsis thaliana*** (zandraket)
Bellis perennis (madeliefje)
Bromus arvensis L. (dravik)
Cardamine hirsuta L. (kleine veldkers)
Cerastium arvense, L. (akkerhoornbloem)
Conyza canadensis (canadese fijnstraal)

Epilobium (basterdwederik)
*Erodium cicutarium*** (reigersbek)
Lactuca perennis (blauwe sla)
Leucanthemum vulgare (gewone margriet)
Myosotis arvensis (L.) Hill** (akkervergeet-mij-nietje)
Picris echioides (dubbelkelk)

Sagina procumbens (liggende vetmuur)
Senecio vulgaris L. (kruiskruid)
Sonchus arvensis L. (akkermelkdistel)
Senecio viscosus L. (kleverig kruiskruid)
Stellaria (muur)
Taraxacum officinale Web. (paardebloem)

* Informatie over na-opkomst ontbreekt.

** Informatie over voor-opkomst ontbreekt.

Pistol® Flex bevat: 1 % iodosulfuron-methyl-natrium, 36 % diflufenican

Erkeningsnr.: 9838P/B

Erkeningsnummer Luxemburg: L01900-017

Formulering: waterdispergeerbaar granulaat (WG)



Totale onkruidbestrijders Zapper®





Zapper®

Onkruidbestrijding op doorlaatbare permanent onbeteelde terreinen (wegen, paden,...). Totale onkruidbestrijding.

EIGENSCHAPPEN

Zapper® is een curatief herbicide met een langdurige werking dat de bodem gedurende minstens vier maanden onkruidvrij houdt. Dankzij de 2 actieve bestanddelen heeft het product een curatieve werking, dringt het via de bladeren in de plant en voorkomt het de ontkieming van zaadjes. **Zapper®** vormt een doeltreffende bestrijding van tal van ongewenste onkruiden die veel op paden en trottoirs voorkomen. Zijn langdurige werking maakt het mogelijk om het aantal behandelingen met herbicide te beperken tot het strikte minimum.

WERKINGSWIJZE

Zapper® wordt gebruikt op doorlaatbare permanent onbeteelde terreinen.

Glyfosaat: absorptie door de bladeren. Wordt via het sap vervoerd tot in de uiteinden van de wortels en wortelstokken. Werkt door het blokkeren van de biosynthese van aromatische aminozuren.

Diflufenican: absorptie door de jonge weefsels en contactwerking. Het product werkt hoofdzakelijk op het onkruid in, in voor-opkomst door via de groeipunt en de aan de oppervlakte liggende wortels in de ongewenste plant binnen te dringen.



GEBRUIKSAANWIJZING

✓ Voorbereiding van de bodem of de teelt

Zapper® wordt gebruikt op doorlatende plaatsen, uit de buurt van waterpunten of watergeulen.

✓ Voorbereiding van de spuitoplossing

Voor u met de onkruidverdelging begint, is het noodzakelijk om de goede werking van de spuitapparatuur te controleren en ze te ijken. Wanneer u ook de te behandelen oppervlakte opmeet, weet u precies hoeveel liter mengsel u moet klaar maken zodat u na de behandeling geen overtollig product moet elimineren.

Gedragen of getrokken spuittoestel, spuitoplossing klaarmaken in de tank

- Vul de tank van het spuittoestel voor 3/4 met water.
- Schud de bus en voeg de vereiste dosis toe.
- Vul aan met water tot het nodige volume en meng.
- Om de behandeling zichtbaar te maken, eventueel Blauwe behandelingsindicator I.C. 001® toevoegen aan de spuitoplossing.

TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

✓ Toegelaten gebruik: **Zapper®** wordt toegepast aan 7 - 10 L/ha.

Gebruikte apparatuur	Behandelde oppervlakte	Dosis product	Hoeveelheid water
Gedragen of getrokken spuittoestel	1 ha	7 L - 10 L	400 - 600 L
Rugsproeier	100 m²	70 ml - 100 ml	5 - 10 L

✓ Toepassingsperiode J F M A M J J A S O N D

Zapper® kan vroeg in het seizoen gebruikt worden, op jonge ongewenste onkruiden in volle groei. De vroegtijdige toepassing zorgt voor een bodem zonder onkruid die gedurende minstens vier maanden onkruidvrij blijft. Dat is te danken aan de langdurige werking van diflufenican waardoor het aantal herbicide-behandelingen tijdens het jaar beperkt kan worden tot het strikte minimum.

Totale onkruidbestrijders

Zapper®

✓ Toepassingsapparatuur

Zapper® wordt, na verdunning in water, gespoten. Daarvoor kunt u een spuitlans of spuitboom gebruiken, waarbij u het product gelijkmatig over de te behandelen oppervlakken spuit. Vermijd drift naar naburige aanplantingen en teelten. Gebruik daarom bij voorkeur speciale doppen voor herbiciden (sleet- of spiegeldoppen) met een druk van maximum 2 bar.

Toepassen met een afschermkap bij toepassing in de buurt van hagen, bloemperken, rozen en struiken. Niet toepassen in de directe nabijheid van bloemen en bloembollen (risico op spatten van het product). Raadpleeg de meteo en kies een dag zonder regen of wind. De vegetatie die u wilt behandelen, moet droog zijn. Het product niet aanbrengen bij temperaturen hoger dan 25°C.

✓ Behandelingsprogramma

Het gebruik van **Zapper®** maakt het mogelijk om de begroeiing over een lange periode onder controle te houden. In bijzonder moeilijke omstandigheden kan het nochtans nodig zijn om doorlevende onkruiden of grassen en tweezaadlobbigen die laat opschieten, een "bijbehandeling" te geven.



VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

Gelieve er bij de toepassing op te letten dat het product niet terecht komt op bladeren en groene plantendelen van bomen, struiken, grasperken en bloemperken die u wenst te behouden en niet beoogd zijn bij de onkruidbestrijding. Vermijd het afvloeien van het product naar andere gewassen of waterpunten.

✓ Tijdens de opslag

Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking, in een met de sleutel afgesloten lokaal, uit de buurt van voedingsmiddelen en drank, met inbegrip van diervoeding, en buiten het bereik van kinderen. De lokalen moeten fris en goed verlucht zijn.

✓ Tijdens het gebruik

- Alleen de hoeveelheid mengsel klaar maken die u nodig hebt.
- Beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril dragen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- Gebruiken als er geen wind is.
- De tankresten nooit in een riool, op een verharde oppervlakte, in een sloot of in de buurt van een waterpunt uitgieten.
- Zich onmiddellijk wassen ingeval van contact. Bij een irritatie of een malaise een arts raadplegen (toon hem indien mogelijk het etiket).
- De verpakkingen goed ledigen en 3 keer met water spoelen wanneer u de tank vult. Giet het spoelwater eveneens in de spuittank.
- De resten in de tank uitspoelen en het spoelwater vijf keer verdunnen om een overdosis te vermijden en het op een doorlatend oppervlak dat al behandeld is, spuiten.
- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).
- Voor gebruik, steeds het etiket en de productinformatie lezen.

VERPAKKING

Fles van 1L, verpakt per 12 en bus van 5L verpakt per 4.

KLASSE

Geen toxicologische classificatie.

N - Milieugevaarlijk.



Zapper®

TOEPASSING

Zapper® is doeltreffend op een groot aantal grassen en dicotylen.

Overzicht onkruiden gevoelig aan Zapper®

<i>Alopecurus myosuroides</i> (duist)	<i>Hypochaeris radicata</i> (biggenkruid)	<i>Prunella vulgaris</i> (gewone brunel)
<i>Amaranthus retroflexus</i> (papegaaikruid)	<i>Impatiens parviflora</i> (klein springzaad)	<i>Rumex</i> spp. (zuring)
<i>Arenaria serpyllifolia</i> (zandmuur)	<i>Juncus bufonius</i> (greppelrus)	<i>Sagina</i> spp. (sierlijke vetmuur)
<i>Artemisia vulgaris</i> (bijvoet)	<i>Laminsana communis</i> (akkerkool)	<i>Setaria viridis</i> (groene naalbaar)
<i>Arrhennaterum elatius</i> (glanshaver)	<i>Lolium multiflorum</i> (italiaans raaigras)	<i>Senecio jacobea</i> (jakobskruid)
<i>Atriplex patula</i> (uitstaande melde)	<i>Lotus corniculata</i> (gewone rolklaver)	<i>Senecio vulgaris</i> (klein kruiskruid)
<i>Avena fatua</i> (wilde haver)	<i>Matricaria chamomilla</i> (kamille)	<i>Silene conica</i> (kegelsilene)
<i>Barbarea vulgaris</i> (barbarakruid)	<i>Medicago lupulina</i> (hopklaver)	<i>Sonchus</i> spp. (melkdistel)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (herderstasje)	<i>Melilotus officinalis</i> (citroengele honingklaver)	<i>Spergula arvensis</i> (spurrie)
<i>Cerastium</i> spp. (hoornbloem)	<i>Mibora</i> spp. (dwerggras)	<i>Stellaria</i> (muur)
<i>Crepis</i> spp. (streepzaad)	<i>Myosotis arvensis</i> (vergeet-mij-nietje)	<i>Taraxacum officinale</i> (paardenbloem)
<i>Dactylis glomerata</i> (kroopaar)	<i>Papaver rhoeas</i> (klaproos)	<i>Trifolium repens</i> (witte klaver)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (bloedgierst)	<i>Pastinaca</i> spp. (pastinaak)	<i>Trifolium</i> spp. (klaver)
<i>Epilobium</i> spp. (basterdwederik)	<i>Picris ecchioides</i> (dubbelkelk)	<i>Urtica dioica</i> (grote brandnetel)
<i>Erigeron canadensis</i> (canadese fijnstraal)	<i>Plantago coronopus</i> (hertshoornweegbree)	<i>Veronica persica</i> (grote ereprijs)
<i>Festuca arundinacea</i> (rietzwengras)	<i>Plantago lanceolata</i> (hondsribbe)	<i>Veronica</i> spp. (ereprijs)
<i>Festuca pratensis</i> (beemdlangbloem)	<i>Plantago major</i> (grote weegbree)	<i>Vicia</i> spp. (wikke)
<i>Festuca ovina</i> (schapengras)	<i>Poa annua</i> (straatgras)	<i>Vulpia bromoides</i> (eekhoorngras)
<i>Galium mollugo</i> (glad walstro)	<i>Poa trivialis</i> (ruw beemdgras)	
<i>Geranium</i> spp. (ooievaarsbek)	<i>Polygonum aviculare</i> (varkensgras)	

Overzicht onkruiden gematigd gevoelig aan Zapper®

<i>Achillea millefolium</i> (duizendblad)	<i>Ambrosia artemisaefolia</i> (alsemambrosia)	<i>Heracleum sphondylium</i> (bereklaauw)
<i>Agropyron repens</i> (kweek)	<i>Bromus sterilis</i> (ijle dravik)	<i>Ranunculus repens</i> (boterbloem)
<i>Amaranthus ascendens</i> (amarant)	<i>Daucus carota</i> (peen)	

Overzicht onkruiden licht gevoelig aan Zapper®

<i>Convolvulus arvensis</i> (akkerwinde)
<i>Potentilla reptans</i> (vijfvingerkruik)
<i>Rubus</i> spp. (braam)

Overzicht onkruiden bestand tegen Zapper®

<i>Equisetum arvense</i> (paardestaart)
Mossen (mossen)

Zapper® bevat: 250 g/L glyfosaat, 40 g/L diflufenican (DFF)

Erkenningsnr: 9170P/B

Erkenningsnummer Luxemburg: L01518-017

Suspensie concentraat (SC)



Selectieve onkruidbestrijder

Valdor® Expert

Selectieve onkruidbestrijder tussen sierbomen en sierstruiken in kwekerijen en in open lucht.

EIGENSCHAPPEN

Valdor® Expert is een breedwerkende onkruidbestrijder voor het bestrijden van onkruiden in voor-opkomst en vroegtijdige na-opkomst voor toepassing tussen sierbomen en sierstruiken (in kwekerijen en in open lucht) aangeplant tijdens het voorjaar vóór de behandeling.

Normale toepassing: tijdens de vegetatieve rustfase van bomen en struiken.

Selectieve toepassing: tussen de rijen zonder de gewassen te raken, na vegetatieherstel.

Valdor® Expert combineert twee complementaire actieve stoffen, namelijk iodosulfuron-methyl-natrium en diflufenican.

WERKINGSWIJZE

Valdor® Expert is samengesteld uit twee complementaire actieve stoffen:

- ✓ **Iodosulfuron-methyl-natrium**: wordt opgenomen door de bladeren. Deze stof hecht zich vast in de bovenste centimeters van de bodem en verspreidt zich vervolgens systemisch over de gehele plant.
- ✓ **Diflufenican**: deze actieve stof wordt opgenomen door het bladweefsel van de jonge blaadjes, chlorotische vlekken ontstaan, gevolgd door een langzame necrose van de scheuten, waardoor ze afsterven.



GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de behandeling is het noodzakelijk het spuittoestel goed te controleren en te kalibreren. Bovendien is het noodzakelijk de berekening van de te behandelen oppervlakte goed uit te voeren teneinde geen spuitoverschotten te hebben.

- De spuittank 3/4 met water vullen.
- De benodigde hoeveelheid product toevoegen aan de spuittank.
- Wanneer de tank vol is, goed mengen.

TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

Innovatieve formulering, laatste generatie WG – water dispergeerbaar granulaat: onmiddellijke oplossing van de korrels, gelijkmatige korrels, gemakkelijk te doseren.

Breed werkingsspectrum (inbegrepen samengesteldbloemigen).

✓ Aanbevolen dosis

330 g **Valdor® Expert** per hectare.

Type toepassing	Tijdstip van toepassing	Gewasstadium	Gewas	Dosis	Hoeveelheid water
Normaal	December – februari	Vegetatieve rustfase (vóór het uitlopen van de knoppen)	Naakte bodem / weinig veronkruidde bodem (4-6 bladeren)	0,33 kg / ha 6,6 g / 200 m²	300 tot 500 L / ha 10 - 15 L / 200 m²
Selectief (zonder de gewassen te raken)	Maart - mei	Na vegetatieherstel	Naakte bodem / weinig veronkruidde bodem (4-6 bladeren)	0,33 kg / ha 6,6 g / 200 m²	300 tot 500 L / ha 10 - 15 L / 200 m²

✓ Toepassingsperiode **J F M A M J J A S O N D**

✓ Wachtermijn alvorens te betreden : 6 uur

✓ Aantal toegelaten toepassingen : 1 toepassing per jaar



Valdor[®]
EXPERT



- ✓ **Zichtbare werking** : 2 tot 6 weken na de toepassing
- ✓ **Nawerking** : houdt de bodem onkruidvrij gedurende 3 tot 4 maanden

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

✓ Weersomstandigheden

Volg de regionale weersomstandigheden. Toepassing uitvoeren tijdens een windstille en droge dag.

✓ Toepassingsapparatuur

Product toepassen met een motorisch aangedreven sproeier of een rugsproeier (geslepen of gedragen), bevattende ketsdoppen of spleetdoppen. De spuitdruk dient laag gehouden te worden, maximum 2 bar, teneinde spuitdrift op gevoelige naburige zones te vermijden.

✓ Bijzondere aanbevelingen

Valdor[®] Expert kan éénmaal per jaar toegepast worden tussen sierbomen en sierstruiken in open lucht en in kwekerijen (aangeplant minstens in het voorjaar voor de behandeling). Een vroegtijdige behandeling met **Valdor[®] Expert** is aangewezen teneinde de bodem onkruidvrij te hebben op het ogenblik dat de vegetatie zich herstelt. Bij selectieve toepassing dient er nauwkeurig op toegezien te worden dat het product niet in aanraking komt met de bladeren en de groene delen van niet-beoogde bomen en struiken.

✓ Tijdens de opslag

Bewaar het product in zijn originele verpakking in een afgesloten ruimte weg van alle drank en etenswaren, deze voor dieren inbegrepen, en buiten het bereik van kinderen. De lokalen dienen koel te zijn en voorzien van ventilatie.

Selectieve onkruidbestrijder

Valdor® Expert

✓ Tijdens gebruik

- Bereid enkel de benodigde spuihoeveelheid.
- Draag beschermende kledij, handschoenen en veiligheidsbril.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Het product toepassen bij windstil weer.
- De restanten nooit uitgieten in de riolering, in een sloot of in de buurt van een waterpunt.
- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).

✓ Na gebruik

- Het product of de restanten ervan koel en beschermd tegen licht bewaren in de originele verpakking.
- Voor elk gebruik, het etiket en de informatie betreffende het product lezen.

VERPAKKING

Flacon van 165 g, verpakt per 20

10 zakjes van 6,6 g, verpakt per 12

KLASSE

Geen toxicologische classificatie

N – Milieugevaarlijk

TOEPASSING

Valdor® Expert is werkzaam tegen een groot aantal onkruiden.

Het product houdt de bodem onkruidvrij gedurende minstens 4 maanden.

Lijst van onkruiden die gevoelig zijn aan **Valdor® Expert** (werkzaamheid > 80%)

(voor-opkomst en vroegtijdige na-opkomst, volgens onze huidige kennis en ervaring):

Voor-opkomst

*Alopecurus myosuroides** (duist)
*Alopecurus sp.** (vossenstaart)
Amaranthus retroflexus (papegaaikruid)
Anagallis arvensis L.* (guichelheil)
Arabidopsis thaliana (zandraket)
Cerastium arvense (akkerhoornbloem)
*Chenopodium album** (melganzenvoet)
Epilobium (basterdwederik)
Erigeron canadensis (canadese fijnstraal)
Erodium cicutarium (reigersbek)
Galium aparine (kleefkruid)
Lactuca serriola (kompassla)
Matricaria chamomilla (kamille)

Mercurialis annua (tuinbingelkruid)
*Poa annua** (straatgras)
Polygonum aviculare (varkensgras)
*Polygonum convolvulus** (zwalmtong)
Polygonum persicaria (perzikkruid)
Ranunculus arvensis (akkerboterbloem)
*Senecio vulgaris** (klein kruiskruid)
Sonchus oleraceus L.* (gewone melkdistel)
Sonchus asper (gekroesde melkdistel)
*Solanum nigrum** (zwarte nachtschade)
Stellaria media (vogelmuur)
Trifolium sp. (klaver)
*Veronica persica** (grote ereprijs)

Vroegtijdige na-opkomst

Cerastium arvense (akkerhoornbloem)
Erigeron canadensis (canadese fijnstraal)
Matricaria chamomilla (kamille)
Sonchus asper (gekroesde melkdistel)
Stellaria media (vogelmuur)

* Nawerking van twee maanden



Valdor[®]
EXPERT

SELECTIVITEIT (bewezen op meer dan 60 soorten)

Selectiviteit ten aanzien van siergewassen werd geverifieerd bij normale toepassing in kwekerijen tijdens de vegetatieve rustfase, en bij selectieve toepassing na vegetatieherstel.

✓ Normale toepassing tijdens vegetatieve rustfase

Uit eigen ervaring is gebleken dat de volgende soorten en variëteiten tolerant zijn aan **Valdor[®] Expert**:

Loofbomen en struiken

<i>Acer campestre</i> (spaanse aak)	<i>Catalpa bignonioides</i> (groene trompetboom)	kardinaalsmuts)	<i>Mahonia aquifolium</i> (mahonia)	<i>Ribes nigrum</i> (zwarte bes)
<i>Acer palmatum</i> (japanse esdoorn)	<i>Corylus maxima</i> (purpurea)	<i>Hibiscus</i> sp. (hibiscus)	<i>Malus 'Alden'</i> (sierappel)	<i>Ribes sanguineum</i> (rode ribes)
<i>Alnus cordata</i> (hartbladige els)	<i>Cotinus coggygria</i> (pruikenboom)	<i>Hypericum 'Hidcote'</i> (hertshooi)	<i>Philadelphus</i> sp. (boerenjasmijn)	<i>Rosa rugosa</i> (rimpelroos)
<i>Amelanchier canadensis</i> (canadees krentenboompje)	<i>Cotoneaster franchetii</i> (dvergmispel)	<i>Ilex aquifolium</i> (hulst)	<i>Photinia fraseri</i> (glansmispel)	<i>Sambucus nigra</i> (gewone vlier)
<i>Aronia prunifolia</i> (zwarte appelbes)	<i>Deutzia x magnifica</i> (deutzia)	<i>Liquidambar styraciflua</i> (amberboom)	<i>Platanus hybrida</i> (plataan)	<i>Spiraea billardii</i> (struikspirea)
<i>Betula utilis</i> (witte himalayaberk)	<i>Elaeagnus ebbingei</i> (olijfwilg)	<i>Liriodendron tulipifera</i> (amerikaanse tulpenboom)	<i>Prunus laurocerasus</i> (laurierkers)	<i>Syringa vulgaris</i> (gewone sering)
<i>Buxus sempervirens</i> (buxus)	<i>Elaeagnus pungens</i> (goudbonte olijfwilg)	<i>Magnolia liliiflora</i> 'Nigra' (leliemagnolia)	<i>Prunus lusitanica</i> (portugese laurierkers)	<i>Tamarix aphylla</i> (tamarisk)
<i>Caryopteris clandonensis</i> (baardbloem)	<i>Euonymus japonica</i> (japanse		<i>Quercus pubescens</i> (donzige eik)	<i>Viburnum tinus</i> (viburnum)

Naaldbomen en struiken

<i>Cedrus deodara</i> (deodarceder)	<i>Picea pungens</i> (blauwspar)
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (californische cipres)	<i>Pinus austriaca</i> (oostenrijkse den)
<i>Cupressocyparis leylandii</i> (leylandcipres)	<i>Pinus nigra</i> (zwarte den)
<i>Juniperus media</i> (chinese jeneverbes)	<i>Taxus baccata</i> (venijnboom)
<i>Picea abies</i> (tjinspar)	<i>Thuja plicata</i> (reuzenlebensboom)

Klimplanten

<i>Lonicera tatarica</i> (tartaarse struikkamperfoelie)
<i>Lonicera xylosteum</i> (rode kamperfoelie)

Planten (zure grond)

<i>Magnolia grandiflora</i> (grandiflora)
<i>Rhododendron 'Anna kreushye'</i> (rododendron 'Anna kreushye')

Daarentegen is uit eigen ervaring gebleken dat de volgende soorten en variëteiten gevoelig zijn aan **Valdor[®] Expert** (toepassing in vegetatieve rustfase) :

Loofbomen en struiken

<i>Abelia 'Edward goucher'</i> (abelia 'Edward goucher')	<i>Ceanothus</i> sp. (amerikaanse sering)	<i>Cornus florida</i> (amerikaanse kornoelje)	<i>Spiraea vanhouttei</i> (spierstruik)
<i>Aronia arbutifolia</i> (appelbes)	<i>Cornus alternifolia</i> (kornoelje)	<i>Corylus avellana</i> (hazelaar)	<i>Weigelia</i> sp. (weigelia)
	<i>Cornus alba</i> (witte kornoelje)	<i>Ligustrum japonicum</i> (japanse liguster)	

Remarque: listes non-exhaustives établies d'après l'état actuel de nos connaissances.

✓ Selectieve behandeling wanneer de vegetatie actief groeit

Uit eigen ervaring is gebleken dat de volgende soorten en variëteiten tolerant zijn aan **Valdor[®] Expert**:

Loofbomen en struiken

<i>Acer campestre</i> (spaanse aak)	<i>Catalpa bignonioides</i> (groene trompetboom)	<i>Hibiscus</i> sp. (altheastruik)	<i>Morus alba</i> (witte moerbeil)	<i>Quercus palustris</i> (moerseek)
<i>Aesculus carnea</i> (rode paardenkastanje)	<i>Celtis australis</i> (europese netelboom)	<i>Hibiscus syriacus</i> (tuinhibiscus)	<i>Morus bombycis</i> (japanse moerbeil)	<i>Quercus robur</i> (zomerseik)
<i>Aesculus hippocastanum</i> (witte paardenkastanje)	<i>Corylus colurna</i> (boomhazelaar)	<i>Hypericum 'Hidcote'</i> (hertshooi)	<i>Morus kagayama</i> (moerbeil)	<i>Quercus pubescens</i> (donzige eik)
<i>Albizia julibrissin</i> (perzische slaapboom)	<i>Cotinus coggygria</i> (pruikenboom)	<i>Ilex aquifolium</i> (hulst)	<i>Olea europea</i> (olijfboom)	<i>Quercus rubra</i> (amerikaanse eik)
<i>Alnus cordata</i> (hartbladige els)	<i>Deutzia x magnifica</i> (deutzia)	<i>Juglans regia</i> (walnoot)	<i>Paulownia tomentosa</i> (keizersboom)	<i>Quercus</i> sp. (eik)
<i>Alnus incana</i> (witte els)	<i>Elaeagnus ebbingei</i> (olijfwilg)	<i>Koeleria paniculata</i> (chinese vernisboom)	<i>Philadelphus</i> sp. (boerenjasmijn)	<i>Ribes sanguineum</i> (rode ribes)
<i>Alnus glutinosa</i> (zwarte els)	<i>Elaeagnus pungens</i> (goudbonte olijfwilg)	<i>Lavandula 'Edelweiss'</i> (lavendel)	<i>Photinia fraseri</i> (glansmispel)	<i>Sambucus nigra</i> (gewone vlier)
<i>Amelanchier canadensis</i> (canadees krentenboompje)	<i>Euonymus japonica</i> (japanse kardinaalsmuts)	<i>Ligustrum ovalifolium</i> (liguster)	<i>Platanus hybrida</i> (plataan)	<i>Spiraea billardii</i> (struikspirea)
<i>Berberis 'Auricomma'</i> (zuurbes)	<i>Fagus sylvatica</i> (beuk)	<i>Liquidambar styraciflua</i> (amberboom)	<i>Populus nigra</i> (zwarte populier)	<i>Tamarix aphylla</i> (tamarisk)
<i>Betula utilis</i> (witte himalayaberk)	<i>Fraxinus oxycarpa</i> (fraxinus oxycarpa)	<i>Liriodendron tulipifera</i> (amerikaanse tulpenboom)	<i>Prunus cerasifera</i> (kerspruim)	<i>Tilia platyphyllos</i> (zomerlinde)
<i>Betula pendula</i> (ruwe berk)	<i>Fraxinus ornus</i> (pluimes)	<i>Lonicera xylosteum</i> (rode kamperfoelie)	<i>Prunus laurocerasus</i> (laurierkers)	<i>Tilia cordata</i> (winterlinde)
<i>Caryopteris clandonensis</i> (baardbloem)	<i>Gleditsia</i> sp. (valse christusdoorns)	<i>Mahonia aquifolium</i> (mahonia)	<i>Prunus myrobolana</i> (mirabel)	<i>Viburnum</i> sp. (viburnum)
			<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer' (leisierpeer)	<i>Viburnum tinus</i> (viburnum)
			<i>Quercus cerris</i> (moseik)	

Naaldbomen en struiken

<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (californische cipres)	<i>Picea pungens</i> (blauwspar)	<i>Taxus baccata</i> (venijnboom)
<i>Cupressocyparis leylandii</i> (leylandcipres)	<i>Pinus nigra</i> (zwarte den)	<i>Thuja occidentalis</i> (lebensboom)
<i>Picea abies</i> (tjinspar)	<i>Pinus pinea</i> (parasolden)	

Daarentegen is uit eigen ervaring gebleken dat de volgende soorten en variëteiten gevoelig zijn aan **Valdor[®] Expert** (behandeling wanneer de vegetatie actief groeit):

Loofbomen en struiken

<i>Cornus alba</i> (witte kornoelje)
<i>Cornus florida</i> (amerikaanse kornoelje)

Planten (zure grond)

<i>Magnolia grandiflora</i> (grandiflora)
<i>Rhododendron 'Anna kreushye'</i> (rododendron 'Anna kreushye')



Valdor[®] Expert bevat: 1% iodosulfuron-methyl-natrium en 36% diflufenican

Erkenningsnumme: 10090P/B

Erkenningsnummer Luxemburg: L01939-017

Water dispergeerbaar granulaat (WG)

Insecticide

Merit® Turf

Insecticide tegen engerlingen en emelten in gazons en grasvelden.



EIGENSCHAPPEN

- ✓ **Merit® Turf** werkt tegen zowel larven van de meikever als larven van de langpootmug.
- ✓ **Merit® Turf** is een strooigranulaat, het product dient niet opgelost te worden hetgeen maakt dat het gemakkelijk toepasbaar is.
- ✓ De larven, die aanzienlijke schade veroorzaken, worden rechtstreeks en onrechtstreeks bestreden door de actieve stof van **Merit® Turf**.
- ✓ 1 behandeling per jaar.

WERKINGSWIJZE

Breng **Merit® Turf** aan op een droge zode bij een bewolkte hemel en/of dag met geringe zonneschijn. In de praktijk wordt de voorkeur gegeven aan een toepassing in de avonduren.

1-jarige engerlingen (o.a. rozenkever)

Voor de beste werking bij 1-jarige engerlingen past u **Merit® Turf** toe in het vroege larvestadium. Normaal is dat 2 tot 6 weken na het waarnemen van de vluchtpiek van de volwassen kevers. Ook daarna kan **Merit® Turf** succesvol ingezet worden op plaatsen waar engerlingen waargenomen worden of schade zichtbaar is. Na augustus heeft **Merit® Turf** beduidend minder effect, omdat de engerlingen dan te groot en sterk zijn.

Meerjarige engerlingen (o.a. meikever)

Voor engerlingen die pas na meerdere jaren uitvliegen, werkt **Merit® Turf** alleen in het vroege larvestadium, 2 tot 6 weken na de vluchtpiek. Een latere toepassing wordt niet aanbevolen.

Dezelfde behandeling dient toegepast te worden ingeval van emelten.



**Merit®
TURF**

Insecticide

Engerlingen - Aanbevolen toepassingsperiode engertingen : 15 mei tot 15 juni.

Emelten - Aanbevolen toepassingsperiode emelten : 15 augustus tot 15 september.

TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

Merit® Turf is een strooigranulaat dat aangebracht dient te worden middels een geschikte granulaatstrooier, die voor een gelijkmatige verdeling van **Merit® Turf** zorgt.

Gezien de diversiteit tussen de granulaatstrooiers is het aan te bevelen eerst een proefgebied (100 m²) te behandelen om de juiste instelling vast te stellen.

Doseringschema		
Apparatuur	Oppervlakte	Merit® Turf
Handbediende granulaatstrooier	100 m²	300 g
	500 m²	1,5 kg
Getrokken granulaatstrooier	1 ha	30 kg

Na het uitstrooien van **Merit® Turf** dient er berekend te worden met 5 tot 15 mm water. Hierdoor kan het granulaat de toplaag goed binnendringen en wordt de werking versneld. Toepassing voorafgaand aan een regenbui is ook mogelijk.

J F M A M J J A S O N D

HOE WERKT Merit® Turf ?

1. Na het aanbrengen van **Merit® Turf** en de berekening komt de werkzame stof, imidacloprid, geleidelijk beschikbaar, het wordt gebonden aan organische stof en/ of wordt opgenomen door de grasplant zelf.
2. De engertingen en/of emelten komen in aanraking met de werkzame stof imidacloprid door enerzijds direct contact en anderzijds door opeten van gras of plantwortels.
3. Imidacloprid verstoort de prikkeloverdracht in het centrale zenuwstelsel van het insect waardoor de lichaamsfuncties uitvallen en de larve sterft.

RESULTATEN

- De resultaten van diverse meerjarige veldproeven met **Merit® Turf** hebben aangetoond dat gemiddeld genomen 80% verbetering werd gemeten in de periode van 4,5 tot 11 maanden na behandeling.
- Op diverse locaties werden voorafgaand populaties geteld tot over 1.000 stuks per m².
- Het gebruik van **Merit® Turf** leidt tot een 50% verbetering van het 'greening' effect en daarnaast verbeterde de vitaliteit van de zode in behandelde gebieden met 90%.

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).
- Voor elk gebruik, eerst het etiket en de productinformatie lezen.

VERPAKKING

5 kg

KLASSE


Xi - Irriterend

N - Milieugevaarlijk

Merit® Turf bevat 0,5 % imidacloprid
Erkeningsnr. : 10145P/B
Erkeningsnummer Luxemburg : L01940-017
Symbolen: Xi, N
Granulaat




Fungicide Chipco® Green



Winterfusariose



Typhula



Bladvlekkenziekte



Rode draad



Dollar spot



Bruine vlekken



Anthracnose



Chipco[®] Green

Fungicide

Preventief fungicide tegen de meest voorkomende ziektes in grasperken.

EIGENSCHAPPEN

Chipco[®] Green is een preventief contactfungicide dat de ontkieming van de sporen verhindert en de ontwikkeling van sommige voor het gras schadelijke schimmels blokkeert. **Chipco[®] Green** is een specifiek fungicide in de strijd tegen schimmelziekten in grasperken.

Chipco[®] Green is een fungicide dat olie bevat, wat het schimmeldodende effect van iprodione versterkt en verlengt. Door de olie hecht het actieve bestanddeel zich beter aan de plant en wordt het minder snel door regen of beregening weggespoeld. Tevens kunnen greenkeepers het zwepen van de greens over langere periodes spreiden, vermits regen en dauw van de bladeren glijden. Bovendien kan een minder vochtige omgeving, waarin zich ziektes kunnen ontwikkelen, gecreëerd worden.

WERKINGSWIJZE

Preventief contactfungicide dat de ontkieming van sporen verhindert en de ontwikkeling van mycelium blokkeert.

GEBRUIKSAANWIJZING

✓ Voorbereiding van de bodem of de teelt

Behandelen als er geen dauw is.

✓ Bereiding van de spuitoplossing

Voor u met de behandeling begint, is het noodzakelijk om de goede werking van de spuitapparatuur te controleren en ze te ijken. Wanneer u ook de te behandelen oppervlakte opmeet, weet u precies hoeveel liter spuitoplossing u moet klaarmaken zodat u na de behandeling geen overtollig product moet elimineren.

Gedragen of getrokken spuittoestel, spuitoplossing klaargemaakt in de tank:

- Vul de tank van het spuittoestel voor 3/4 met water.
- Schud de bus en voeg de vereiste dosis toe.
- Vul aan met water tot het nodige volume en meng.
- U kunt **Blauwe behandelingsindicator I.C. 001[®]** aan het mengsel toevoegen zodat u ziet welke delen al behandeld zijn.

TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

Chipco[®] Green moet gebruikt worden in overeenstemming met de te behandelen ziekte.

De volgende dosissen worden aanbevolen :

J F M A M J J A S O N D

Gebruikt materiaal		Behandeld oppervlak	Dosis	Hoeveelheid water
Gedragen of getrokken spuittoestel	Winterfusariose	1 ha of 10.000 m ²	20 L / ha	500 L
	Rode draad		20 L / ha	
	Dollar Spot		12 L / ha	
	Bruine vlekken		12 L / ha	
	Helminthosporioses		20 L / ha	
	Sneeuwschimmel		20 L / ha	
	Typhula		30 L / ha	
Rugspuit	Winterfusariose	100 m ²	200 ml	5 - 10 L
	Rode draad		200 ml	
	Dollar Spot		120 ml	
	Bruine vlekken		120 ml	
	Helminthosporioses		200 ml	
	Sneeuwschimmel		200 ml	
	Typhula		300 ml	

Fungicide

Chipco® Green

✓ Gebruiksomstandigheden

Algemeen gesproken verdient een preventieve behandeling de voorkeur op een curatieve behandeling, ook al wordt die in het beginstadium toegediend. Die aanpak is mogelijk dankzij de langdurige werking van **Chipco® Green**, 20 à 28 dagen afhankelijk van de weersomstandigheden. **Chipco® Green** mag het hele jaar door gebruikt worden. Het is echter niet raadzaam om het product in volle zon, op de warme uren van de dag, of wanneer de temperatuur hoger is dan 25 °C te spuiten.

✓ Aanwending

Chipco® Green wordt gespoten na verdunning in water. Het product kan met een lans of een spuitboom toegepast worden. Let op een gelijkmatige verdeling van het product over de te beschermen oppervlakte. Gebruik 5 liter spuitoplossing per 100 m² te behandelen oppervlakte (golfgreens) en in het algemeen 500 liter per hectare.

✓ Veiligheidsintervallen na de behandeling

24 uur wachten vooraleer opnieuw te maaien (golfgreens). Voor sportvelden en siergazons wacht u 48 uur.

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

Het is niet raadzaam **Chipco® Green** met andere fytosanitaire producten te mengen. Doet de gebruiker het toch, dan valt dat volledig onder zijn verantwoordelijkheid.

✓ Tijdens de opslag

- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking, in een met de sleutel afgesloten lokaal, uit de buurt van voedingsmiddelen en drank, met inbegrip van diervoeding, en buiten het bereik van kinderen. De lokalen moeten fris en goed verlucht zijn.

✓ Tijdens het gebruik

- Alleen de hoeveelheid spuitoplossing klaar maken die u nodig hebt.
- Beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril dragen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- Zich onmiddellijk wassen in geval van contact. Bij irritatie of een malaise een arts raadplegen (toon hem indien mogelijk het etiket).
- De verpakkingen goed ledigen en 3 keer met water spoelen wanneer u de tank vult. Giet het spoelwater eveneens in de spuittank.
- Gebruiken als er geen wind is.
- Niet te dicht in de buurt van waterlopen, waterplassen, irrigatiekanalen spuiten.
- De tankresten nooit in een riool, op een binnenplaats, in een sloot of in de buurt van een waterpunt uitgieten.
- De resten in de tank uitspoelen en het spoelwater vijf keer verdunnen om een overdosis te vermijden en het op een doorlatend oppervlak dat al behandeld is, spuiten.
- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).
- Voor elk gebruik, het etiket en de productinformatie lezen.

VERPAKKING

Bus van 5 L, verpakt per 4.

KLASSE

Xn – Schadelijk

N – Milieugevaarlijk



Chipco[®] Green

TOEPASSING

De behandeling van de bovengrondse delen van grasperken: fusariose, bruine vlekken, dollar spot, rode draad, diverse ziekten.

Ziekten	Beschrijvingen	Factoren die de ziekte in de hand werken
Winterfusariose (<i>Microdochium nivale</i>)	- ronde plekken (2-60 cm) van een blauwgrijze kleur die roze en vervolgens bruinrood verkleuren. - kan zich onder de sneeuw ontwikkelen. - het midden kan opnieuw groen worden. - een bruine ring rond de plek.	Herfst, winter, lente: - vochtige gebieden. - te veel ammoniakstikstof (NH₄) en organisch stikstof in het algemeen. - struisgras, beemdgras. - alkalische bodem en sproeiwater.
Typhula (<i>Typhula incarnata</i>)	- onregelmatige, afgeronde plekken (2-20 cm), een grijswit midden, dicht mycelium. - vervolgens vorming van kleine, zwarte scleroten op de bladeren en aan de plantvoet.	Winter, lente - dooi van de sneeuw op een bevroren bodem. - te late bemesting die tot een laattijdige groei leidt (oktober, november). - struisgrassen, Engels raaigras.
Kiemziektes: helminthosporiose, anthracnose (<i>Fusarium culmorum</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	- een plots afsterven van jonge planten in ronde vlekken (2 à 10 cm). - de groeipunt rot en de plant heeft geen steun meer. - bij <i>Fusarium culmorum</i> is er een rode ring rond de vlek.	Lente, herfst - koud en vochtig weer. - stilstaand water. - slecht gedraineerde bodem. - besmet zaadgoed. - te vroeg of te laat op het jaar gezaaid. - te dicht of te diep gezaaid.
Rode draad (<i>Laetisaria fuciformis</i>)	- onregelmatige vlekken. - een heel snelle verspreiding. - bij vochtig weer wordt er een rozerode gelatineachtige uitscheiding gevormd, vandaar de naam rode draad.	Lente, herfst, zomer met gemiddelde temperaturen - te weinig groeikracht. - te weinig mest, vooral stikstof. - gemiddelde temperatuur met hoge vochtigheid. - wind, gereedschap en schoenen verspreiden de draden en dus de ziekte. - rode zwenkgrassen en Engels raaigras.
Dollar spot (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>)	- kleine, ronde vlekken (2-5 cm) die in elkaar kunnen overgaan. - de bladeren drogen in het midden uit, de boven- en onderliggende weefsels blijven tijdens de aanval groen, en drogen later helemaal uit. - wit mycelium dat bij dauw zichtbaar is.	Zomer, herfst - hoge temperaturen en vochtigheid. - dauw. - viltlaag. - te veel nitraatstikstof (NO₃). - rode zwenkgrassen, beemdgrassen.
Bruine vlekken (<i>Rhizoctonia solani</i>)	- ronde bruine vlekken (5 cm à 2 m) omgeven door een donkere ring (rookwaas) in paarsachtig groen. - de bladeren hebben een gegolfde rand alsof er een vlam bijgehouden werd.	Zomer, herfst - hoge temperaturen en vochtigheid. - stilstaande lucht tussen bomen en heesters. - viltlaag. - te veel stikstof. - struisgrassen, beemdgrassen, raaigras.
Anthracnose (<i>Colletotrichum graminicola</i>)	- éénjarig beemdgras: kanariegele verkleuring met jonge bladeren die naar roodoranje neigen. - struisgras: erg onregelmatige vlekken (5 à 50 cm en +), het gras wordt wit (sterke gelijkenis met pythium). - soms vorming van donkere vruchtlichamen met doornen op de voet van de planten.	Lente, herfst - samengedrukte, arme, platgetrapte bodem. - stilstaand water. - viltlaag. - éénjarig beemdgras, struisgrassen.




Chipco[®] Green bevat: 250 g/L iprodione
 Erkenningsnummer: 7497P/B
 Erkenningsnummer Luxemburg: L01902-017
 Suspensie concentraat (SC)

Fungicide

Interface™ Stressgard™




Interface™ StressGard™ is werkzaam tegen



Fusarium



Rooddraad



Dollar Spot

EIGENSCHAPPEN

- ✓ **Interface™ StressGard™** zorgt voor ongekende resultaten* tegen de belangrijkste gazonziektes met gezonder en resistenter gras als resultaat.
- ✓ **Interface™ StressGard™** is ons eerste fungicide met **StressGard™** Formulation Technology. De formulering zorgt voor een betere werking van de actieve stoffen, voor een superieure ziektebestrijding met een gezondere en meer resistente grasmat als resultaat.

TOEPASSING

Breng **Interface™ StressGard™** aan op golfbanen en sportvelden.

- ✓ Gedurende de lente/zomer en herfst wanneer het gras actief groeit; gedurende de winter wanneer het gras langzaam groeit of bijna in rust is; of in tijden van verhoogde schimmeldruk.
- ✓ Voor de beste resultaten, toepassen vóór of bij de eerste tekenen van ziekte om beschadiging tegen te gaan.

Toepassingsmateriaal			
Sproeier voor grote volumes		Rugsproeier	
Dosis per ha	Water per ha	Dosis per 100 m ²	Water per 100 m ²
10 L	400 – 600 L	100 ml	4-6 L
		Dosis per 500 m ²	Water per 500 m ²
		500 ml	20-30 L

TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN) J F M A M J J A S O N D

*Vergeleken met de huidige fungiciden van Bayer



**Interface™
STRESSGARD™**

WERKINGSWIJZE INTERFACE™ STRESSGARD™


Interface™ StressGard™ heeft een dubbele werking: contactwerking en mesosistemische werking.

Contactwerking

- ✓ Het fungicide blijft achter op het bladoppervlak en fungeert als schild.
- ✓ Het fungeert als bescherming tegen aantasting.

Mesosistemische werking

- ✓ Creëert een waterbestendige laag op het plantoppervlak.
- ✓ Reservoir behoudt fungicide.
- ✓ Maakt voortdurende penetratie en vervanging van werkzame stoffen mogelijk.



Elk grasfungicide is een combinatie van één of meer werkzame stoffen, hulpstoffen en dragers. Echter de wijze waarop ze zijn geformuleerd bepaalt hoe goed ze specifiek presteren op gras. Zonder de juiste formulering, kunnen zelfs de beste actieve stoffen worden verspilld.

Het is net als in de golfsport. Geef dezelfde club en dezelfde bal aan twee verschillende spelers en ze behalen beiden verschillende resultaten. Het optimaliseren van hun prestaties is dus de sleutel tot succes.

De juiste combinatie van actieve bestanddelen leidt tot verbeterde prestaties, vermindering van de benodigde hoeveelheid actieve stoffen en heeft minder impact op het milieu.

De speciaal geselecteerde gras specifieke hulpstoffen zorgen voor een optimale spreiding en opname. Hierdoor wordt een goede stressbescherming bewerkstelligd, zowel aan de buitenzijde van het blad als ook van binnenuit. Als de actieve stoffen optimaal kunnen presteren, lijdt de plant minder onder de ziektestress, wat zorgt voor gezonder en resister gras.

Verbeterde bespeelbaarheid

Een betere gezondheid van de plant leidt tot betere oppervlakte prestatiekenmerken van gladheid en het rollen van de bal, tot tractie en stabiliteit van het oppervlak. De verbeterde bespeelbaarheid betekent uiteindelijk meer inkomsten voor de club.

Ziekte	Effectiviteit % controle 24-30 dagen (piekmoment)	
	Interface™ Stressgard™	Chipco® Green
Fusarium	88 (95)	89 (89)
Dollar Spot	85 (96)	90 (99)
Anthraxnose	71 (74)	52 (57)
Rooddraad	90 (95)	75 (80)
Bladvlekkenziekte	77 (93)	36 (59)
Roest	76 (90)	39 (63)

24-30 dagen = 1 toepassing, piekcontrole van 2 toepassingen. Gegevens zijn afkomstig van verschillende onderzoeken.

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

- Respecteer de bufferzones (zie tabel pagina 4).
- Voor elk gebruik, eerst het etiket en de productinformatie lezen.

VERPAKKING

5 L

KLASSE

Xn – Schadelijk

N – Milieugevaarlijk

Interface™ Stressgard™ bevat 256,4 g/l iprodione en 16 g/l trifloxystrobin

Erkenningsnummer : 10270P/B

Symbolen : Xn, N

Suspensie concentraat (SC)



Kleurstof

Blauwe behandelingsindicator I.C. 001®

Tijdelijke kleurstof voor spuitoplossingen

- ✓ Een gebruik met respect voor de goede praktijken.
- ✓ Een niet te missen middel voor een regelmatige en veilige toepassing.
- ✓ Een vergroenend effect op gazons.

EIGENSCHAPPEN

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® is een blauwe kleurstof die aanduidt waar er behandeld is.

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® is eveneens mengbaar met de meeste herbiciden, fungiciden en insecticiden uit ons gamma. (ons raadplegen).

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® is een zeer geconcentreerde blauwe tijdelijke kleurstof. Ze verdwijnt bij regen of gieten of gewoon onder invloed van het daglicht (72 uur) als het droog blijft.

De aanwezigheid van de kleurstof maakt het spuiten gemakkelijker daar u ziet waar er gespoten is.

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® laat toe overdosering te vermijden en te zien of alles gespoten is.

WERKINGSWIJZE

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® kleurt spuitoplossingen blauw.

Daar er geen enkele werking uitgaat van het product moet het niet erkend zijn.

✓ Waar gebruiken ?

Van groot nut, zowel bij het behandelen van grote oppervlakken, onregelmatige oppervlakken als bij het punctueel behandelen van kleine oppervlakken.

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® kan gebruikt worden op golf- en sportterreinen, op siergazons, op openbaar groen, grasstroken en langs autowegen, niet bebouwde terreinen, paden en voetpaden.

GEBRUIKSAANWIJZING

✓ Bereiding van de spuitoplossing

Voor u met de onkruidverdelging begint, is het noodzakelijk om de goede werking van de spuitapparatuur te controleren en ze te ijken. Wanneer u ook de te behandelen oppervlakte opmeet, weet u precies hoeveel liter spuitoplossing u moet klaarmaken zodat u na de behandeling geen overtollig product moet elimineren.

Gedragen of getrokken spuittoestel, spuitoplossing klaarmaken in de tank

- Vul de tank van de rugspuit voor 3/4 met water.
- Schud de bus en voeg de vereiste dosis kleurstof toe en daarna het product.
- Vul de tank helemaal bij en roer.

✓ Mengbaarheid

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® is mengbaar met alle herbiciden uit ons gamma:

- selectieve herbiciden voor tussen bomen en heesters
- totaalherbiciden

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® is eveneens mengbaar met de meeste andere herbiciden erkend in de groenvoorziening. Toch is het aangeraden vooraf een proef te doen, de eindverantwoordelijke voor het mengen is de gebruiker.



TOEGELATEN GEBRUIK EN DOSIS(SEN)

✓ Aangeraden dosissen

De hoeveelheid van **de blauwe behandelingsindicator I.C. 001®** nodig voor een goede aanduiding hangt af van de plaats, de spuitoplossing en de kwaliteit van het water, de hoogte en de dichtheid en de kleur van de vegetatie en de gebruikte hoeveelheid spuitoplossing.

Situatie	Volume spuitoplossing	Dosis
Naakte of weinig begroeide grond	10 L	5 - 10 ml
Greens	10 L	5 - 10 ml
Stadions en parken	10 L	10 - 20 ml
Ontwikkelde vegetatie	10 L	15 - 25 ml

J F M A M J J A S O N D

Opmerking : voeg indien nodig nog wat blauwe behandelingsindicator I.C. 001® toe om de gewenste markeringsgraad te bekomen.

VOORZORGSMATREGELEN EN GOEDE PRAKTIJKEN

De blauwe behandelingsindicator I.C. 001® niet gebruiken op poreuse dallen en stenen met een heldere kleur (de kleuring zou lange tijd kunnen zichtbaar blijven).

Lees het etiket aandachtig voor het gebruik. Respecteer de veiligheidsvoorschriften.

✓ Tijdens de opslag

- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking, in een met de sleutel afgesloten lokaal, uit de buurt van voedingsmiddelen en drank, met inbegrip van diervoeding, en buiten het bereik van kinderen. Het lokaal moet fris en goed verlucht zijn.

✓ Tijdens het gebruik

- Alleen de hoeveelheid mengsel klaar maken die u nodig hebt.
- Beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril dragen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- Zich onmiddellijk wassen in geval van contact. Bij irritatie of een malaise een arts raadplegen (toon hem indien mogelijk het etiket).
- De verpakkingen goed ledigen en 3 keer met water spoelen wanneer u de tank vult. Giet het spoelwater eveneens in de spuittank; de verpakkingen afvoeren volgens de geldende wetgeving.
- Gebruiken als er geen wind is.
- Niet te dicht in de buurt van waterlopen, waterplassen, irrigatiekanalen spuiten.

✓ Na gebruik

- Spuitoverschotten nooit ledigen in een riool, op verharde oppervlakten, een gracht of andere oppervlaktewaters.
- Spuit overschotten en spoelwater op een doordringbare reeds behandelde oppervlakte na ze 5 keer verdund te hebben, teneinde overdosering te vermijden.

VERPAKKING

Bus van 1 L, verpakt per 12.

KLASSE

Geen toxicologische classificatie.



260,75 g/L blauwe blinkende kleurstof (acide blue 9)

Geen toxicologische classificatie

Gebruiksdosis: 0,25 L/hl

Met water mengbaar concentraat



Bayer CropScience

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), Belgium
Tel: +32 2 535 63 11

www.club-vert.be
WEBSITE VOOR GROENE RUIMTEN