

**Marca Comercial:** Temprid<sup>®</sup> SC

**Nome Técnico:** Imidacloprido e Beta-Ciflutrina

**Grupo Químico:** Neonicotinóide e Piretróide

**Registrado no Ministério da Saúde sob n.º:** 3.3222.0036

**N.º C.A.S.:** 138261-41-3 e 68359-37-5

**Formulação:** Suspensão concentrada

**Concentração de i.a.:** p.a. Imidacloprido 21% p.a. Beta-ciflutrina 10,5% Inertes: Dispersante, atenuador de espuma, conservante, espessante e solvente 68,5%

**Denominação Química:** 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine / reaction mixture of 2 enantiomeric pairs: pair I (S)- a-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate and the corresponding (R) (1S)-cis- isomer; pair II (S) (1R)-trans- and (R) (1S)-trans - isomers, in the ratio 1:2

**Fórmula Bruta:** C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>ClN<sub>5</sub>O<sub>2</sub> e C<sub>22</sub>H<sub>18</sub>Cl<sub>2</sub>FNO<sub>3</sub>

**Dados Toxicológicos:** DL50 oral (ratos) > 2000 mg.kg<sup>-1</sup> ; DL50 dermal (ratos) > 2000 mg/kg<sup>-1</sup>

**Classe:** inseticida

**Embalagem/Apresentação:** Caixa com 24 frascos plásticos de 250 mL

### Indicações de Uso

O Temprid<sup>®</sup> SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos exclusivos com a mais alta qualidade Bayer. A sinergia da Beta-Ciflutrina e do Imidacloprido faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

### Modo de aplicação

Em áreas externas e internas, Temprid<sup>®</sup> SC deve ser aplicado em perímetros residenciais, batentes de portas e janelas, caixa de esgoto, ralos e bueiros formando uma barreira protetora. Pode ser aplicado em locais como bares, restaurantes, padarias, hotéis, residências, cinemas, teatros, indústrias (alimentícias e não-alimentícias), shoppings, comércio, empresas de ônibus, metrô, trens, aeroportos, frigoríficos, etc.

O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada, utilizando-se 1 litro de calda para 20m<sup>2</sup> de superfície a ser tratada. Pode ser aplicado com pulverizador manual ou motorizado.

<b>Pragas</b>	<b>Dosagens (ml / 10 litros água)</b>
Baratas ( <i>Blatella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i> )	20
Carrapatos ( <i>Amblyomma</i> sp)	40
Pulgas	40
Moscas	40
Aranhas ( <i>Loxocoles intermedia</i> )	40
Mosquitos ( <i>Aedes aegypti</i> , <i>Culex quinquefasciatus</i> )	40
Formigas ( <i>Monomorium floricola</i> )	20
Formigas ( <i>Camponotus</i> spp)	40
Traças	20
Percevejo-de-cama ( <i>Cimex lectularius</i> )	20



**Antídoto/ Tratamento:** Imidacloprido: Descontaminação e tratamento sintomático.

Não há antídoto específico.

**Antídoto/ Tratamento:** Beta-Ciflutrina: Anti-histamínicos e tratamento sintomático.

**Telefone de Emergência:** 0800 02 43 334

### **Observação**

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.