

Ficha técnica



Marca Comercial:

K-Obiol® 2P

Ingrediente Ativo:

Deltametrina

Grupo Químico:

Piretroides

Indicação para uso médico

Grupo químico: Piretroides

Nome comum: Deltametrina

Antídoto / Tratamento: Não há antídoto específico; o tratamento é sintomático e de suporte. Realizar tratamento sintomático e medidas de suporte de acordo com os sinais clínicos apresentados para manutenção dos sinais vitais. Lave a boca com leite ou água. No caso de ingestões menores, a irrigação oral e diluição podem ser os únicos procedimentos necessários. Em caso de grande ingestão, pode ser necessário o uso de carvão ativado. A êmese não é recomendada, contudo o vômito espontâneo pode ocorrer. Em caso de exposição respiratória e ocorrência de broncoespasmos (dificuldade de respirar), procurar um médico para tratar com agonistas beta 2 e corticosteroides. Em caso de exposição via ocular, lavar abundantemente com água ou solução salina 0,9% (soro fisiológico); se não houver melhora, procurar ajuda médica.

Disque-Intoxicação: 0800 722 6001

Telefone de Emergência
0800 02 43 334 (24h)

Informações Toxicológicas
0800 017 99 66

Composição

Ingrediente ativo: (S)-a-cyano-3 phenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl) - 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate p.a. Deltametrina 0,2%
m/m (2 g/kg)

Inertes: Carbonato de cálcio 99,8%
m/m (998 g/kg)

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Br₂NO₃

Classe: Inseticida

Tipo de Formulação: Pó seco (DP)

Dados Toxicológicos: DL₅₀ Oral em ratos: > 2000 mg/kg. DL₅₀ cutânea em ratos: > 2000 mg/kg. CL₅₀ Inalatória em ratos: CL₅₀ inalatória em ratos não determinada nas condições do teste. Corrosão/Irritação cutânea em coelhos: O produto não é irritante à pele. Corrosão/Irritação ocular em coelhos: O produto causou hiperemia e quemose reversíveis em 7 dias. Sensibilização cutânea em cobaias: O produto não é sensibilizante à pele.

Mutagenicidade: O produto não é mutagênico.

Classificação Toxicológica: PRODUTO NÃO CLASSIFICADO

0800-017-9966

Ficha técnica

Indicações de Uso

O **K-Obiol® 2P** é um inseticida pó seco, à base do ingrediente ativo Deltametrina que atua por contato, no controle de pragas de sementes e grãos armazenados.

Modo de Uso

Produto Pronto-Uso. Aplicar com a embalagem perfurando-a ou com polvilhadeira manual (tipo “tabaqueira”) ou motorizada.

• Para milho armazenado em paiol

Antes do armazenamento recomenda-se limpar o paiol e polvilhar as paredes e o assoalho com o produto.

Logo após a colheita do milho armazenar no paiol, polvilhando-se o produto na dose recomendada na tabela e em camadas de 20-25 cm de altura.

Em caso de infestação acima de 7 % de grãos danificados recomenda-se expurgar previamente.

• Para grãos e sementes a granel

A aplicação deverá ser feita no momento do armazenamento dos cereais misturando-se o produto diretamente com os grãos na dose recomendada. Pequenas quantidades podem ser misturadas com o auxílio de uma pá sobre uma superfície (terreno cimentado ou sobre uma lona) revolvendo-se bem para uma aderência uniforme do produto aos grãos. Grandes quantidades requerem um emprego de tratadores e misturadores de sementes. Após esta operação os cereais deverão ser ensacados e empilhados, e as partes laterais e superiores deverão ser polvilhadas com o produto.

Dosagens

Grãos e Sementes Armazenados	Pragas Controladas		Doses Produto Comercial (g/tonelada)		No máximo de aplicações	Equipamentos de aplicação	Intervalo de segurança (dias)
	Nome Comum	Nome Científico	Grãos	Sementes			
Milho (em espiga com ou sem palha)	Gorgulho	<i>Sitophilus oryzae</i>	500	-	1	Grãos: Polvilhadeira manual ou motorizada	30
	Gorgulho	<i>Sitophilus zeamais</i>					
	Traça-dos-cereais	<i>Sitophilus granarius</i>					
	Traça-dos-cereais	<i>Sitotroga cerealella</i>					
Milho	Besouro	<i>Rhizopertha dominica</i>	250-500	500 - 1000	1	Sementes: Tratadores e misturadores	15
Arroz*	Traça-dos-cereais	<i>Sitotroga cerealella</i>					30
Trigo	Besouro	<i>Rhizopertha dominica</i>					
Feijão*	Caruncho-do-feijão	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	-	-	-	-	-
	Caruncho	<i>Zabrotes subfasciatus</i>					
Amendoim	Traça	<i>Corcyra cephalonica</i>	-	-	-	-	-

*Restrição de uso para as culturas de arroz e feijão no estado do Paraná.

Época e intervalo de aplicação

Realizar aplicação após higienização das unidades armazenadoras ou após armazenamento dos grãos na unidade.

Importante

Produto de uso agrícola, venda sob receituário agrônomo. Consulte sempre um agrônomo e leia o rótulo e a bula.

Ficha técnica

Precauções Gerais

- Produto para **uso exclusivamente agrícola**.
- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado.
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.
- Não manuseie ou aplique o produto sem os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados.
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca.
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomendações determinadas pelo fabricante.
- Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e áreas de criação de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.
- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um serviço médico de emergência.
- Mantenha o produto adequadamente fechado, em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais.
- Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, touca árabe e luvas.
- Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção Individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e descarte do EPI danificado.

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob n.º: 002298794

N.º C.A.S. do ativo: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela