

Ficha técnica

RODILON[®] Bloco Extrusado Profissional



Marca Comercial:

Rodilon[®] Bloco Extrusado Profissional

Ingrediente Ativo:

Difetialona

Grupo Químico:

Benzotiopiranonas

Indicação para uso médico

Grupo químico

Benzotiopiranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto / Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático

Telefone Toxicológicas

0800 701 0450

Informações de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

Composição

Ingrediente ativo

3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl]-1-benzothi-in-2-one
I.A: Difetialona 0,0025% p/p;

Inertes

Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p

Fórmula Bruta

$C_{31}H_{23}BrO_2S$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca bloco

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda

DL50 oral (ratos): > 5000 mg/kg p.c;

DL50 dérmica (coelhos): > 2000 mg/kg p.c.

Ficha técnica

Indicações de Uso

Rodilon® Bloco Extrusado é um raticida anticoagulante de dose única à base de Difetialona em uma formulação inovadora para o controle de roedores especialmente em locais de alta umidade. As principais vantagens de **Rodilon® Bloco Extrusado** são sua atratividade proporcionada pelos cereais integrais de alta palatabilidade e sua grande resistência a umidade. Essa nova formulação confere maior resistência, aumentando a durabilidade do produto, permitindo que os ratos consumam a isca por mais tempo. Além disso, o bloco de 15g evita o desperdício da isca, havendo o consumo total pelo roedor.

Modo de Uso

Recomenda-se a colocação do produto dentro de caixas ou tubos que permitam o acesso exclusivo aos roedores, pois estes sentem-se mais seguros comendo escondidos. Além disso, o produto fica longe do alcance de crianças e animais domésticos. Destrua os restos do produto e os recipientes quando cessar a atividade dos roedores. Para prevenir novas infestações, mantenha pontos de aplicação de forma permanente.

Dosagens

É indicado 2 ou mais blocos por ponto de aplicação a cada 5 - 10m. As quantidades a serem administradas devem ser suficientes para que todos os roedores tenham a oportunidade de ingerir a isca ao menos uma vez.

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de aplicação

Colocar **Rodilon® Bloco Extrusado** nos locais onde se observam sinais da presença de roedores (nas tocas e nos locais de trânsito). A quantidade de blocos e o número de pontos de aplicação variam de acordo com o grau de infestação e o tamanho da área a ser desratizada. Manter a oferta do produto até que não se evidenciem mais sinais da presença dos roedores.

Recomendações de uso

- Não é necessário abrir a embalagem e nem misturar com alimentos.
- Evite contato com as mãos.
- Mantenha o local limpo e longe de alimentos.
- Colocar a quantidade suficiente para que toda a colônia consuma a isca.
- Observe diariamente e reaplique nos locais onde houve o consumo até cessar a infestação.
- O ponto de iscagem deve ser observado pelo morador adulto de forma a impedir exposição de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada.
- Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo previamente os mesmos, usando luvas e sacos de lixo.
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinhas, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.

Ficha técnica

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito.
- Não abrir a embalagem do produto.
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.014

N.º C.A.S. do ativo: 104653-34-1

Informações comerciais: tabela

OBS: Poderá haver variação no peso do bloco de 15g de aproximadamente 1g para mais ou para menos. Entretanto, o peso final do saco plástico será sempre de 1 kg.