

HARMONIX®

Rodent Paste

Rodenticyd • Rodenticid • Rodenticid • Rodenticide

- ✓ Skuteczność przeciwko odpornym szczepom szczurów i myszy
- ✓ Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów)
- ✓ Substancja czynna nietrwała w środowisku i nieulegająca bioakumulacji (zgodnie z Rozporządzeniem REACH)

Przygotowana gotowa do użycia pasta

Substancja czynna: Cholecalciferol 0.075 g/100 g nr CAS 67-97-0

PRODUKT PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

- ✓ RB - Nástraha k přímému použití
- ✓ Účinná látka: Cholecalciferol 0.075 g/100 g CAS 67-97-0

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

- ✓ RB - Nástraha (na priame použitie)
- ✓ Účinná látka: Cholecalciferol 0.075 g/100 g CAS 67-97-0

IBA PRE PROFESIONÁLVO

- ✓ Eficacitate împotriva roztoarelor rezistente la anticoagulant
- ✓ Substanța activă nu este clasificată ca toxică pentru reproducere, nu persistă și nu se bioacumulează în mediu
- ✓ Utilizare în interior și exterior în jurul clădirilor, spațiilor deschise și gropilor de gunoi

Continut în substanța activă: Cholecalciferol 0.077% (0.075 g/100 g)
CAS: 67-97-0, CE: 200-673-2

TIPUL DE PRODUS: TP 14-Rodenticide

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesioniști și profesioniști instruiți în activitatea de deratizare

envu™

5 kg e

Rattus norvegicus • Rattus rattus • Mus musculus

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY I KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU.

ZWALCZANIE ORGANIZMÓW, DĄWKOWANIE
Dorośli i młode osobniki: Szczur (*Rattus norvegicus* - wezworny, *Rattus rattus* - śniadły): 100-200 g przynęty na punkt wykładania przynęty; minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 10-20 m dla niskiej populacji i 3-10 m dla wysokiej populacji. Mysz domowa (*Mus musculus*): 20 g przynęty na punkt wykładania przynęty; minimalna odległość pomiędzy stacjami (w linii prostej) powinna wynosić 5-20 m dla niskiej populacji i 2-5 m dla wysokiej populacji. Gdy przynęta zostanie w całości spożyta w okresie pomiędzy inspekcjami, należy dodać 200 g produktu - zwalczanie szczurów / 20 g produktu - zwalczanie myszy.

OBŚZAR STOSOWANIA I KATEGORIA UŻYTKOWNIKA

Do stosowania wewnątrz (w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych) i na zewnątrz przez użytkowników profesjonalnego przekształconego (w zakrytych i chronionych punktach wykładania przynęty, bezpośrednio do nor). Użytkownik profesjonalny może stosować produkt wewnątrz i wokół pomieszczeń wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK BY SE MĚL POUŽÍVAT SE Zvláštními bezpečnostními opatřeními. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE ŠTÍTK A KARTU BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮV MATERIÁLU.

CÍLOVÉ ORGANIZMY, DÁVKOVÁNÍ

Dospělé a mladé jedince: Potkan obecný (*Rattus norvegicus*), Krysa obecná (*Rattus rattus*): 100-200 g návnady na jedno umístění návnady; minimální vzdálenost mezi stanicemi (v přímé linii) by měla být 10-20 m pro nízkou populaci a 3-10 m pro vysokou populaci. Mys domácí (*Mus musculus*): 20 g návnady na jedno umístění návnady; minimální vzdálenost mezi stanicemi (v přímé linii) by měla být 5-20 m pro nízkou populaci a 2-5 m pro vysokou populaci. Když je návnada mezi kontrolami zcela spotřebovaná, přidejte 100 g přípravku - cílové potkanů / 20 g přípravku - cílové myši.

OBĚST POUŽITÍ A KATEGORIE UŽIVATELŮ

K použití ve vnitřních prostorách (v deratizačních stanicích odolných vůči manipulaci) a ve vnitřních prostorách vyškoleným profesionálním uživatelem a v chráněných místech pro uložení návnady (přímo do nor). Profesionální uživatel smí přípravek používat v interiéru a v okolí objektu pouze v deratizačních stanicích odolných vůči manipulaci.

BIOCID BÎ SA MAL POUZÎVAȚA ȘO ȘPECIĂLNIȘI BEZPEČNOSTNÍM OPATŘENÍMI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE ŠTÍTK A KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJŮV MATERIÁLU.

CIELOVÉ ORGANIZMY, DÁVKOVANIE

Dospelé a mladé jedince: Potkany (*Rattus norvegicus* - hnedy, *Rattus rattus* - tmavý): 100-200 g návnady na jedno umiestnenie návnady; minimálna vzdialenosť medzi stanicami (v priamej linii) by mala byť 10-20 m pri nízkej populácii a 3-10 m pri vysokej populácii. Mys domový (*Mus musculus*): 20 g nástrahy na jedno miesto; minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami (v priamej linii) by mala byť 5-20 m pre nízku populáciu a 2-5 m pre vysokú populáciu. Keď je návnada medzi kontrolami úplne spotrebovaná, pridajte 200 g výrobku - kontrola potkanov / 20 g výrobku - kontrola myši.

OBĚST POUŽITIA A KATEGORIE UŽIVATEĽA

Na použití v interiéru (v deratizačních stanicích zabezpečených vůči manipulaci) a v exteriéru odborně vyškoleným uživatelem (na krytých a chráněných místech s návnadou, přímo do nory). Profesionální uživatel může výrobek používat jen v interiéru a v okolí prostorů v deratizačních stanicích zabezpečených vůči manipulaci.

PRODUSUL BIOCID TREBUIE FOLOSIT CU PRECAUȚII SPECIALE. CITIȚI ETICHETA ȘI FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Organismele țintă vizate: (exemplare adulte și juvenile - puși): *Mus musculus* (șoarecele de casă), *Rattus norvegicus* (șobolanul cenușiu) și *Rattus rattus* (șobolanul negru).

Domeniul de utilizare: în interior, în exterior, în aer liber, în jurul clădirilor (profesional, profesioniști instruiți în activitatea de deratizare); în exterior, în câmp deschis (spații deschise) sau gropi/depozite de gunoi (profesional, profesioniști instruiți în activitatea de deratizare). Dozele de aplicare și frecvența de aplicare.

Instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

General: Îndepartați-vă din zona periculoasă (contaminată). Asezați (și transportați, dacă este cazul) victima în poziție culcată într-o parte. Îndepartați îmbrăcăminte contaminată și curătați-o separat.

Contactul cu pielea: poate apărea o ușoară senzație de arsură sau iritație. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persistă mai mult de 24-48 ore.

Contactul cu ochii: clătiți imediat cu multă apă rece și țineți ochii larg deschiși pentru cel puțin 15 minute.

În caz de ingestie: Clătiți gura cu multă apă și nu induceți, sub nici o formă, vomă. Dacă persoana este inconștientă, nu administrați nimic pe cale orală. Nu se consuma nici un aliment sau băutura. Asigurați aerisirea și consultați medicul. Arătați eticheta sau ambalajul. Dacă ingestia a fost făcută de un animal de casă, consultați de urgență doctorul veterinar și arătați ambalajul sau eticheta.

• **Antidot:** nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de carbune medicinal, fara a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățirea stării generale.

HARMONIX® RODENT PASTE

PIERWSZA POMOC

W przypadku kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem; kontakt z oczami: natychmiast oczy rozszerzone do przepłukania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut; kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku pokłucia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Odpowiednie dawkowanie i rozmieszczenie punktów wykładania przynęty powoduje u zwalczanych organizmów Stop Feeding Effect czyli wstrzymanie pobierania przynęty po 3 dniach, co w efekcie zmniejsza jej zużycie.

• Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z przestrzeganiem zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dotyczących do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.

• Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i wielkości populacji gryzoni.

• Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).

• Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.

• Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.

• W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się populacji należy stosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).

• Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).

• Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.

• Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować („Nie przenosić ani nie otwierać”, „Zawiera substancje gryzoniobójcze”, „Nazwa produktu/nr pozwolenia”, „Substancja czynna” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc (podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruc produktami biobójczymi”).

• Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padnymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.

• Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.

• Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.

• Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.

• Nosić odpowiednie rękawice ochronne (wykonane z kauczuku nitrilowego).

• Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

• Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.

• Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanej wielkości populacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu.

• Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na cholecalciferol należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodenticydów (np. antykoagulant). Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).

• Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną z pozostawienia stacji.

• Przynętę nie należy wyjmować z saszetek.

UFI: H141-U041-V00N-142J
CEE89240883E - ARTICLE 87288633

Nr pozwolenia / Číslo povolení / Číslo autorizácie / Autorizatsiya:
PL/2021/0464/MR z dnia 26.02.2021 r.
CZ-0026734-0000
SK20-019
Nr. RO/2022/0338/MRP/DE-0015959-0000

(PL) Envu, logo Envu i Harmonix® są znakami towarowymi należącymi do Environmental Science U.S. LLC lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych.
©2022 Environmental Science U.S. LLC
©2022 Envu a logo Envu jsou ochranné známky společnosti Environmental Science U.S. LLC. nebo některou z jejích dceřiných společností.
©2022 Environmental Science U.S. LLC
(SK) Envu a logo Envu sú ochranné známky spoločnosti Environmental Science U.S. LLC. alebo niektorú z jej dceřiných spoločností.
©2022 Environmental Science U.S. LLC
(RO) Envu, sigla Envu și Harmonix® sunt mărci comerciale deținute de Environmental Science U.S. LLC sau de unul dintre afiliații săi.
©2022 Environmental Science U.S. LLC

Podmiot odpowiedzialny / Odpovědná entita / Držitel autorizácie / Numele titularului autorizatiei:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, France / Francie / Francúzsko / Franța
+33 (0) 4 51 08 43 21

OKRES VAŽNOSTI - do 36 mesiacov od daty produkcie v teplotach pokojovej
DATA PRODUKCIJE / INFORMACIJE / POJEMNOST OPAKOVANIA - na opakovaní

DATUM VÝROBY - na obalu
DOBA POUŽITELNOSTI - 36 mesiacov
SERIOVÉ ČÍSLO - na obalu

DATUM VÝROBY - na obale
DOBA POUŽITELNOSTI - 36 mesiacov od dátumu výroby
SERIOVÉ ČÍSLO - na obale

DATA PRODUȚIE / NUMĂRUL LOTULUI / CAPACITATE AMBALAJ - pe ambalaj
DURATA DE CONSERVARE ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE: 36 luni

Producent / Výrobce / Výrobca / Numele fabricantului produsului biocid:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009 Lyon, France / Francie / Francúzsko / Franța



3 760390 1141253

A. Instrukcja użytkowania - użytkownik profesjonalny. Przygotowana gotowa do użycia do stosowania w odponnych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Zastosowanie wewnątrz i wokół budynków.

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 1-2 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia czy przynęta została pobrana, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonie.
- Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występuje gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i wielkości populacji gryzoni.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy przyczyć i potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności). Oprócz tego należy oczyścić środowiska bytowania gryzoni przed zastosowaniem produktu, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie ich populacji i utrudnić pobranie przynęty.
- Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona poza stację deratyzacyjną.
- Po zakończeniu zabiegu należy usunąć pozostałości przynęty i stacji deratyzacyjnych.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

Dodatkowe środki przy zastosowaniu wokół budynków należy:

- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Wymieniać każdą stację deratyzacyjną i przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
- Zabieg należy przerwać, jeśli nie obserwuje się dalszego spożycia przynęty.

B. Instrukcja użytkowania - użytkownik profesjonalny przeszkolony. Przygotowana gotowa do użycia do stosowania (wewnątrz budynków, wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów).

- Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występuje gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i wielkości populacji gryzoni.
- Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).
- Zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona poza stację deratyzacyjną.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).
- Dodatkowe instrukcje dla stosowania produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (zastosowanie wewnątrz i wokół budynków):**
 - Produkt może być stosowany w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły.
 - Jeśli to możliwe należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których wykładano przynętę (przynajmniej raz na 4 tygodnie) w celu uniknięcia rozwoju oporności gryzoni.
- Dodatkowe instrukcje dla stosowania produktu wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów:**
 - Stacje deratyzacyjne/punkty wykładania przynęty rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
 - Wymieniać każdą stację deratyzacyjną/punkt wykładania przynęty i przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
- Dodatkowe instrukcje dla stosowania produktu bezpośrednio do nor (zastosowanie wokół budynków, tereny otwarte i wysypiska śmieci):**
 - Przynętę należy umieścić tak, aby dzieci i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.
 - Aby ograniczyć możliwość roznieśienia przynęty należy zakryć lub zablokować wyjścia z nor, w których wyłożono produkt gryzoniobójczy.
 - Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczyć przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
- Dodatkowe instrukcje dla stosowania produktu wewnątrz budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów:**
 - Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne/przynętę znalezione poza stacją/ pozostałości produktu (nie dotycz stosowania do nor).

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postonne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
- Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny wielkości populacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
- Zastosowanie tego produktu powinno zważyć gryzonie w ciągu 35 dni.
- W przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) należy skonsultować się z dostawcą/sprzedawcą lub ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.
- W trakcie zabiegu nie należy mieć w domu stacji deratyzacyjnych.
- Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Unikać bezpośredniego kontaktu.

A. Środki ograniczające ryzyko - użytkownik profesjonalny.

Zastosowanie wewnątrz i wokół budynków.

- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły, np. w celu zapobiegania wystąpienia populacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności.
- Zastosowanie tego produktu powinno zważyć gryzonie w ciągu 35 dni. Informacja o produkcie (tj. etykieta i/lub ulotka) powinna zawierać wyraźne zalecenia, żeby w przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (tj. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skonsultował się z dostawcą lub skontaktował się ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.
- Pomiedzy podaniami przynęty nie należy mieć wody stacji deratyzacyjnych.
- Nie należy stosować produktu techniką pulsacyjną.

Dodatkowe środki przy zastosowaniu wokół budynków.

- Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.
- Informację o produkcie (tj. etykieta i/lub ulotka) powinna zawierać wyraźne zalecenia, że: a. produkt nie powinien być dostępny dla użytkownika powszechnym (np. jedynie dla użytkownika profesjonalnego), b. dowlone jest stosowanie produktu wyłącznie w odponnych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, c. stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w punkcie 5.3 Charakterystyki Produktu Biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).
- Należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji, przynajmniej raz w tygodniu, z jaką prowadzone są inspekcje stacji deratyzacyjnych. Padłe gryzonie usuwać w sposób bezpieczny i zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Unikać bezpośredniego kontaktu.

B. Środki ograniczające ryzyko - użytkownik profesjonalny przeszkolony.

- Zastosowanie wewnątrz i wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów.
- Nie należy stosować produktu techniką pulsacyjną.
- Informacja o produkcie (tj. etykieta i/lub ulotka) powinna zawierać wyraźne zalecenia, że produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych przeszkolonych w zakresie tego zastosowania (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych”).

- Nie stosować produktu, jeżeli na danym terenie podejrzewa się zjawisko oporności.
- Pomiedzy podaniami przynęty nie należy mieć wody stacji deratyzacyjnych ani środków stosowanych do zakrywania i ochrony punktów deratyzacyjnych.
- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postonne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).

Dodatkowe środki przy zastosowaniu wewnątrz i wokół budynków.

- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się populacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. ztkanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
- Dodatkowe środki przy zastosowaniu na terenach otwartych i składowiskach odpadów.**
 - Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie podczas każdej inspekcji przez cały okres deratyzacji.
- Należy prowadzić inspekcje punktów deratyzacyjnych przynajmniej co 1-2 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu. Dotyczy to też zabiegów trwających dłużej niż 35 dni.
- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły, np. w celu zapobiegania wystąpienia populacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności.

SKUTKI UBOECZNE/ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Produkt zawiera substancje czynną, która może być pro-hormonem.

PIERWSZA POMOC

W przypadku:

- kontaktu ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
- kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut.
- kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykiety.

W przypadku spożycia produktu przez zwierze domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje:

- „Nie przesuwać ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Zawiera produkt lub np. rozpuszczalnik”; „Substancja czynna”; „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zaradcz (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruc produktami biobójczymi)”.
W przypadku braku informacji należy skontaktować się z dostawcą.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.
- Dodatkowe środki ochrony środowiska dla użytkownika profesjonalnego i profesjonalnego przeszkolonego (zastosowanie wewnątrz budynków):
 - Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopinować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.
- Dodatkowe środki ochrony środowiska dla użytkownika profesjonalnego i profesjonalnego przeszkolonego (zastosowanie wokół budynków, na terenach otwartych i składowiskach odpadów):
 - Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody lub wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, jezior, wód gruntowych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenażowych należy dopinować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

Instrukcja w zakresie bezpiecznego stosowania produktu i jego opakowania

- Opakowanie to produkt, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znalezione poza stacją deratyzacyjną) zamieścić w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Opakowanie po produkcie nie przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.
- Należy przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, w oryginalnych warunkach przechowywania.
- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, psów, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.
- Dane informacyjne:
 - Zawartość substancji czynnej na 100 g produktu wynosi: cholekalceryol (0,077 g - technicznie co odpowiada 0,075 g - czysta).
 - Minimalna czystość substancji czynnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2019/637: 970 g/kg (Ph. Eur. 7.0; 01/2008:0575 corrected 6.5); min. 970 g/kg (obejmuje również obciążenie wodoru).
 - Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynęty należy usuwać, stosując reżim higieny ochronnej lub narzędzia, np. szczypce.
 - Produkt zawiera czynnik znieczulający do przypadkowego spożycia oraz barwnik. 24 godzinna informacja Chemicznej w przypadku psów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu: +48 22 398 80 29.

HARMONIX® RODENT PASTE

POKRYW PO UŻYTIU

- Przyprawkę smi być używany pouze jako súčasť integrovaného ochrany proti škůdcům, která zahrnuje mimo jiné i hygienická opatření a tam, kde je to možné, také fyzické metody ochrany.
- Deratizační staníčky musí být připraveny k podlaze nebo jiným částem objektu, pokud je to možné
- Umístěte nástrahu mimo dosahu dětí, ptáků, domácích a hospodářských zvířat a dalších necílových organismů.
- Umístěte nástrahu mimo potraviny, nápoje, krmliva pro zvířata a mimo kuchyňské potřeby a mimo povrchy, které s potravinami a krmlivými předměty do styku.
- Staníčky musí být jasně označeny, že obsahují rodenticid a že nesmí být přemisťovány nebo ovládnuty.
- Během manipulace s přípravkem nejzte, nepřjte a nekurte. Po skončení manipulace si umyte ruce a nezakrývejte pokožku.
- Jestliže je akceptace nástrahy nízká vzhledem k úrovni infestace, zvažte možnost přemístění staníček na jiná místa, případně výměnu nástrahy za jinou formuli.
- Jestliže je po 35 dnech je nástraha stále akceptována a není pozorována snížená aktivita hlodavců, je třeba určit pravděpodobnou příčinu. Jestliže jsou vyloučeny ostatní příčiny, je pravděpodobné, že se jedná o rezistentní populaci hlodavců a je třeba zvážit použití antikoagulantních rodenticidů nebo použití pastí jako alternativní metody ochrany.
- Nástraha v sáčcích. Neotvírejte sáčky obsahující nástrahu.
- Přípravek je třeba rozmístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezek, hnízdišť, výkrmů, děr, nor atd.).
- Během manipulace s přípravkem a při umývání hlodavců se doporučuje nosit ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

A. Pokyny pro používání - profesionální uživatelé

Vnitřní, venkovní prostory kolem budov.

- Deratizační staníčky je nutno kontrolovat nejméně každé 1 až 2 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staníčky neporušené a s účelem odstranění těl umřelých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.
- V daném místě deratizace je třeba nejprve provést průzkum a posoudit místo za účelem identifikace hlodavců, zjistit míst jejich výskytu a určit příčiny a rozsah infestace.
- Odstraňte potravu atraktivní pro hlodavce (rozsypané obilí, potravinový odpad apod.). Před aplikací nástrahy místo deratizace neuklizejte, aby nedošlo k vyrušení hlodavců a tím ke snížení akceptace nástrahy.
- Nástraha musí být zajištěna tak, aby nemohla být hlodavci odžena.
- Odstraňte nepotřebnou nástrahu po skončení deratizace.
- Venkovní prostory kolem budov
 - Chraňte nástrahy před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). Umístěte deratizační staníčky do míst, kde nehrozí záplavy.
 - Vymeňte nástrahu v deratizační stanici, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.
 - Deratizace musí být ukončena, pokud už nedochází k akceptaci nástrahy.

B. Pokyny pro používání - odborné způsobilé osoby

- V daném místě zásadu je třeba nejprve provést průzkum a posoudit místo za účelem identifikace hlodavců, zjistit míst jejich výskytu a určit příčiny a rozsah infestace.
- Přípravek se umísťuje do nejlépe místem, kde byla pozorována aktivita hlodavců (tj. cestíčky, místa hnízení, kolem zdrojů potravy, nory apod.).
- Nástraha musí být zajištěna tak, aby nemohla být hlodavci odžena.
- Venkovní prostory kolem budov, venkovní otevřené plochy a sklady odpadů
 - Chraňte deratizační staníčky/nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). Umístěte deratizační staníčky/nástrahu do míst, kde nehrozí záplavy.
 - Vymeňte nástrahu na místech, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.
- **První aplikace odnor (venkovní prostory kolem budov, venkovní otevřené plochy a sklady odpadů):**
 - Nástrahu musí být umístěna tak, aby bylo omezeno nebezpečí zasažení necílových organismů a dětí.
 - Zakryjte vchody do nory, aby se zamezilo nástrahy ven z nory.
 - Vnitřní, venkovní otevřené plochy a sklady odpadů
 - Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku (zbývající nástrahu nebo deratizační staníčky) předáním oprávněné osobě.

OPATŘENÍ KE ZMÍŘENÍ RYZIKA

- Přípravek nesmí být používán déle jak 35 dnů, aniž by se vyhodnotila úroveň infestace a účinnost zásahu.

A. Opatření ke zmiřování rizika - profesionální uživatelé

Vnitřní, venkovní prostory kolem budov.

- Nepoužívejte přípravek jako trvalou nástrahu jako prevenci případného výskytu nebo k monitorování aktivity hlodavců.
- Přípravek by měl eliminovat hlodavce během 35 dnů. Po uplynutí 35 dnů by měla být vyhodnocena míra infestace a úspěšnost ošetření. Informace o přípravku (etiketa, leták) by měly doporučit, že v případě podezření na nízkou účinnost (hlodavci jsou po ukončení deratizace stále pozorováni), uživatel požádá o doporučení od výrobce anebo kontaktuje profesionální deratizační firmu.
- Neumývejte/neoplachujte vodu deratizační staníčky během jednotlivých aplikací.
- Přípravek se nesmí aplikovat metodou pulzní aplikace.
- Venkovní prostory kolem budov
 - Neaplikujte deratizační staníčky přímo do nory.
 - Přípravek musí být používán pouze v deratizačních stanících chráněných proti násilnému otevření.
 - Uživatelé uvedou na stanících informace podle doporučení k použití přípravku.
 - Odstraňujte umřelé hlodavce během zásahu, alespoň tak často jak jsou prováděny kontroly deratizačních staníček.
 - Umřelé hlodavce likvidujte v souladu s právní legislativou. Zamezte přímému kontaktu.

B. Opatření ke zmiřování rizika - odborné způsobilé osoby

Vnitřní, venkovní prostory kolem budov, venkovní otevřené plochy a sklady odpadů

- Přípravek se nesmí aplikovat metodou pulzní aplikace.
- V informacích o přípravku (etiketa, leták) musí být jasně uvedeno, že přípravek smí být použit pouze osobami s odbornými způsobilými osobami (tj. pouze pro odborné způsobilé osoby).
- Nepoužívejte v místech, kde je předpokládána rezistence k dané účinné látce.
- Neumývejte/neoplachujte vodu deratizační staníčky ani další pomůcky používané k zakrytí nástrahy během jednotlivých aplikací.
- Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatelé deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců a o nebezpečí otravy necílových organismů.
- **Vnitřní, venkovní prostory kolem budov.**
 - Zvažte preventivní kontroly opatření (učetě díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdříve) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.
 - Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování umřelých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Venkovní otevřené plochy a sklady odpadů.

- Aby se snížilo riziko sekundární otravy, provádějte v průběhu deratizace v častých intervalech vyhledávání a odstraňování umřelých hlodavců v souladu s doporučeními stanovenými v metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zpočátku deratizace provádějte kontrolu nástrahových míst nejméně jednou za 1 až 2 dny a později nejméně jednou týdně. To platí i pro deratizaci, který trvá více než 35 dnů.
- Nepoužívejte přípravek jako trvalou nástrahu, jako prevenci k infestaci hlodavců nebo k monitorování aktivity hlodavců.

PRVNÍ POMOC

Při styku s kůží: omýjte zasažené místo vodou a poté vodou a mydlem. Při zasažení očí: vyplachujte oči kapalinou pro vyplachování očí nebo vodou při otevřených víčkách po dobu alespoň 10 minut. Při požití: vypláchněte ústa vodou. Nepodávejte nic ústí osobě, která je v bezvědomí. Nevylavujte zvracení. Při spolknutí nástrahy vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal přípravku nebo etiketu. V případě požití nástrahy zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

JELI NUTNÁ LÉKÁRSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02. Nebezpečný pro volné žijící zvířata.

OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Při umísťování deratizačních staníček v blízkosti povrchových vod (např. řek, rybníků, vodních kanálů, hrází, zavlažovacích nádrží) nebo drenážních systémů zajištěte, aby nedocházelo ke styku nástrahy s vodou.

SKLADYŠKOVÁNÍ

Přidržujte v suchých, chlazených a dobře větráných místech v uzavřených originálních obalech. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte v místech nepřístupných pro děti, psy, domácí a hospodářská zvířata.

POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU

Na konci období deratizace odstraňte zbytek přípravku (zbývající nástrahu nebo deratizační staníčky) a obaly předáním oprávněné osobě.

CEE89240883E - ARTICLE 87288633

Nr pozwolenia / Číslo povolení / Číslo autorizácie / Autorizati:

PL/2021/0464/MR z dnia 26.02.2021 r.

CZ-0026734-0000

SK20-019

Nr. RO/2022/0338/MRP/DE-0015959-0000

(PL) Envi, logo Envi i Harmonix® są znakami towarowymi należącymi do Environmental Science U.S. LLC lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

(CZ) Envi a logo Envi jsou ochranné známky společnosti Environmental Science U.S. LLC, nebo některou z jejích dceřných společností.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

(SK) Envi a logo Envi sú ochranné známky Environmental Science US LLC, alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.

©2022 Environmental Science US LLC

(RO) Envi, sigla Envi și Harmonix® sunt mărci comerciale deținute de Environmental Science U.S. LLC sau de unul dintre afiliații săi.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

Podmiot odpowiedzialny / Odpovědná entita / Držitel autorizácie / Numele titularului autorizatiei:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazano, 69009 Lyon, Francia / France / Francúzsko / Franța

+33 (0) 4 51 08 43 21

OKRES VAŽNOSTI - do 36 mesiaců od daty produkcji w temperaturze pokojowej
DATA PRODUKCJI / NUMER SERII / POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA - na opakowaniu

DATUM VÝROBY - na obalu
DOBA POUŽITELNOSTI - 36 měsíců
SERIOVÉ ČÍSLO - na obalu

DATUM VÝROBY - na obale
DOBA POUŽITELNOSTI - 36 mesiacov od dátumu výroby
SERIOVÉ ČÍSLO - na obale

DATA PRODUCTIE / NUMAARL LOTUURI / CAPACITATE AMBALAJ - pe ambalaj
DURATA DE CONSERVARE IN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE: 36 luni

Producers / Výrobce / Výrobca /

Numele fabricantului produsului biocid:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazano,

69009 Lyon, Francia / France / Francúzsko / Franța



3 760390 141253

DAŠI INFORMACE

Hlodavci mohou by přenašeči původců způsobujících onemocnění. Nedotýkejte se
přímých zvířat holými rukama, použijte rukavice nebo nástroje ke sběru, např. kšestě.
Připravky obsahují zhořčovačů a barviv.
Dodatečné technické informace: Cholecalciferol (Vitamin D3, účinná látka) Obsah (w/w%)
0,077 (technický obsah látky), 0,075 (čistá látka). Minimální čistota účinné látky podle
Nařízení (EU) 2019/637: 970 g/kg (Ph. Eur. 7.0; 01/2008: 0575 převedeno na 6.5): min.
970 g/kg (zahnuje) přítomný prechlecalciferol.
Horká linka ChemTrec pro otázky týkající se bezpečnosti výrobku: +420 228 880 039
(24 hodin denně/den).



HARMONIX® RODENT PASTE

POKYNY NA POUŽÍVÁNÍ

- Výrobek by se měl používat jen ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom,
ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.
- Keď to je možné, musia byť deratizačné stančiny pripravené k zemi alebo k iným
konštrukciám.
- Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat
a ostatných nečlovečích zvierat.
- Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia
a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.
- Deratizačné stančiny musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticidy a že sa s nimi
nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť.
- Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky
a priamo vystavení pokožky.
- Ak je príjem nástrahy pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zväzť
presun deratizačných stančiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie
nástrahy.
- Ak sú nástrahy po období deratizácie 35 dní nad rámec konzumované a nie je možné
pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba učiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli účinné
in príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zväzť použité rodenticidu
s antikoagulantom, ak je dostupný, alebo použijte pasci ako alternatívneho opatrenia na
kontrolu hlodavcov.
- Nástraha vo vreckách: Neotvárajte vrecká obsahujúce nástrahu.

A. Pokyny na používanie - profesionáli

Vnútorné vonkajšie: okolo budov

- Deratizačné stančiny by sa mali kontrolovať najmenej každé 1 až 2 dni na začiatku procesu,
a potom najmenej raz týždenne, či bola nástraha prijatá, či sú deratizačné stančiny
neporušené, a kvoli odstráneniu tieľ hlodavcov. V prípade potreby doplniť nástrahu.
- Pred umiestnením nástrahy vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na
mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu
a rozsah zamorenia.
- Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie
alebo potravinový odpad) Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou,
keďže čistenie len vyvrší populáciu hlodavcov a staží dosiahnutie prijatia nástrahy.
- Nástraha by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odhaliť preč od deratizačnej
stančiny.
- Na konci procesu odstráňte zvyšnú nástrahu alebo deratizačné stančiny.
- Exterier: okolo budov
- Umiestnite deratizačné stančiny v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.
- Vymeňte nástrahu v deratizačnej stančiny, v ktorej je nástraha poškodená vodou alebo
kontaminovaná nečistotou.
- Na konci procesu odstráňte zvyšnú nástrahu alebo deratizačné stančiny.

B. Pokyny na používanie - vyskúšaný profesionál

- Pred umiestnením nástrahy vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na
mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu
a rozsah zamorenia.
- Výrobek by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili
známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdišcia, miesta krmenia, peľochy, brlohy atď.).
- Nástraha by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odhaliť preč od deratizačnej
stančiny.
- Vonkajšie: okolo budov. Vonkajšie: otvorené priestory a sklady odpadu
- Umiestnite deratizačné stančiny v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.
- Vymeňte nástrahu v deratizačnej stančiny, v ktorej je nástraha poškodená vodou alebo
kontaminovaná nečistotou.
- Dodatočné opatrenia, ktoré sa majú zväzť pri priamom použití: v morách (vonkajšie: okolo
budov, vonkajšie: otvorené priestory a sklady odpadu)
- Nástrahy musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia nečlovečích druhov
zvierat a detí.
- Zakryte alebo zablkujte vstupy do nór s nástrahou, aby ste znížili riziko odmietnutia
a vysypania nástrahy.
- Opatrenia na zmiernenie rizika
- Výrobek sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti
deratizácie.

A. Opatrenia na zmiernenie rizika - profesionáli

Vnútorné vonkajšie: okolo budov

- Nepoužívajte výrobok ako tváľ nástrahu na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na
monitorovanie činnosti hlodavcov.
- Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách
o výrobku (t. j. etiketa a/alebo letáky) sa musí jasne odporučiť, že v prípade domnej
nedostatočnej činnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť
hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať
deratizačnú službu.
- Medzi použitiami neumývajte deratizačné stančiny vodou.
- Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania nástrah.
- Vonkajšie: okolo budov
- Nepoužívajte tento výrobok priamo v nórach.
- Výrobek sa má používať v primeraných deratizačných stančinkách odolných voči manipulácii.
- Používateľ musí náležite označiť deratizačné stančiny podľa odporúčaní o výrobku.
- Hľadajte a odstráňte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako
sa kontrolujú deratizačné stančiny.
- Odstráňte uhynuté hlodavce v súlade s platnou legislatívou. Vyvarujte sa priameho
kontaktu.

B. Opatrenia na zmiernenie rizika - vyskúšaný profesionál

Vnútorné vonkajšie: okolo budov, vonkajšie: otvorené priestory a sklady odpadu

- Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania nástrah.
- V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že
výrobek sa môže dodávať len vyskúšaným profesionálnym používateľom s osvedčením,
ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre
vyskúšaných profesionálnych používateľov“).
- Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.
- Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návadnu ani pomôcky, ktoré sa používajú
na prikrýtych a chránených miestach s nástrahou.
- Vonkajšie: otvorené priestory a sklady odpadu
- Hľadajte a odstráňte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako
sa kontrolujú deratizačné stančiny, aby sa zabránilo sekundárnej otrave.
- Deratizačné stančiny by sa mali kontrolovať aspoň raz za 1 - 2 dni na začiatku procesu,
a potom najmenej raz týždenne. To isté platí pokiaľ aplikácia trvá dlhšie ako 35 dní.

PRVÁ POMOC

V prípade deratívnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom; zasiahnúť
očí vždy skontrolovať, a vyberte kontaktné sošovy, vypláchnite oči tekutinou na výplach
očí alebo vodou, miestach otvorených najmenej 10 minút; orálnej expozície dôkladne
vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí. Nevyvolávajte
zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte obal alebo etiketu
výrobku. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum
v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66.

Ak výrobok prehltnú domáce zvierata, spojte sa s veterinárnym lekárom. Nebezpečné pre
voľne žijúce zvieratá.

OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- Keď umiestňujete deratizačné stančiny blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby
nedochádzalo ku kontaktu nástrahy s vodou.

PODMIEŇKY SKLADOVANIA

Uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú
a mimo priameho slnečného žiarenia.
Uchovávať na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat
a hospodárskych zvierat.

NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODENIE VÝROBKU A JEHO OBALU

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovaný nástrahu a obalový materiál v súlade
s miestnymi požiadavkami.

DAŠIE INFORMACE

- Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich
likvidácii používajte rukavice alebo použijte nástroje, ako napríklad kšestě.
- Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.
- Obsah cholecalciferolu (vitamin D3, účinná látka) v BP (w/w %) 0,077 (technický), 0,075
(čistý) minimálna čistota účinné látky podľa nariadenia (EU) 2019/637: 970 g/kg [(Ph.
eur. 7.0; 01/2008:0575 korigovaný 6.5): min. 970 g/kg (zahŕňa aj akýkoľvek prítomný
prechlecalciferol)].

Horká linka pre bezpečnosť výrobkov ChemTrec: +421 2/330 579 72 (24 hodín denne/24h)



HARMONIX® RODENT PASTE

TIPUL SI DESCRIEREA PREPARATULUI

Momeala sub formă de pastă de culoare verde (20g ambalată în plicuri de hârtie), gata de
utilizare, utilizabilă în stadii de momeala securizate, resursele la intervenții neautorizate
sau plasate în puncte de momeala acoperite și protejate. Formulata pe baza unei
substane active - Cholecalciferol - complet diferită ca mod de acțiune de rodenticidele
clasice, anticoagulate, Harmonix Rodent Paste este fie o soluție alternativă de roție la
anticoagulatele clasice, fie ca prima opțiune acolo unde este necesară mutarea stadiilor
interne (în special a nichililor și nichililor generați de acumularea accelerată și în cantități mari
a calculului din organism, proces ce declanșează blocarea organelor calcificate și moartea
rozătorului prin insuficiență renală, hepatică sau stop cardiorespirator.

COMPOZITIA CALCULATĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanța activă

Denumire IUPAC: Cholecalciferol
Număr CAS 67-97-9; Număr CE 201-573-2
Conținut de substanță activă: 0,077%

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - Substanțe chimice

Simboluri:

Frază de pericol (H): -

Frază de atenție (P): -

Pictogramă (e): -

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ȘI DOZELE DE APLICARE

Pentru sobolani: 100g - 200g pentru fiecare punct de momeala;daca este necesara
aplasarea a mai mult de o statie de intoxicare (punct de momeala), distanta minima dintre
statii va fi de 10-20 metri liniari (în cazul unei infestarii usoare:1-2g/m²) si 3-10 metri liniari
(în cazul unei infestarii masive:2-6g/m²)

o cantitate de 200g produs va trebui adaugata în punctul de momeala în momentul în care
momeala existenta a fost consumata integral, în intervalul de control pre-determinat al
statiilor (1-2 zile)

Pentru porci: 20g pentru fiecare punct de momeala;daca este necesara amplasarea a mai
mult de o statie de intoxicare (punct de momeala), distanta minima dintre statii va fi de
5-10 metri liniari (în cazul unei infestarii usoare:1-2g/10m²) si 2-5 metri liniari (în cazul unei
infestarii masive:2-6g/10m²)

O cantitate de 20g produs va trebui adaugata în punctul de momeala în momentul în care
momeala existenta a fost consumata integral, în intervalul de control pre-determinat al
statiilor (1-2 zile)

Metoda (metodele de aplicare): Momeala rodenticida gata de utilizare pentru utilizare în
stati de intoxicare sau puncte de momeala acoperite (inchise)
Pentru informatii detaliate referitoare la modulul de utilizare, solicitati si consultati actul
administrativ de plasare pe piata al produsului (RO/2022/0338/MRP/DE-0015959-0000)

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE UTILIZARE (utilizare profesionala, pentru utilizare în interior,
exterior, în jurul cladirilor)

Punctele de momeala trebuie vizitate la 1-2 zile dupa instalarea lor, la începutul tratamentului
si, ulterior, saptamanal, pentru a verifica gradul de acceptanta al produsului, ritmul de
consum, integritatea fizica a statiilor de intoxicare si pentru a ridica cadavrele rozătoarelor,
în scopul distrugerii lor. Alimentația statiei de cate ori este nevoie, în functie de ritmul de
consum identificat ca atare înainte de instalarea punctelor de momeala, efectuat o inspectie
documentata (monitorizare) a suprafetelor ce trebuie tratata pentru a identifica exact tipul de
rozătoare, principiile lor areale (zone) de activitate, gradul de infestare, precum si cauzele
principale ce au favorizat aparitia infestarii.Îndepartati sursele alternative de hrana înainte
de tratament (ex.: resturi de mancare, hrana descoperita si usor accesibila), dar nu curatati
afrestat infestati, chiar înainte de tratament, deoarece orice modificare a mediului va crea
neliniste si suspiciune în populatia de rozătoare, ceea ce va declansa mai greu mecanismele
de siguranta la hrănire, facand acceptarea momelei mult mai dificila. Momeala trebuie
securizata, astfel încât rozătoarele sa nu o poata muta afara din punctul de momeala.
Îndepartati resturile de momeala ramase la terminarea tratamentului.

Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

La utilizarea în exterior, când stățiile de intoxicare sunt plasate în apropierea surselor de
apa (sisteme de canalizare, etc), asigurați-vă ca produsul nu poate intra în contact cu apa.
Nu practicați utilizarea punctelor de momeala în scop preventiv; acestea vor fi instalate doar
daca exista dovezi clare de infestare, identificate prin monitorizare pre-tratament.Utilizarea
acestui produs va elimina infestarea totala cu rozătoare într-un interval (timp de acțiune)
de maxim 35 zile. În cazul în care este suspectată lipsa de eficacitate la finalul perioadei
de tratament sus-menționate (ca, de exemplu, inca mai este observată si documentată
activitatea rozătoarelor) se va solicita ajutorul specialist, fie de la producător, fie de la
o firma specializată de deratizare (profesionist instruit).Nu spalati stățiile de intoxicare
cu apa intr realimentările cu momeala. Nu utilizati produsul în tratamente nespecializate
si nemonitizate.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE UTILIZARE (utilizare profesionalist instruiti în activitatea de
deratizare, pentru utilizare în interior, exterior, în jurul cladirilor, în camp deschis, spatii
deschise si în perimetrul gropilor/depozitelor de guno)

Executati, în prealabil, o monitorizare înainte de tratament si o evaluare a nivelului de
infestare, cu scopul de a identifica speciile de rozătoare, principiile lor de activitate
si pentru determinarea cauzelor externe care au dus la aparitia infestatiei. Produsul se trebuie
plasat în imediata vecinatate a locurilor unde activitatea rozătoarelor a fost identificată (ca
de acces, spatii ce pot fi folosite pentru adăpost si iunimite, locuri de hrănire, gauri, vizuini,
acunzisuri, etc.).Momeala trebuie asigurata în interiorul statiei de intoxicare, astfel încât
sa nu poata fi tarata afara. La utilizarea în exterior,plasati punctele de momeala (stățiile
de intoxicare) în locuri nesusceptibile de inundatii accidentale.Înlocuiti momeala si/sau
stăția de intoxicare dacă se constata ca acestea au fost contaminate cu apa dintr-o sursă sau alte
tipuri de contaminanti organici sau anorganici. Momelele trebuie plasate în asa fel încat sa
fie evitat accesul facil la ele de către speciile non-țintă sau copii. Asigurați-vă ca blocul
întrarea în gauri (acunzisuri) astfel încat sa fie evitate respingerea momelei sau scoaterea ei
imprastie în afara rozătoare, în exterior.

Când stățiile de intoxicare sunt plasate în apropierea surselor de apa (sisteme de canalizare,
etc), asigurați-vă ca produsul nu poate intra în contact cu apa.Nu practicați utilizarea
punctelor de momeala în scop preventiv; acestea vor fi instalate doar dacă exista dovezi
clare de infestare identificate prin monitorizare pre-tratament.Utilizarea acestui produs
va elimina infestarea totala cu rozătoare într-un interval (timp de acțiune) de maxim
35 zile. În cazul în care este suspectată lipsa de eficacitate la finalul perioadei de tratament
sus-menționate (ca, de exemplu, inca mai este observată si documentată activitatea
rozătoarelor) se va solicita ajutorul specialist de la producător.Nu spalati stățiile de
intoxicare cu apa intr realimentările cu momeala. Nu utilizati produsul în tratamente
nespecializate si nemonitizate.

DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE

Instrucțiunile de utilizare, masurile de reducere a riscurilor si alte instructiuni de utilizare
prezente la prezentul plic sunt valabile pentru orice utilizare autorizata

Nu utilizați produse rodenticide decât în cazul în care infestarea cu rozătoare este dovedita
prin monitorizare anteratamentului parametrilor infestarii (usoara, medie, puternica) sunt
determinati iar principalele puncte de infestare (necesare pentru amplasarea capcanelor)
corect si judicios identificate si marcate. Cititi si urmati instructiunile de utilizare
a produsului, precum si orice alte informatii disponibile, puse la dispozitie de producator,
inainte de a utiliza produsul.Utilizarea produsului trebuie sa fie parte integranta a unei
strategii integrate de control a rozătoarelor, incluzand (dar fara a se limita la) masuri de
igiena, măsuri de curatenie ante si post-tratament si, acolo unde este posibil, metode fizice (non-
chimice) de control. Acolo unde este posibil, stățiile de intoxicare trebuie fixate de sol sau
pe suprafata pe care sunt plasate. Plasati produsul astfel încat sa fie inaccessibil (greu
accesibil) copiilor, animalelor de casa, animalelor domestice si altor tipuri de vietuitoare
non-țintă. Plasati produsul departe de surse de hrana, apa, hrana pentru animale, cat
si departe de suprafetelor cu care acestea intra în contact.Stățiile de intoxicare trebuie
etichetate foarte clar pentru a arata ca în interior contin momeala rodenticida si nu trebuie
mutate sau deschise. Când utilizati produsul, nu mancati, nu beti si nu fumati. Spalati
măinile si pielea direct expusa, după efectuarea tratamentului.Daca consumul de momeala
este scazut, raportat la dimensiunea asteptata (banuiala) a infestarii (eventual, rezultata din
monitorizarea stățiilor de intoxicare), luati în considerare mutarea stățiilor într-un alt punct banuit
de infestare si înlocuirea formarii de momeala. Dacă, după o perioada de tratament de
35 zile, momelele continua sa fie consumate într-un ritm sustinut si nu se observa nici un
declin în activitatea rozătoarelor, trebuie determinata cauza precisa a acestui fapt. După
ce cauzele fizice si mecanice sunt îndepărtate (clarificate), trebuie luata în calcul utilizarea
unei produs bazat pe un mod diferit de acțiune (produs anticoagulant), cu o alta formulare
(spuma) sau utilizarea de mijloace alternative de control (fizice, mecanice - ex.: capcane).
Momeala rodenticida este biodegradabila si comercializata în pliculete sigilate. A NU SE
DESCHIDE înainte de utilizare.

Măsuri de reducere a riscurilor

Produsul nu va trebui folosit mai mult de 35 de zile fara a fi schimbat sau fara o evaluare
a stării de infestare si a eficientei sale.

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgență: (021) 599 23 00 (interior
182, 444, 213, 455), Toxicologie Clinică a Spitalului clinic de Urgență București, sau la numărul
de urgență (nivel global - 24h de ore din 24), +40 376 300 026 (Compania Chemtrec pentru
Enrv).

INSTRUCȚIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ

Eliminarea deșeurilor de produs si a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu
prevederile legislatiei nationale în vigoare privind regimul deșeurilor, de către operatori
autorizati.

Ambalaj:Recipientele goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeuri periculoase.

CONDITIILE DE DEPOZITARE:

Depozitati produsul în ambalajul original, inchis, într-un spațiu răcoros, uscat, bine
ventilat, protejat de îngheț și ferit de lumina directă a soarelui, la o temperatură sub 40°C.
Se depozitează la locuri inaccesibile pasărilor, animalelor de companie și a animalelor de
fermă. Depozitarea se va face într-un loc accesibil numai personalului autorizat, accesibil
copiilor, pasărilor, animalelor de casa si animalelor domestice.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE

: 36 luni

ALTE INFORMATII:

Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”,
„conține un produs rodenticid”, „denumirea produsului sau numărul de autorizație”,
„substanța(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ”. Pericolul pentru animalele sălbatice în caz de consum excesiv.
Rozătoarele pot fi purtătoare de boli transmisibile periculoase. Nu atingeți rozătoarele
moarte cu mâinile neprotectate, utilizați măști sau instrumente (clești) atunci când le
îndepărtați. Acest produs conține un agent repelenț de gust amar.
Restrictii pentru utilizarea produsului biocid: -
În atenția utilizatorilor: acesta este un produs biocid, Grupa Principală 3 (Pesticide Non-
Agricultorale), Tip de Produs 14 (Rodenticide). A se utiliza numai în scopul pentru care a fost
autorizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta și prospect. Pentru a se evita
riscurile pentru om si mediul inconjurator, se vor respecta instructiunile de utilizare.
Producatorul isi declina orice responsabilitate fata de prejudiciile datorate depozitarii sau
utilizarii neconforme.

UFI: H141-U041-V00N-142J
CEE89240883E - ARTICLE 87288633

Nr. pozvolenia / Cășlo poveleni / Cășlo autorizácie / Autorizaci:

PL/2021/0464/MR z dnia 26.02.2021 r.

CZ-0026734-0000

SK20-019

Nr. RO/2022/0338/MRP/DE-0015959-0000

(PL) Enrv, logo Enrv si Harmonix® sa znakami towarowymi nalezającymi do Environmental Science U.S. LLC lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

(CZ) Enrv a logo Enrv jsou ochranné známky společností Environmental Science U.S. LLC. nebo některou z jejich dočasných společností.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

(SK) Enrv a logo Enrv sú ochranné známky spoločností Environmental Science U.S. LLC. alebo niektorú z jej dočasných spoločností.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

(RO) Enrv, sigla Enrv si Harmonix® sunt mărci comerciale deținute de Environmental Science U.S. LLC sau de unul dintre afiliatii săi.

©2022 Environmental Science U.S. LLC

Podmiot odpowiedzialny / Odpowédnà entita / Drăștitel autorizácie / Numele titularului autorizáciei:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, Francia / Francie / Francúzsko / Franța

+33 (0) 4 51 08 43 21

OKRES WĄŹNOŚCI / NO 36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze pokojowej

DATA PRODUKCIJ / NUMBER SERIAL / POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA - na opakowaniu

DATUM VÝROBY - na obalu

DOBA POUŽITELNOSTI - 36 měsíců

SÉRIOVE ČÍSLO - na obale

DATUM VÝROBY - na obale

DOBA POUŽITELNOSTI - 36 mesiacov od dátumu výroby

SÉRIOVE ČÍSLO - na obale

DATA PRODUCTIE / NUMĂRUL LOTULUI / CAPACITATE AMBALAJ - pe ambalaj

DURATA DE CONSERVARE ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE: 36 luni

