

2) Nagy méretű csótányok, azaz lárvá- és kifejtett állapotú konyhai csótányok (*Blatta orientalis*) ellen: 0,2 g/m² mennyiségben 2, egyenként 0,1 g/m²-es cseppet alkalmazva. Az optimális hatásosság érdekében a gélállapotú csaléteknek legalább 4 hétig a kijuttatási helyen kell maradniuk. Ha a csótányok még mindig láthatók, friss gélállapotú csalétek alkalmazhatók.

3) Lárvá- és kifejtett állapotú amerikai csótányok (*Periplaneta americana*) ellen: 0,2 g/m² vagy 0,3 g/m² mennyiségben 2 vagy/illetve 3, egyenként 0,1 g/m²-es cseppet alkalmazva. Az optimális hatásosság érdekében a gélállapotú csaléteknek legalább 12 hétig a kijuttatási helyen kell maradniuk. Ha a csótányok még mindig láthatók, friss gélállapotú csalétek alkalmazhatók.

4) Ezüstös pikkelykék (*Ctenolepisma longicaudatum*) ellen 0,1422 g/m² mennyiségben. Az optimális hatásosság érdekében a gélállapotú csaléteknek legalább 8 hétig a kijuttatási helyen kell maradniuk. Ha az ezüstös pikkelykék még mindig láthatók, friss gélállapotú csalétek alkalmazhatók. Ne használja havonta egynél többször.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- A biocid termék adagolása a megfelelő géapplikátor segítségével történik. A kezelés befejezése után távolítsa el az üres patronrt, és gondoskodjon biztonságos ártalmatlanításáról. Ha a patronrt nem használta el teljesen, távolítsa el az applikátorról, zárja le a mellékelt zárókupakkal, és az utasításoknak megfelelően tárolja.
- Kezelés előtt a professzionális felhasználóknak ellenőrizniük kell a kezelendő területet, hogy azonosítsák a csótánnyal, illetve ezüstös pikkelykével való fertőzöttség helyszíneit pl. csapdák és/vagy rovarirtó aeroszolok használatával, ürülékek, vedlett bőrök és petetokok felkutatásával stb.
- A maximális hatékonyság érdekében a biocid terméket a csótányok menedékhelyén és annak közelében, valamint, ha lehetséges, e terület és a csótányok élelmiszerforrásai között kell elhelyezni. Továbbá, az optimális hatékonyság érdekében minden, a csótányok számára fogyasztható természetes táplálékforrást el kell távolítani a fertőzött területről, hogy ösztönözzék a csalétek fogyasztását. A biocid terméket helyi kezelés formájában kell kijuttatni sarkok, repedések és hasadékok közelében (pl. berendezések és bútorok, mint például pultok, hűtőszekrények, tűzhelyek, mosogatók, fürdők stb. mögött), üregek, kábelcsatornák, liftnakák, csővezetékek stb. szomszédságában.

A biocid termék különösen hatásosan alkalmazható érzékeny területeken, ahol a hagyományos rovarirtó készítmények csupán korlátozottan használhatók, mint pl. elektromos és elektronikus berendezések stb. közelében. Bevándorló csótányok felismerése esetén a kártevőirtást elősegíti, ha további csalétek helyeznek ki az adott helyszín peremterületén. A biocid terméket csepp vagy vékony csík formájában kell kijuttatni az azonosított célterületre, mégpedig alacsony fényintenzitással, szem előtt nem lévő helyekre.

A csalétek gyermekek vagy háziállatok számára hozzáférhetetlen helyekre cseppentse. Ne alkalmazza túl poros, nedves vagy zsíros helyeken. Ne juttassa ki nedves tisztítószá kitett felületekre. Ne juttassa ki olyan területekre, amelyeket nemrég más rovarirtókkal kezelték, és ne szennyezze más rovarirtókkal a csalétek.

A csótánypopulációra gyakorolt hatás nagyon hamar várható: az elhullott csótányok a kezelést követő 24 órán belül láthatóak lesznek. A kártevőirtás maximális szintje a kezelést követő hat nap és 2 hónap között érhető el, a fertőzöttség mértékétől függően, és amíg a gél jelen van. Ha a fertőzöttség szintje magas, rendszeresen (havonta egyszer) ellenőrizze a biocid termék kijuttatási helyszíneit, és igény szerint juttasson ki további mennyiségben. Azonban ne használja havonta egynél többször. Ezüstös pikkelyke elleni alkalmazás esetén: Juttasson ki számos, apró cseppet az ezüstös pikkelyke élő- és búvóhelyeire. Ezek a területek alapdeszkák/ szegélylécek alatt/mögött, faburkolatok vagy más, búvóhelyet biztosító területek alatt lehetnek.

Nem alkalmas fenntartó kezelésre. Ne alkalmazza állattartásra használt karámkokban és ketrecekben. A régről ottmaradt csalétek/gélcseppek eltávolítását professzionális kártevőirtónak kell végeznie.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÓVINTÉZKEDÉST. HA A KEZELÉS NEM HATÁSOS, TÁJÉKOZTASSA A REGISZTRÁCIÓ JOGOSULTJÁT. NE JUTTASSA KI NEDVSZÍVÓ FELÜLETRE. A KIJUTTATOTT CSEPPEKET NE ÉRJE NAPFÉNY VAGY SUGÁRZÓ HŐ. VÉDJE AZ ESŐTŐL.

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
Veszélyes összetevők: klotianidin
Figyelem: GHS09

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208: 1,2-benzizotiazolin-3-on-t, 5-klór-2-metil-izotiazol-3-on-t/2-metil-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijuttatását.
P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Az említetteken kívül egyéb veszélyek nem ismertek.
Klotianidin: Ez az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT). Ez az anyag nem felel meg a nagy perzisztens és a nagyon bioakkumulatív követelményeknek (vPvB).

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.

FIGYELEM



Kockázatsökkentő intézkedések

- Ne alkalmazza túl poros, nedves vagy zsíros helyeken. Nedves tisztításnak kitett területeken ne alkalmazza. Fordítson különös figyelmet a repedésekre és hasadékokra, valamint a rovarok által általában használt egyéb bejutási pontokra, illetve a gépek, konyhai és fürdőszobai felszerelések vagy csővezetékek mögötti vagy alatti területekre. A termék kijuttatható üregekbe, kábelcsatornákba, liftnakákba, elektromos és elektronikus berendezésekbe stb.
- Nem használható állattartásra használt istállóknak, karámkokban vagy ketrecekben. Alkalmazza nem ajánlott rovarevő madarak és hullók tartására használt létesítményekben.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Viseljen megfelelő védőkesztyűt a termék kezelésekor.
- Kerülje a bőrrel való érintkezést.
- Étkezés előtt és használat után mossa meg a kezét és a termékkel érintkező bőrfelületet.
- Ne használja olyan felületeken, ahol élelmiszert vagy takarmányt tárolnak, készítenek elő vagy fogyasztanak.
- Csak gyermekektől és állatoktól elzárt helyeken használja.
- Ne kísérelje meg a patronok felnyitását vagy újratöltését.

Elősegélynyújtási előírások és környezetvédelmi óvintézkedések
Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az **Orvosi és Környezeti Tájékoztató Szolgálat** díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 20 11 99.

Általános tanács:
Jelentős mennyiség kiömlése esetén a környező javaslatok alkalmazandók. A veszélyes területet el kell hagyni. A sérültet fedtesse stabil helyzetbe, és így szállítsa (oldalra fektetve). A szennyezett ruhát azonnal vegye le, és biztonságosan ártalmatlanítsa. Szükség esetén vigye el az érintett személyt egészségügyi ellátóhelyre, és ha lehetséges, vigye magával a termék csomagolását vagy címkéjét.

SOHA NE HAGYJA MAGÁRA AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa le alaposan bő szappanos vízzel, majd alkalmazzon vizes öblítést. Bőrirritáció /szenzibilizáció kialakulása, fennállása vagy fokozódása esetén forduljon orvoshoz.
Szembe kerülés esetén: Azonnal öblítse ki a szemet bő lagyos vízzel. Ellenőrizze és távolítsa el a kontaktlencsét. Folytassa az öblítést legalább 5 percig. Ha a tünetek fennmaradnak, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén: Hívja a toxikológiai központot vagy forduljon orvoshoz. A száját öblítse ki vízzel. A sérültet vigye friss levegőre és tartsa nyugalomban, légzés szempontjából kényelmes helyzetben. Az anyag lenyelése esetén, ha az érintett személy eszméleténél van, itasson vele kis mennyiségű vizet.

Tanácsok az orvos és az egészségügyi ellátó személyzet számára:
Tüneti és támogató kezelést adjon.

AMENNYIBEN ORVOSI TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE, TARTSA KÉZNÉL A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁT ÉS CÍMKÉJÉT, ÉS HÍVJA A HELYI TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT.

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítandó.
- A felesleges gél friss kijuttatás esetén 5%-os nátrium-klorid-oldatos szivaccsal eltávolítható. A felhasznált szivacsot/papírtörlet szilárd hulladékként kell ártalmatlanítani.
- Az előregedett gél spatulával távolítható el, és szilárd hulladékként ártalmatlanítható.

Egyéb információk

A termék néhány érzékeny anyagon, pl. textíliákon foltot hagyhat. Kétség esetén először kis méretű, nem feltűnő területre juttassa ki. Főbb intézkedések a rezisztencia kialakulása ellen:

- Meg kell határozni a fertőzöttséget megelőző jó higiénés eljárásokat és egyéb (nem kémiai) intézkedéseket.
- A termékeket mindig a címke ajánlásainak megfelelően kell felhasználni a kijuttatandó dózis és a kezelési időközök vonatkozásában. A hatékony dózist, nem pedig annál magasabbat vagy alacsonyabbat kell kijuttatni.
- A kezeléseket különböző hatásmechanizmusú termékekkel felváltva kell végezni, azaz kerülni kell a különböző neonikotinoidok váltakozó alkalmazását. Nem ajánlatos a Maxforce Platin terméket kizárólagosan és folyamatosan használni a csótányok elleni védekezés egyedül anyagaként. A Maxforce Platin terméket olyan integrált kártevőirtási program egyik alkotóelemeként ajánlatos használni, amely magában foglalja a különböző élelmiszeralapú gélkészítményeket, valamint alternatív kémiai osztályú termékeket, amelyek kijuttatási módszere eltérő.
- A hatékonysági szinteket folyamatosan (adott időközökben) ellenőrizni kell, és a csökkent hatékonyságú eseteket ki kell vizsgálni, hogy nem található-e esetleges bizonyíték a rezisztenciára vonatkozóan, figyelembe véve, hogy a higiéniai körülmények és a kezeletlen menedékhelyek közelsége hozzájárulhat az újrafertőződés kockázatához.
- Azokban az esetekben, ahol a címkén szereplő arányok helyes alkalmazása nem biztosítja a szükséges szintű védelmet, és a rezisztencia bizonyítást nyer, bármilyen, azonos hatásmechanizmusú termék, különösen a neonikotinoidok használatát meg kell szüntetni.
- Ha rezisztencia jelei mutatkoznak (amit a védekezés kudarca vagy a megfelelő teszteljárás is jelez), mindent meg kell tenni a populáció megsemmisítése érdekében. A megsemmisítéshez eltérő intézkedések szükségesek a különböző helyzetekben: ide tartozhatnak mind kémiai, mind nem kémiai módszereket magukban foglaló eljárások.

A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett:
Ne engedje megfagyni. Biztonságos helyen tartandó. Felhasználhatósági időtartam környezeti hőmérsékleten: 2 év
Tartalma: 30 g töltőtömeg műanyag patronban

MAXFORCE
Platin

Gel insecticid • Csótányirtó gél

Gel insecticid pentru combaterea gândacilor - adulti și nimfe și a peștișorului argintiu
Conținut în substanță activă: 10 gr./kg (1% w/w) Clothianidin (CAS nr.: 210880-92-5, CE nr.: 433-460-1)

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali.
Certificat de autorizare: RO/2022/0354/MRS/BE2019-0037

Használatra kész, gélállapotú rovarirtó csalétek (RB) lárvá és kifejtett állapotú csótányok, valamint ezüstös pikkelykék ellen

Hatóanyag: 1 % klotianidin (CAS 210880-92-5)
FELHASZNÁLÓI KÖR:
foglalkozásszerű felhasználó

Conține / Tartalma:
4 x 30 g e
envu
Gândaci - adulti și nimfe, peștișorul argintiu
Csótányok lárvái és kifejtett egyedei,
Ezüstös pikkelyke

CITITI INSTRUCȚIUNILE ATĂȘATE ÎNAINTE DE FOLOSIRE.
În atenția utilizatorilor: A se utiliza numai în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și prospect. Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.
Fraze de pericol (H)
H401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediul, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
EUH208: Conține 1,2-Benzizotiazolin-3-onă, Masa de reacție din 5-clor-2- metil-2H-izotiazolin-3- onă și 2-metil-2Hizotiazol-3-ona (3:1). Risc de reacție alergică.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (P)
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273: Evitați dispersarea în mediu.
P391: Colectați scurgerile de produs.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÓVINTÉZKEDÉST.
Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208: 1,2-benzizotiazolin-3-on-t, 5-klór-2-metil-izotiazol-3-on-t/2-metil-izotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi, nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítandó.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijuttatását.
P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Az említetteken kívül egyéb veszélyek nem ismertek.
Klotianidin: Ez az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT). Ez az anyag nem felel meg a nagy perzisztens és a nagyon bioakkumulatív követelményeknek (vPvB).
AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.



UFI: 2S11-P05Q-W00S-U7WW
Definiții autorizate în România:
Bayer SRL, Suc. București - Ploiești nr. 1A, Clădirea B, etaj 1, 013681 Bucharest, Romania
Tel.: +40 21 529-5900
Producător: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, CS90106, 69266 Lyon, Franța
Nr. lot și data fabricației: inscripționat pe ambalaj
Termen de valabilitate: 24 luni

A termék gyártója: Bayer S.A.S., Division Crop Science, 16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Cedex 09, Franciaország
az engedélyes: Bayer Hungaria Kft. Dombóvár út, 26 H-117 Budapest, Magyarország
Gyártási idő: lásd a csomagoláson
Felhasználhatósági időtartam környezeti hőmérsékleten: 2 év

Az engedély száma: HU-2022-MA-18-00065-0006
Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC or one of its affiliates
UA87271129C
ARTICLE 000000879



RO

Autorizat în România ca produs biocid (Grupa principală: 3, Tip produs: 18) sub nr. RO/2022/0354/MRS/BE2019-0037 prin procedeu de recunoaștere mutuală a primei autorizații europene nr. BE2019-0037, emisă în Belgia

Conținut în substanță activă: 10 g/kg (1% w/w) Clothianidin (IUPAC: (E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (Clothianidin) 1%, CAS: 210880-92-5, CE: 433-460-1)

Fraze de pericol (H)

- H401:** Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
- H402:** Conține 1,2-Benzisotiazolin-3-onă, Masa de reacție din 5-clor-2- metil-2H-izotiazolin-3- ona și 2-metil-2Hizotiazol-3-ona (3:1). Risc de reacție alergică.
- H410:** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de prudență (P)

- P102:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P273:** Evitați dispersarea în mediu.
- P391:** Colectați scurgerile de produs.
- P501:** Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Tipul preparatului: Momeală tip gel

Categoriile de utilizatori: Profesionali

Certificat de autorizare: RO/2022/0354/MRS/BE2019-0037

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE

MaxForce® Platin este un gel tip momeală insecticidă, gata de utilizare, pentru controlul (combaterea) gândacilor - adulți și nimfe și a peștișorului argintiu în interior, în diferite locații:

- locații domestice (case, apartamente, alte spații de locuit)
- locații în care se pregătește, servește și depozitează hrana (restaurante, hoteluri, cafenele, terase, pensiuni, etc.)
- locații publice și industriale (școli, spitale, grădinițe, clădiri de birou, spații administrative, aziluri, internate, alte clădiri sociale, etc)
- locații veterinare (grădini zoologice, petshops, adăposturi de animale, cabinete veterinare, laboratoare de ferme etc, (excluzând locațiile în care animalele sunt prezente în cea mai mare parte a timpului: grajduri, cuști, etc).

Principalele specii vizate: Gândacul de bucătărie mic roșu-roșcat (**Blattella germanica**); Gândacul de bucătărie mic negru (**Blatta orientalis**) ; Gândacul negru american/de canal (**Periplaneta americana**), Peștișorul argintiu, Gândăcelul argintiu de umezeală (**Ctenolepisma longicaudatum**).

ATENȚIE



Doza de aplicare recomandată:

Gelul insecticid se aplică sub formă de picături, fie direct dintr-un tub tip seringă cu auto-aplicare, fie cu ajutorul unui dispozitiv specific (gun bait/pistol aplicator).

Frecvența de aplicare: 0,1- 0,3 g/m²

Diluare: o picătură cât un bob de mazăre (0,1g).

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Profesionali.

Numărul și calendarul de aplicare:

Rata de aplicare trebuie să fie corelată cu nivelul de infestare, determinată și documentată prin monitorizare și cu specia de gândac identificat:

- 1) gândacul roșcat de bucătărie (**Blattella germanica**) - forme adulte, juvenile și nimfe:
- 0,1 g/m² (infestare moderată: gândacii apar/sunt văzuți foarte rar în timpul zilei).
 - 0,2 g/m² (infestare moderată: gândacii apar/sunt văzuți foarte des în timpul zilei) = 2 picături de 0,1g/m².

Eficacitate biocidă și timp de acțiune: Picăturile de gel trebuie să rămână în locație pentru o perioadă de 14 zile, pentru atingerea unui randament maxim al tratamentului. La o lună după prima aplicare, picăturile de gel se înlocuiesc cu unele proaspete, dacă mai exista dovezi vizibile de activitate a gândacilor.

2) gândacul negru de bucătărie (**Blatta orientalis**) - forme adulte, juvenile și nimfe - 0,2g/m² aplicând 2 picături de 0,1g/m².

Picăturile de gel trebuie să rămână în locație pentru o perioadă de 4 săptămâni, pentru atingerea unui randament maxim al tratamentului. După această perioadă, picăturile de gel se înlocuiesc cu unele proaspete, dacă mai exista dovezi vizibile de activitate a gândacilor.

3) gândacul american (**Periplaneta americana**) - forme adulte, juvenile și nimfe: 0,2 – 0,3g/m², aplicând 3 picături de 0,1 g/m².

Picăturile de gel trebuie să rămână în locație pentru o perioadă de 12 săptămâni, pentru atingerea unui randament maxim al tratamentului. După această perioadă, picaturile de gel se înlocuiesc cu unele proaspete, dacă mai există dovezi vizibile de activitate a gândacilor.

4) peștișorul argintiu, gândăcelul argintiu de umezeală (**Ctenolepisma longicaudatum**): 0,1422 g/m². Picăturile de gel trebuie să rămână în locație pentru o perioadă de 8 săptămâni, pentru atingerea unui randament maxim al tratamentului. După această perioadă, picăturile de gel se înlocuiesc cu unele proaspete, dacă mai există dovezi vizibile de activitate a gândacilor.

În toate situațiile sus-menționate, dacă se constantă consumul (disparația) picăturilor de gel aplicate anterior, acestea se înlocuiesc cu unele noi.

Instrucțiuni generale de utilizare:

- Produsul biocid este aplicat utilizându-se un dispozitiv specific: pistol de aplicare sau padela de auto-împingere, în cazul tuburilor dotate astfel. Când tratamentul a fost terminat, eliminați tuburile goale în conformitate cu reglementările locale. Dacă tubul a fost doar parțial utilizat, puneți capacul pe vârful tubului și depozitați-l conform instrucțiunilor.

- Înainte de utilizare, utilizatorii profesionali trebuie să monitorizeze suprafața de tratat pentru a identifica principalele zone de infestare (ascunzișurile/cuiburile) pentru gândaci și/sau peștișorul argintiu, utilizând capcane de monitorizare, aerosoli cu efect de flush-out (iritant) pentru aceștia sau căutând urme de fecale și/sau ouă eclozate sau larve năpărlite.

- Pentru o eficacitate maximă, picaturile de gel vor trebui plasate în jurul ariilor de identificare ca fiind zone de infestare sau între acestea și eventualele surse de hrană din incintă.

- Totodată, este obligatoriu pentru o eficacitate sporită a tratamentului ca toate sursele (alternative) de hrană din locație să fie îndepărtate/închise pentru a favoriza ingestia cu un plus de rapiditate a gelului.

- Gelul biocid va trebui plasat sub formă de picături în zona colțurilor încăperilor, pe lângă crăpături și zone ascunse, greu accesibile (în spatele echipamentelor frigorifice sau de gătit, în zona țevilor de apă și a scurgerilor, lângă prize, trasee de cabluri, țevi de apă și de gaz, guri de aerisire, zone de depozitare a gunoului menajer, în baie, în zona scurgerilor și a țevilor de aducțiune (sifon), etc.

- Aplicarea gelului biocid capătă o importanță sporită în zonele de tratament unde intervenția cu insecticide clasice lichide (prin spray-ere) nu este posibilă, ca de exemplu în apropierea instalațiilor electrice sau a echipamentelor electronice.

- Când sunt observate eventuale migrații de populație de gândaci din perimetrul supuse tratamentului către zone învecinate, netratate, tratamentul va fi extins și către acestea, prin plasarea de picături suplimentare de gel.

- Nu plasați picăturile în zone ușor accesibile copiilor (animatorilor de casă și evitați aplicarea lor în locuri vizibile și supuse acțiunii directe a luminii.

- Nu aplicați în zone extrem de murdare, contaminate cu mizerie, prag sau reziduuri de grăsime, precum și în zone supuse curățeniei frecvente prin ștergere cu apă;

- Nu aplicați în zone în care au fost efectuate anterior tratamente cu alte insecticide și nu efectuați, ulterior, tratamente cu alte insecticide pe perioada în care momeliile de gel sunt active.

- Primele semne de eficacitate ale tratamentului (gândaci morți) vor apărea extrem de rapid, în primele 24 de ore de la aplicarea gelului. Nivelul maxim de control va fi atins între 6 zile și 2 săptămâni de la primele aplicări, depinzând de nivelul de infestare și de timpul cât picăturile de gel biocid plasate vor rămâne la locul lor.

- În cazul unor niveluri înalte de infestare, verificați cu regularitate (macar o dată pe lună) locurile în care au fost plasate picăturile și, dacă au fost consumate, aplicați din nou.

- Specific în cazul tratamentelor împotriva peștișorului argintiu: plasați multe picături mici în zonele în care aceste insecte se ascund și trăiesc (mobila, suporturi de lenjerie, lambriuri, zone aflate în apropierea unei surse constante de umiditate).

- Nu aplicați în colivii de pășuni și cuști de animale.

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Informați deținătorul autorizației dacă tratamentul este ineficace și explicați metodologia de tratament folosită.

- Nu aplicați pe suprafețe absorbante.

- Nu aplicați pe locuri expuse luminii, acțiunii directe a razelor solare sau a ploii.

Măsuri de prim-ajutor

General: Îndepărtați-vă din zona periculoasă (contaminată). Așezați (și transportați, dacă este cazul) victima în poziție culcată într-o parte. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și curățați-o separat.

Contactul cu pielea: poate apărea o ușoară senzație de arsură sau înțepătură. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitați sfatul medicului, dacă iritarea persistă mai mult de 24-48 ore.

Contactul cu ochii: clătiți imediat cu multă apă rece, pentru cel puțin 15 minute. Consultați medicul.

În caz de ingestie: Clătiți gura cu multă apă și nu induceți, sub nicio formă, vomă. Nu se consumă niciun aliment sau băutură. Asigurați aerisirea și consultați medicul. Arătați eticheta sau ambalajul.

Antidot: nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o soluție specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive și îmbunătățirea stării generale.

Îngrijiri sub control medical (în caz de intoxicație gravă): consultați fișa de securitate a produsului

CONDIȚIILE DE DEPOZITARE :

Produsul se păstrează în ambalaj original bine închis, ferit de îngheț, uscat și bine ventilat, ferit de accesul păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

Se va păstra departe de lumina directă a soarelui într-un loc accesibil numai personalului autorizat.

În caz de ingestie accidentală, contactați Centrul de Urgență Toxicologică al Institutului Național de Sănătate Publică (telefon urgență: 021.318 36 06; 021.318 36 20 – int. 235 – orele 8:00-15:00) sau la numărul de urgență (nivel global - 24h de ore din 24), +40 376 300 026 (Compania Chemtrec pentru Envu). Institutul de Sănătate Publică București: strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, 050463, București

În atenția utilizatorilor:

A se utiliza numai în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă și prospect. Pentru a se evita riscurile pentru om și mediul înconjurător, se vor respecta instrucțiunile de utilizare. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.



HU

Használatra kész, gélállapotú rovarirtó csalétek (RB) lárvá és kifejlett állapotú csótányok, valamint ezüstös pikkelykék ellen

Hatóanyag: 1 % klotianidin (CAS 210880-92-5)

18. terméktípus – Rovarölő és atkaölő szerek, valamint más izeltlábúak elleni védekezésre használt szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Felhasználói kör: foglalkozásszerű felhasználó

Célorganizmusok

Csótányok lárvái és kifejlett egyedei

- amerikai csótány (*Periplaneta americana*)

- konyhai csótány (*Blatta orientalis*)

- német csótány (*Blattella germanica*)

Ezüstös pikkelyke (*Ctenolepisma longicaudatum*) vegyes korú populáció

Felhasználási terület: BELTÉRI

Használati helyszínek:

- Otthoni helyiségek
- Élelmiszer-kezelésre / -raktározásra használt helyiségek
- Középületek

- Kiszűzemi állattartásra szolgáló létesítmények, azaz állatkertek, kisállat-kereskedések, kennelek, állatorvosi rendelők, laboratóriumi állatházak stb. (csak épületeken belül, takarmánykezelésre és -tárolásra használt helyiségek, kivéve az állattartásra használt istállókat, karámokat és ketreceket).

Alkalmazás módja: csalétek alkalmazása

A biocid termék adagolása a megfelelő gélapplikátor vagy fecskendő segítségével történik.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: 0,1 – 0,3 g/m²

Hígítás (%): 0

A kezelések száma és időzítése: A kijuttatandó mennyiséget a fertőzöttség sűrűségéhez és a talált csótány fajtájához kell igazítani.

1) Kis méretű csótányok, azaz lárvá- és kifejlett állapotú német csótányok (*Blattella germanica*) ellen:

- 0,1 g/m² mennyiségben (mérsékelt fertőzöttség, azaz a német csótányok napközben ritkán láthatók).
- 0,2 g/m² mennyiségben (súlyos fertőzöttség, azaz a német csótányok napközben gyakran láthatók) 2, egyenként 0,1 g/m²-es cseppet alkalmazva

Az optimális hatássosság érdekében a gélállapotú csaléteknek legalább 14 napig a kijuttatási helyen kell maradniuk. Egy hónappal később új, friss gélállapotú csalétek alkalmazhatók, ha a csótányok még mindig láthatók.