



MAXFORCE
Platin

Інсектицид

МАКСФОРС
платина

✓ **Інсектицидний засіб**
Готова до використання
принада-гель для знищення
тарганів

Препаративна форма: гель, що містить
1% клотанідину
Свідцтво про державну реєстрацію:
№ 12.2-18-5/17702

4 x 30 г/г



Tapra



6

Виробник:
Bayer Environmental Science S.A.S
Plant Marle
Rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZI Nord
02250 Marle-sur-Serre, France

16 Rue Jean-Marie Leclair
69266 Lyon, France

Заявник:
Bayer S.A.S.
16 Rue Jean-Marie Leclair
69266 Lyon, France

Термін гарантійного зберігання
5 років від дати виготовлення

Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.



— **ТОКСИЧНО**



UADPM00000453A - ARTICLE D00000880

МАКСФОРС® Platin

Інсектицидний засіб Максфорс Platin призначений для застосування в житлових приміщеннях, приміщеннях побутово-комунальних об’єктів, об’єктах громадського харчування, зоопарках, зоомагазинах, ветеринарних клініках у формі гелю з метою знищення синантропних комах (тарганів). При контактнo-кишковій дії на комах препарат проявляє гостру та залишкову дію.

Спосіб обробки об’єктів, норма витрат
Норма витрати залежить від рівня заселення та видів тарганів.

Вид тарганів	Норма витрати за рівнем заселення* (1 м²)	
	Низький	Високий
Дрібні за розміром (руді таргани або прусаки)	Одна крапля х 0,1 г (g)	Дві краплі х 0,1 г (g)
Великі за розміром (чорні та американські таргани)	Дві краплі х 0,1 г (g)	Три краплі х 0,1 г (g)

Примітка: 1 крапля = 0,1 г (g) діаметром 5 мм (mm).

* Рівень заселення: Низький рівень заселення: комах зрідка з’являються протягом дня. Високий рівень заселення: комах постійно присутні протягом дня.

Перед обробкою приміщення визначають місця найбільшого скупчення та пересування комах. Обробку проводять в місцях скупчення або пересування тарганів: вздовж плінтусів, за меблями, холодильником, плитою, навколо мийки та інших приладів, на поверхні підлоги, в місцях відставання лінолеуму тощо.

Час захисної дії від комах – до 3 місяців після застосування в залежності від рівня заселення тарганами. Повторну обробку препаратом проводять за ентомологічними показниками.

Застережні заходи.
Не підлягають обробці поверхні кухонних столів, обладнання.
Забороняється використання засобу в місцях постійного знаходження тварин.

Уникати попадання засобу на слизову оболонку рота, носа, очей та ділянки шкіри.
Дотримуйтесь інструкції щодо застосування засобу та загальногігієнічних заходів безпеки.

Особи, що страждають алергічними захворюваннями, повинні з обережністю застосовувати інсектицидний засіб.

Сумісність препарату: Рекомендуються попередні тестування на сумісність.

Перша допомога:
При надходженні препарату на слизову оболонку ротової порожнини та шлунок необхідно ретельно прополоскати рот водою. При необхідності звернутися до лікувального закладу. Антитод відсутній. Лікування симптоматичне.

Класифікація ВООЗ: 4 клас (малонебезпечні).

Знешкодження тари та знищення залишків: Інсектицидний засіб після використання викинути з побутовими відходами.

Зберігання: Засіб небезпечний для людей, домашніх тварин, птиці. Зберігати засіб в сухому, прохолодному місці. Зберігати лише в оригінальній упаковці.