



TIPUL PREPARATULUI:

Momeală insecticidă formulată ca gel insecticid lichid, gata de utilizare, cu 0,03% imidacloprid ca substanță activă. Produsul este utilizat pentru combaterea furnicilor, destinat utilizării profesionale și non-profesionale (populație). Organismele țintă: *tymenoptera* (furnici), inclusiv: *Lasius niger* (furnica neagră de grădină), *Tapinoma melanocephalum* (furnica faron) - doar pentru uz în spații interioare) și *Monomorium pharaonis* (furnica faron) - doar pentru uz în spații interioare.

COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1) Substanța activă.	
Denumirea IUPAC:	Imidacloprid
Nr. CAS:	138261-4103
Nr. CE:	428-040-8
Conținut de substanță activă:	0,03%

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice

H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P102	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273	Evitați dispersarea în mediu.
P280	Purtați măști de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P391	Colecționați scurgerile de produs.
P501	Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform reglementărilor locale.

POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE (lit.h)

A supra sănătății umane

Evaluarea pericolului pentru acest produs se bazează pe proprietățile intrinseci ale componentelor sale utilizând metoda de calcul a CLP.

Produsul nu este considerat periculos pentru sănătatea umană în concordanță cu Directiva 1999/45/CE și Regulamentul CE 1272/2008 (CLP)

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Simptome: Dacă au fost înghițite cantități mari de produs, pot să apară următoarele simptome: amețeli, dureri abdominale, greață. Riscurile și simptomele descrise au fost observate după administrarea unor cantități semnificative de substanță/e activă/e. Datorită concentrației scăzute, ingerarea unei cantități periculoase din acest produs este puțin probabilă.

Având în vedere datele privind toxicitatea acută pentru imidacloprid și coformulanții și aplicarea metodei de calcul în conformitate cu CLP, nu este necesară clasificarea toxicității acute prin calea orală, dermală sau prin inhalare. Testele au fost realizate pe o formulare similară.

Toxicitate acută orală: DL₅₀ (șobolan) > 2.500 mg/kg.

Toxicitate acută prin inhalare: În cazul unei utilizări atente și prudente, nu se formează aerosoli respirabili.

Toxicitate acută dermală: DL₅₀ (șobolan) > 2.000 mg/kg .

Iritatii pielii: Nu irită pielea (iepure).

Iritatii ochilor: Nu irită ochii (iepure).

Sensibilizare: Nu este sensibilizant. (cobai) Metoda OECD 406, testul Magnusson & Kligman.

Evaluarea toxicității la doze repetate: Imidacloprid nu cauzează toxicitate asupra organelor țintă, conform studiilor efectuate pe animale.

Evaluarea mutagenicității: Imidacloprid nu este mutagenic sau genotoxic, pe baza testelor in vitro și in vivo efectuate pe un lot de subsuebi.

Evaluarea carcinogenității: Imidacloprid: în urma studiilor de toxicologie cronice administrare prin hrană la șobolani și soarece pe parcursul vieții), nu s-au identificat efecte carcinogene.

Evaluarea toxicității pentru reproducere: Imidacloprid a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generații de șobolani numai la doze toxice și pentru părinți. Toxicitatea la reproducere observată la imidacloprid este legată de toxicitatea parentală.

Evaluarea toxicității pentru dezvoltare: Imidacloprid a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Efectele asupra dezvoltării observate la imidacloprid se referă la toxicitatea maternală.

Expunerea care rezultă din utilizarea propusă a Maxforce Quantum este considerată a fi în limite acceptabile pentru operatorii profesioniști și neprofesioniști, lară obligația de a purta echipament individual de protecție (cu toate că, din perspectiva igienei publice, operatorii profesioniști pot furta mânuși în orice caz). Produsul nu este clasificat din perspectiva expunerii umane și, prin urmare, nu este necesar,

echipament individual de protecție pentru a răspunde efectelor locale. Riscul la care sunt expuși copiii și animalele de companie de la expunerea pe cale orală este considerat acceptabil, menționând, de asemenea, că utilizatorii trebuie instruiți în conformitate cu următoarele fraze de etichetare.

Profesioniști

«UTILIZAȚI NUMAI în locuri inaccesibile copiilor și animalelor».

Nonprofesioniști

«PREVENIREA ACCESULUI LA MOMELI de către copii și animale»

În plus, nu a fost efectuată nicio evaluare a expunerii consumatorilor pe baza faptului că momeala nu este utilizată în locații care ar putea contamina alimente, hrană sau udate pentru care se aplică următoarea frază de etichetare care se aplică atât profesioniștilor, cât și celor neprofesioniști: «NU UTILIZAȚI în cazul în care alimentele, hrana pentru animale sau apa ar putea deveni contaminate.

Asupra sănătății animalelor nevizitate: Dacă animalul de companie vin în contact cu momeala, ar putea consuma deși în majoritatea cazurilor acest lucru este puțin probabil datorită gustului. În cazul unei utilizări atente și prudente, produsul nu formează aerosoli respirabili; nu este iritant pentru piele, ochi, nu este sensibilizant, nu cauzează toxicitate asupra organelor țintă, conform studiilor efectuate pe animale.

Asupra mediului: Sol: Substanța activă nu îndeplinește criteriile PBT.

Apă: Substanța activă nu îndeplinește criteriile PBT. Log Kow-4,6 (25°C)

Aer: Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

Organisme acvatice: Produsul prezintă un risc acceptabil considerând efectul acut și cronic de categoria I asupra mediului acvatic.

Alte organisme nețintă: Produsul nu prezintă risc neacceptabil pentru organismele din mediul terestru, dar poate avea efecte adverse asupra albinelor și a altor artropode nețintă.

ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Evaluarea eficacității biocidelor (1)	Test de teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	1 stație de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi	Reducerea populației > 90% în toate mușuroaiele după 4 săptămâni. 3 mușuroaie fără populație după 5 săptămâni, celelalte 3 - activitate redusă
Evaluarea eficacității biocidelor (2)	Test de teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	Pentru 5 mușuroaie-1 stație de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi. Pentru 6 mușuroaie- 2 stații de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi.	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în 4 mușuroaie; 70%-1 mușuroi; 77%-1 mușuroi; 2 mușuroaie fără populație după 5 săptămâni, celelalte 4 - activitate redusă
Evaluarea eficacității biocidelor (3)	Test de teren-1 mușuroi tratat	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	1 stație de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90%
Evaluarea eficacității biocidelor (4)	Test de teren-6 mușuroaie tratate: 2 în interior și 4 în exterior	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	1 stație de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi	În interior: reducerea populației după 4 săptămâni: >90% pentru ambele mușuroaie. În exterior: reducerea populației după 4 săptămâni: >90% pentru 3 mușuroaie și aprox. 62% pentru 1 mușuroi.
Evaluarea eficacității biocidelor (5)	Testare în laborator la alegere (momeală/sursă alternativă de hrană)-4 repetări.	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	Momeală insecticidă	Fumici la suprafață: 34.5: 22,7; 2,6/0 și 0 după 7, 14, 21, 28 și 35 zile. Fumici în sol: 26,8; 15,4; 0; 0 și 0 după 7, 14, 21, 28 și 35 zile. FCS: 97 și apoi 18, 2 și 1 după 1,3 și 15 zile.
Evaluarea eficacității biocidelor (6)	Test în teren-1 mușuroi tratat	<i>Lasius niger</i> (furnica neagră de grădină)	1 stație de intoxicare cu 2 g produs/ mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90%

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Evaluarea eficacității biocide (7)	Test în teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	2 g produs /mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în toate mușuroaiele
Evaluarea eficacității biocide (8)	Test în teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	1 g produs /mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în 3 mușuroaie: aprox 33% în 1 mușuroi; 28% în 1 mușuroi; aprox 30% în 1 mușuroi
Evaluarea eficacității biocide (9)	Test în teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	1 g produs /mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în 3 mușuroaie: aprox 6% în 1 mușuroi; 8% în 1 mușuroi; aprox 23% în 1 mușuroi
Evaluarea eficacității biocide (10)	Test în teren-6 mușuroaie tratate	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	2 g produs /mușuroi	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în toate mușuroaiele. 3 mușuroaie - fără populație după 5 săptămâni, celelalte 3 - activitate redusă
Evaluarea eficacității biocide (11)	Test în teren-1 mușuroi tratat	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	1 stație de intoxicație cu 2 g produs	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în toate mușuroaiele
Evaluarea eficacității biocide (16)	Test simulat în laborator, cu momeală proaspătă și momeală îmbătrânită la 54°C timp de 2 săpt.; 1 repetare	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	Momeală insecticidă	Momeală proaspătă și momeală îmbătrânită: scor pretratament = 4, scor după 3 zile = 0
Evaluarea eficacității biocide (17)	Testare la alegere: momeală îmbătrânită 3 ani/ hrană.	<i>Lasius niger</i> (fumica neagră de grădină)	Momeală insecticidă	Mortalitate 100% după 24h pentru momeala proaspătă și cea îmbătrânită. După 6 săpt.: mortalitate 66% pentru momeala proaspătă și 37% pentru momeala îmbătrânită.
Evaluarea eficacității biocide (18)	Test în teren-114 apartamente de bloc	<i>Monomorium pharaonis</i> (fumica fantomă)	1.6-4.96g produs/ apartament. După 1 săpt. s-a efectuat al 2-lea tratament într-unul din blocuri, deci: 1.6-9.92 g produs/ apartament	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90%
Evaluarea eficacității biocide (19)	Test în teren-16 apartamente de bloc	<i>Monomorium pharaonis</i> (fumica fantomă)	200g produs/ spot-3g produs /apartament	Reducerea populației după 4 săptămâni: >90% în 14 apartamente
Evaluarea eficacității biocide (20)	Test de laborator	<i>Tapinoma melanoccephalum</i> (fumica fantomă)	Picături care conțin Invertex 81/55 și 0,0025,0,005; 0,01; 0,03 sau 0,05% imidacloprid	Mortalitate 100% după 1 zi pentru 0,03% imidacloprid
Evaluarea eficacității biocide (21)	Test în teren-4 apartamente de bloc	<i>Tapinoma melanoccephalum</i> (fumica fantomă)	200g produs/m ²	Reducerea populației după 3-28 zile: > 90% în toate apartamentele.
Evaluarea eficacității biocide (22)	Test în teren-8 case	<i>Linepithema humile</i> (fumica argentină)	200g produs/m ²	Reducerea populației după 3-22 zile: > 90%
Evaluarea eficacității biocide (25)	Test simulat în laborator: 1 repetare (stație de intoxicație experimentală și de înșuruită)	<i>Linepithema humile</i> (fumica argentină)	2 g produs /stație de intoxicație	Experimental: Activitate 0/foarte rară după 7 zile Obșnuit: Activitate 0/foarte rară după 7 zile
Evaluarea eficacității biocide (26)	Test în teren- apartamente de bloc	<i>Monomorium pharaonis</i> (fumica faraon)	36 ap. tratate cu Invertex 81/55 și 0,01% imidacloprid 39 ap. tratate cu Invertex 81/55 și 0,05% imidacloprid Rata de aplicare : 165 mg produs/m ²	Reducerea populației după 4 săpt.; >90% în 12 ap.

Intitaie	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia	Concentraia	Tempi de aciune
luarea eficacitii ide (27)	Test simulat, 5 repetri	<i>Monomorium pharaonis</i> (furnica faron)	Rata de aplicare: 205 mg produs/m ²	Reducerea populaiei in 3-7 spt., >90% in 12 ap.

RUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

de utilizat:

ai interioare (In cas/ spaii private, bucatrii, sufragerii i pivnii)

ai exterioare: Teras, trotuare, curi interioare, intrri n soproane i garaje.

ul clădirilor

va utiliza pe sol, peluze ori straturi de flori.

da de aplicare

ru utilizare in spaii interioare, produsul se aplic pe traseele folosite de furnici, iar in cazul utilizării in spații exterioare, produsul se aplic în furii i crăpături si de-a lungul traseelor folosite de furnici

terase, trotuare, curi interioare, intrri n soproane i garaje, etc.

zul in care mușuroiul este localizat pe pamant pavat (podele pietruite, beton, etc) produsul poate fi aplicat și direct la intrarea in mușuroi.

si faevetarea aplicare: 1 punct de 200 mg (1 cm Ø m²) sau 1 punct de 200 mg

in 9 m² /m linia) pe traseele folosite de furnici.

ru tratarea mușuroaielor, inecție 2 g produs, care echivalează cu ½ din cantitatea din tub sau 10 puncte direct la intrarea n mușuroi.

goria de utilizatori: profesionali si non-profesionali

specifice de utilizare-Utilizare non-profesională

hideți tubul și stoacți picături mici de insecticid de aprox. 1 cm Ø (200 mg) fiecare. Puneți aceste picături de-a lungul traseelor folosite de furnici. Închideți tubul după utilizare. Cititi intotdeauna eticheta

adulnt înainte de utilizare i respectai instrucțiunile cuprinse in acestea. Informaii titularul autorizaiiei daca tratamentul este inefficient. Aplicați produsul in zone ferite de lumină solară directă ori surse

caldura (ex. Nu aplicați sub radiator). Verificai punctele de insecticid aplicat o dată pe săptămână. Dacă infestarea persistă in ciuda respectării instrucțiunilor de pe etichetă, contactai un specialist in

uterea dăunătorilor. Evitai utilizarea continuă a produselor.

ri de reducere riscurilor specifice utilizării-Utilizare non-profesională

uți-vă mâinile i pielea expusă înainte de a lua masa și după fiecare utilizare. Nu lsați insecticidul la îndemâna copiilor i a animalelor. Păstrați produsul într-un loc sigur.

utilizați produsul in locurile in care ar putea fi contaminate produsele alimentare, hrana animalelor sau apa.

material și ambalajul acestuia trebuie să fie eliminat in siguranță.

utilizați produsul pe sol, peluze ori straturi de flori.

zul utilizării acestui produs biocid in spații exterioare, aplicați doar in furii i crăpături sau direct pe mușuroaielor de furnici.

utilizați accesul albinelor i protejai împotriva condițiilor meteo acoperind zonele in care ați aplicat produsul, de exemplu cu un ghiveci sau cu o bucata de țigla, asigurați-vă că furnicile pot ajunge în

uare la insectid. Nu aplicați produsul pe suprafețe dure sau pe sol pe unde trec furnicile. Dacă infestarea persistă, ar putea fi necesară replicarea.

ai când utilizați produsul in jurul clădirilor, nu aplicați in apropierea scurgerilor. Dacă zona tratată este conectată la canalizare sau la scurgerea pentru colectarea apei pluviale, aplicați produsul doar in

le in care nu ajunge apă de ploaie, apele de inundații și apa folosită pentru curățare.

specii specifice de utilizare-Utilizare profesională

usul este distribuit cu ajutorul unui aplicator de gel corespunzător. După finalizarea tratamentului, scoateți cartușul gol și eliminați-l in siguranță. În cazul in care cartușul a fost utilizat doar parțial,

teți) din aplicator, sigilați-l cu capușă furnizat i corespunzător.

hideți tubul și stoarceti picături mici de insecticid de aprox. 1 cm Ø (200 mg) fiecare.

și aceste picături de-a lungul traseelor folosite de furnici. Închideți tubul după utilizare.

și utilizarea continuă a produselor.

ntotdeauna eticheta sau pilantul înainte de utilizare i respectai instrucțiunile cuprinse in acestea. Informaii titularul autorizaiiei daca tratamentul este inefficient. Aplicați produsul in zone ferite de

ă solară directă ori surse de căldură (ex. Nu aplicați sub radiator).

uți punctele de insecticid aplicat o dată pe săptămână. Evitai utilizarea continuă a produselor.

ri de reducere a riscurilor specifice utilizării-Utilizare profesională

LA UTILIZAREA DE CĂTRE PERSOANE SPECIALIZATE. EVITATI CONTAMINAREA EXCESIVA A HAINELOR DE PROTECTIE.

utilizați produsul in locurile in care ar putea fi contaminate produsele alimentare, hrana animalelor sau apa. Nu lsați insecticidul la îndemâna copiilor si a animalelor. Păstrați produsul într-un loc sigur

se aplică pe suprafețe dure sau soluri goale utilizate ca poteca.

Se va împiedica pătrunderea în apele de suprafață, în sistemul de canalizare sau în apele din pânza freatică.

caz de dispersie accidentală:

Informații disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la formulat precum și pătrunderea acestuia în sol. Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

decontaminare:

Dispersiei accidentale absorbite scurgerile cu materiale inerte (nisip, silicagel, rumeguș), colectați și plasați în recipiente închise, adecvate pentru eliminare.

ele goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeurile periculoase.

PREVENIRE PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE

se va păstra într-un loc sigur. Insecticidul nu trebuie lăsat la îndemâna animalelor. Produsul nu se va utiliza în locurile în care ar putea fi contaminate produsele alimentare, hrana animalelor sau utilizul utilizării produsului în spații exterioare, se va aplica doar în fisuri și crăpături sau direct pe mușuroaiele de furnici. Se va împiedica accesul albinelor și se va proteja împotriva condițiilor meteo

zile în care se aplică produsul, de exemplu cu un gheveci sau cu o bucată de țiglă, asigurându-se ca furnicile pot ajunge în continuare la insecticid. Produsul nu se aplică pe suprafețe dure sau

unde trec furnicile. Dacă infestarea persistă, ar putea fi necesară reaplicarea. Atunci când produsul se utilizează în jurul clădirilor, nu se aplică în apropierea scurgerilor.

utilizării acestui produs biocid în spații exterioare, aplicați doar în fisuri și crăpături sau direct pe mușuroaiele de furnici.

și accesul albinelor și protejați împotriva condițiilor meteo acoperind zonele în care ați aplicat produsul, de exemplu cu un gheveci sau cu o bucată de țiglă, asigurându-vă că furnicile pot ajunge în

și insecticid. Nu aplicați produsul pe suprafețe dure sau pe sol pe unde trec furnicile.

infestarea persistă, ar putea fi necesară reaplicarea.

nu utilizați produsul în jurul clădirilor, nu aplicați în apropierea scurgerilor. Dacă zona tratată este conectată la canalizare sau la scurgerea pentru colectarea apei pluviale, aplicați produsul doar în

re nu ajunge apa de ploaie, apele de inundații și apa folosită pentru curățare.

Se

utarea ambalajelor/containerelor închise, nu sunt necesare precauții speciale.

specta regulile generale privind manipularea manuală a ambalajelor.

la contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

ând spălarea mâinilor și pielea expusă înainte de a lua masa și după fiecare utilizare. Hainele contaminate se scot imediat și se curată bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curățate

prin ardere.

Utilizare profesională:

iza doar de către persoane specializate.

ia contaminarea excesivă a hainelor de protecție.

ȚIURI DE PRIM AJUTOR

generale: Prin natura produsului-atunci când este păstrat în ambalajul original-scurgerile accidentale sunt puțin probabile. Totuși dacă au loc scurgeri accidentale de produs se va ieși din zona

să. Așezați apoi transportați victima într-o poziție laterală stabilă. Scoateți imediat hainele contaminate și depozitați-le în siguranță.

cu pielea: Se va spăla imediat cu apă și săpun.

cu ochii: Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute și continuați să clătiți cu

a acordă asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Se va clăti gura. NU se va induce starea de vomă. Se va anunța imediat un medic sau spitalul de urgență.

importante simptome și efecte acute și cronice: Dacă au fost înghițite cantități mari de produs, pot să apară următoarele simptome: amețeli, dureri abdominale, greață. Riscurile și simptomele

au fost observate după administrarea unor cantități semnificative de substanță/e activă/e. Datorită concentrației scăzute, ingerarea unei cantități periculoase din acest produs este puțin probabil.

privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: Se va trata simptomatic. Monitorizați funcția aparatului respirator și parametrii cardiovasculari. În cazul ingesției

ții importante de produs, lavaj gastric se va aplica NUMAI în intervalul primelor două ore de la ingestie. În toate cazurile se recomandă administrarea de cărbune activ și sulfat de sodiu. Nu

este un antidot specific.

PREVENIRE PROTECȚIA MEDIULUI

ntul utilizarea produsului biocid:

lică pe sol, peluze și straturi de flori. Protejați împotriva albinelor și ploi prin acoperire, de ex. cu gheveci de floare sau cu țigla. Nu se aplică pe suprafețe dure sau soluri goale utilizate ca poteca

Se va împiedica pătrunderea în apele de suprafață, în sistemul de canalizare sau în apele din pânza freatică.

caz de dispersie accidentală:

Informații disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului

la formulat precum și pătrunderea acestuia în sol. Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

decontaminare:

Dispersiei accidentale absorbite scurgerile cu materiale inerte (nisip, silicagel, rumeguș), colectați și plasați în recipiente închise, adecvate pentru eliminare.

ele goale, cu urme de produs, trebuie eliminate ca deșeurile periculoase.

PREVENIRE PROTECȚIA ANIMALELOR ȘI A HRANEI PENTRU ANIMALE

se va păstra într-un loc sigur. Insecticidul nu trebuie lăsat la îndemâna animalelor. Produsul nu se va utiliza în locurile în care ar putea fi contaminate produsele alimentare, hrana animalelor sau

utilizul utilizării produsului în spații exterioare, se va aplica doar în fisuri și crăpături sau direct pe mușuroaiele de furnici. Se va împiedica accesul albinelor și se va proteja împotriva condițiilor meteo

zile în care se aplică produsul, de exemplu cu un gheveci sau cu o bucată de țiglă, asigurându-se ca furnicile pot ajunge în continuare la insecticid. Produsul nu se aplică pe suprafețe dure sau

unde trec furnicile. Dacă infestarea persistă, ar putea fi necesară reaplicarea. Atunci când produsul se utilizează în jurul clădirilor, nu se aplică în apropierea scurgerilor.