

列喜镇®



列喜镇® 空间喷洒水乳剂


蚊蝇飞虫一击即中，无色无味持续见效

安蔚优环境科技(上海)有限公司
服务热线:400 186 8282

专利抗蒸发技术, 雾滴悬浮持久更长效

安蔚优根植于拜耳百年的历史经验, 利用FFAST抗蒸发技术, 研制了广受PCO与终端客户欢迎的**列喜镇®**水乳剂。旨在延缓空间喷洒中雾滴的快速蒸发, 从而实现药液在空间中的长效滞留, 持续击倒环境中的蚊蝇飞虫并致其死亡。经验证明, **列喜镇®**的药效作用时长往往能达到同类产品的3倍以上。


FFAST技术原理



FFAST是一种在雾滴表面形成薄膜, 起到抗蒸发作用的制剂技术

这项技术由拜耳研发, 可以让水乳剂的抗蒸发表现与油相接近。FFAST抗蒸发薄膜由长链醇组成, 正是这种薄膜使得雾滴高度耐蒸发。因此, 在空间喷洒时它能让雾滴始终保持最佳尺寸和稳定性。

薄膜图示



空间喷洒时, 理想的雾滴直径在20-25微米之间, 这么小的雾滴会在几秒钟内蒸发、消失, 无法起到杀灭蚊虫的作用。**列喜镇®**抗蒸发技术使得该技术难题得以解决, 以10倍稀释的药液为例, **列喜镇®**的抗蒸发表现远优于标准乳油。

空间中药液滞留时间越长,能击倒并致死的蚊蝇飞虫就越多 从而有效提高PCO单次作业效率

蚊子



经马来西亚塞恩斯大学室外实验证明,使用**列喜镇®**灭杀敏感品系伊蚊,即使在100米的施药距离,也能保证100%的致死率;若是灭杀野生品系伊蚊,致死率则保持在93%以上。

敏感品系-伊蚊室外现场实验数据

防控距离	击倒率			致死率
	15分钟	30分钟	60分钟	24小时内
25m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
50m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
75m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
100m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
平均值±标准差	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00

野生品系-伊蚊室外现场实验数据


防控距离	击倒率			致死率
	15分钟	30分钟	60分钟	24小时内
25m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
50m	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
75m	97.67±1.67	100.00±0.00	100.00±0.00	100.00±0.00
100m	78.33±1.67	93.33±1.67	100.00±0.00	93.33±1.67
平均值±标准差	93.75±5.19	98.33±1.67	100.00±0.00	98.33±1.67

苍蝇



我们同样进行了养鸡场防制家蝇的实验。在不同的家蝇密度环境中,使用了20倍稀释的**列喜镇®**进行空间喷洒。20分钟后,家蝇防控率均接近100%。

不同苍蝇密度水平



进口品质保障, 无色无味适用于多数敏感环境

从原药到助剂、再到生产灌装, **列喜镇®** 全程保障进口品质。药剂稀释后, 对眼睛、皮肤、鼻子和喉咙均无刺激, 不会影响施药人员和终端客户, 也不会 在施药表面留下药痕与气味, 能够带来更高品质的客户体验。

曾作为中国2008奥运会首选空间喷洒产品、G20峰会推荐使用产品、2019年武汉军运会推荐使用产品。



海关进口货物报关单



入境货物检验检疫证明

列喜镇®推荐使用场景

使用**列喜镇®**在室内进行空间喷洒后, 采取暂时封闭措施效果会更好。

就开放式的房间而言, 建议封闭15分钟后方可进入; 就紧闭式的房间而言, 1小时后方可进入。进入后请对现场的裸露表面进行擦拭, 对地面的死虫进行清理。



列喜镇®产品药效获权威机构试验认证



世界卫生组织(WHO) 推荐产品




FFAST专利 技术说明



中国卫生有害生物防治协会 推荐产品



中国疾病预防控制中心 中心实验证明



符合FDA标准



使用范围和使用方法

场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
室内	蝇	0.025毫升/立方米	超低量喷雾
室内	蚊	0.0125毫升/立方米	超低量喷雾

储存和运输方法

- 本品应以原包装置于阴凉、干燥和通风处。加锁保存，避免儿童等无关人员接触。
- 勿与食品、饮料、饲料、种子、肥料等其他商品同贮同运。
- 搬运及运输过程中，轻拿轻放，切勿倒置。运输中应注意防雨防潮。

注意事项

- * 对人、畜有毒，使用本品时应采取安全防护措施，穿戴防护服和手套，避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。
- * 对鱼等水生动物、蜜蜂、蚕有毒，使用时注意不可污染鱼塘等水域及饲养蜂、蚕场地。蚕室内及其附近禁用。禁止在鱼塘等水域清洗施药器具。
- * 喷药后及时脱下衣服，用洗衣粉水洗涤，并用肥皂水冲洗皮肤裸露部位。
- * 不要与碱性物质混用。切勿向人体、食物使用。置于儿童接触不到的地方。
- * 孕妇、哺乳期妇女及过敏者禁用；使用中有任何不良反应请及时就医。
- * 为降低人、畜等无关人员的暴露风险，施药后需要密闭1小时后，其他人员再进入施药区域。

技术参数：

农药登记证号：WP20080090

产品剂型：水乳剂

质量保证期：2年

包装规格：1升/瓶*12瓶/箱

有效成分及其含量：

- 击倒剂：S-生物烯丙菊酯 1.4克/升
- 致死剂：氯菊酯 102.6克/升
- 增效剂：胡椒基丁醚 98.5克/升

安蔚优Envu有害生物防治产品一览表

产品名称	有效成分及含量	产品剂型	包装规格	标签登记靶标害虫									使用方法	
				蚊	蝇	蜚蠊	蚂蚁	臭虫	跳蚤	老鼠	白蚁	仓储害虫		
特姆得®	吡虫啉21% + 高效氟氯菊酯10%	悬浮剂	8毫升/支*5支*40盒/箱	•	•	•	•	•	•					滞留喷洒
			100毫升/瓶*50瓶/箱											
除敌®	溴氰菊酯25克/升	悬浮剂	1升/瓶*12瓶/箱	•	•	•			•					滞留喷洒
凯素灵®	溴氰菊酯2.5%	可湿性粉剂	50克/袋*120袋/箱	•	•	•		•						滞留喷洒
快康®	噁虫威80%	可湿性粉剂	10克/袋*20袋*12盒/箱	•	•	•								滞留喷洒
列喜镇®	氯菊酯102.6克/升 + S-生物烯丙菊酯1.4克/升	水乳剂	1升/瓶*12瓶/箱	•	•									空间喷洒
拜灭优®	氟虫腈0.05%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			•								施点投放
拜灭士®	吡虫啉2.15%	胶饵	30克/支*4支*20盒/箱			•								施点投放
拜灭易®	吡虫啉0.03%	胶饵	20克/支*5支*30盒/箱				•							施点投放
立克命®	杀鼠醚0.75%	追踪粉剂	100克/盒*24盒/箱								•			直接施撒或配制毒饵
立克命®	溴敌隆0.005%	蜡块(丸)	蜡丸:4.5公斤/桶(3克/粒) 穿孔蜡块:6公斤/桶(15克/块)								•			直接投饵 穿孔蜡块可固定在诱饵站内
特密得®	氟虫腈25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱									•		滞留喷洒
			100毫升/瓶*80瓶/箱											
凯安保®	溴氰菊酯25克/升	乳油	1升/瓶*12瓶/箱									•		滞留喷洒

安蔚优®

envu

安蔚优环境科技(上海)有限公司
上海市静安区昌平路363号1幢4层
邮政编码:200040
服务热线:4001868282



关注安蔚优
专业虫害防治公众号



扫码进入商城
了解及购买更多产品



扫码注册
PCO锦囊小程序