

“Bayer: Science For A Better Life”

Environmental Science: Vi giver vores kunder første valgs løsninger på beskyttelse og pleje af miljøet, som vi alle lever, arbejder og leger i.

Hvis du ønsker flere oplysninger om produkter, etiketter og sikkerhed, kan du besøge:
www.environmentalscience.bayer.dk



Racumin[®] FOAM

Beskyt dig mod rotterne



Bayer

Carl Peter Elgaard, Business Manager Bayer Crop Science ES Professional Business. Mobil: + 45 24 29 99 72.
E-mail: carl-peter.elgaard@bayer.com www.environmentalscience.bayer.dk.

*Bekæmpelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.*



Racumin[®]
FOAM



Racumin[®]
FOAM

Det eneste alternativ for bekæmpelse uden lokkemad



Racumin Foam er et 1. generations antikoagulant i en unik skumformulering der bekæmper rotter uden lokkemad. Derved kan også dyr som undgår ædegiften bekæmpes effektivt. Det bløde skum klæber sig fast i pelsen på dyrene og indtages når dyrene rengør pelsen. Skummet er stabilt i op til 12 dage men er aktivt længere. Racumin Foam kan bruges som supplement til alle typer af bekæmpelse. Racumin Foam bekæmper brun rotte i f.eks. stalde og andre bygninger.

- ✓ Specielt egnet hvor rotterne afviser ædegiften.
- ✓ Enkelt at applicere med aerosolflaske og forlængelsesrør.
- ✓ Anvendes ved rørgennemføringer, hulrum og andre små rum hvor dyrene bevæger sig.
- ✓ Op til 50 appliceringer per flaske.

- Dosering: Fra 5-10 g per appliceringspunkt
- Indeholder: Coumatetralyl 0,4% – indeholder Bitrex[®], et bitterstoff som modvirker intagelse af mennesker og kæledyr
- Pakning: Aerosol



Sådan bruger du Racumin Foam



1

Ved hjælp af forlængelsesrøret kan skummet appliceres på præcis det rigtige sted hvor dyrene ofte bevæger sig. Skummet må ikke lukke hullet/passagen helt således, at rotterne ikke kan genkende deres vante huller/passager.



2

1 time senere – billedet viser hvordan skummet klæber sig til rottens pels.

Et appliceringspunkt modsvarer til 3-10 gr. Racumin Foam hvilket giver ca. 50 appliceringspunkter per flaske.

Mængde skum per hul/passage*: Ved normal stuetemperatur ca. 20 C anbefales at trykke følgende antal sekunder på flasken for at applicere den rigtige mængde. Ved lavere temperaturer kan behøves et længere tryk for samme mængde.

Rotte:

Lille applicering: 5-7 gram - ca. 4 sekunder

Stor applicering: 10-14 gram - ca. 8 sekunder

Praktisk eksempel: Skum som supplement til ædegift indendørs

- ✓ 80% ædegift og 20% skum til en svinestald ca. 1000 m² (50*20) * 2,5 m
- ✓ **Skum:**
2 appliceringer med 15 dages mellemrum – totalt 3 flasker Racumin Foam
- ✓ **Pasta:**
100 gr. per ædegift station og 2-4 påfyldninger per station = 6-8 kg

*Anbefalingerne er afhængige af de forhold der er på det pågældende sted. For at undgå at dyr som ikke skal bekæmpes kommer i kontakt med skummet skal appliceringsmængde og metode tilpasses.