

A circular inset showing a microscopic view of two beetles and a larva. One beetle is light brown and the other is dark brown. A small, dark, elongated larva is also visible.

på bakken, i vassdrag, i rør (håndvasse) eller i et avfallsmottak.
 fjernes med svamp eller våt klut med 5
 fjernes med spatel og skal kastes i

skal gjøres av godkjente skadedyrbekjempere i forbindelse med håndtering av produktet.

spiser og etter bruk.

BRUK

HAVER OM EFFEKTEN UTEBLIR

ERENDE OVERFLATER

SOLLYS ELLER VARMEKILDER

dråper på enkelte følsomme materialer.

	2 dråper x 0,1 g
	2 dråper x 0,1 g

åtte påføres på nytt dersom kakerlakker dukker opp.

(meter) eller 65 små dråper (ca. 2 mm i diameter) for å oppnå optimal effekt. Hvis skjeggene der sølvkre bor og gjemmer seg. Den er egnet gelapplikator.

Norsk

Bruksområde: Innendørs

Et insekticid i gelform som er bruksklart.

Før bruk i:

- Boliger/husholdninger
- Lokaler for håndtering og lagring av
- Offentlige bygninger

Dansk

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som insektmiddel til erhvervsmæssig bekæmpelse af tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (*B. Germanica*, *B. Orientalis*, *P. Americana*) og skægget sølvkræ (*Ctenolepisma longicaudatum*). Må kun anvendes indendørs.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.

Må ikke anvendes på arealer der rengøres med vand.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Dosering:

Maxforce® Platin påføres som dråber eller tynde strenger.

En dråbe = 0,1 g (ca. 7 mm i diameter);

0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).

Effekten kan forventes inden for 24 timer efter behandlingsstart. Maksimal effekt opnås efter 6 dage og op til 2 måneder efter bekæmpelsen er påbegyndt, afhængigt af angrebets størrelse, og så længe gelen forbliver aktiv.

Ved store angreb inspiceres påføringspunkterne regelmæssigt (en gang om måneden) og mere gel appliceres om nødvendigt.

Påfør ikke mere end en gang om måneden.

Mod kakerlakker:

Påføres i de områder hvor kakerlakkerne opholder sig. Placeres i hjørner, revner, sprækker og hulrum. Mængde tilpasses kakerlakarten og angrebets omfang.

Kakerlakart	Dosis afhængig af angrebets omfang pr. m²	
	Lav	Høj
Små arter som tysk kakerlak	1 dråbe x 0,1 g	2 dråber x 0,1 g
Store arter som orientalsk og amerikansk kakerlak	2 dråber x 0,1 g	3 dråber x 0,1 g

Alternativt lægges samme mængde ud som en tynd streng.

For at være effektiv skal gelen virke:

- i mindst 14 dage for små kakerlakker
- i mindst 4 uger for orientalsk kakerlak
- i mindst 12 uger for amerikansk kakerlak for at opnå optimal effekt. Hvis kakerlakker stadig er synlige efter en måned, kan frisk gel påføres.

Mod skægget sølvkræ:

Dosis: 0,1 g - 0,2 g pr. m²

Påfør flere små dråber i områder, hvor sølvkræ lever og gemmer sig, f.eks. under karme, lister, paneler osv.:

- 20 små dråber (ca. 3 mm) eller
- 65 små dråber (ca. 2 mm).

Gelen skal forblive aktiv i mindst 8 uger for at opnå optimal effekt. Hvis sølvkræ stadig er synlige, kan frisk gel påføres.

Brugsanvisning

Maxforce® Platin påføres med en speciel "udlægningspistol".

Efter behandlingen kasseres den tomme patron på en sikker måde. Er patronen delvist tømt kan den tages ud af pistolen og forsegles med den medfølgende hætte.

Patronen må ikke åbnes eller genfyldes.

Fjern alle fødekilder (affald, madrester osv.) før behandlingen påbegyndes for at tilskynde, at kakerlakkerne indtager gelen.

Må ikke anvendes på arealer og overflader, der rengøres ved brug af vand.

Undgå anvendelse på overdrevent støvede, fugtige eller fedtede overflader.

Værnemidler

Brug CE-mærkede nitrilgummihandsker (min. 0,4 mm) og beskyttelsesbriller.

Resistens

Anvend ikke produktet i områder, hvor der er mistanke om eller er konstateret resistens overfor clothianidin.

For at undgå resistens anbefales:

- at anvende integreret bekæmpelse såsom kombinationer af kemiske og fysiske metoder og god hygiejne under hensyntagen til lokale forhold (klimatiske forhold, målorganismer, brugsbetingelser osv.).
- at altid følge brugsanvisningen og angivet dosering.
- at anvende produkter med forskellige virkemekanismer.
- at undgå kontinuerlig anvendelse af samme produkt.
- at anvende Maxforce® Platin i et integreret bekæmpningsprogram.
- at regelmæssigt kontrollere om produktet er effektivt for at opdage resistens, eller om der sker nye angreb.

I tilfælde af resistens, bør der gøres alt for at udrydde populationen.

Førstehjælp

Hudkontakt: Vask forurenede hud med vand og sæbe, skyl derefter med vand. Kontakt læge hvis der opstår vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser.

Kontakt læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Kontakt giftlinien. Kontakt læge hvis der opstår symptomer eller store mængder er indtaget.

Giv ikke drikke til personer der ikke er ved bevidsthed.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Gelen skal forblive aktiv i mindst 8 uger for at opnå optimal effekt. Hvis sølvkræ stadig er synlige, kan frisk gel påføres.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Beskyttes mod frost.

Svenska

Målorganismer: Mot kackerlackor: tysk, orientalsk och amerikansk kackerlacka (*B. Germanica*, *B. Orientalis*, *P. Americana*).

Mot silverfiskar: Långsprötad Silverfisk (*Ctenolepisma longicaudatum*).

Endast för inomhusbruk.

En insekticid i gelform som är bruksfärdig för bekämpning av kackerlackor och silverfisk både i nymfstadie och vuxna. För användning i:

- Bostäder/hushåll
- Lokaler för livsmedelshantering och lagring
- Offentliga byggnader
- Byggnader för djurhållning, ex. zoo, djuraffärer, kennlar, veterinärinmottagningar, laboratorier etc. (endast byggnad, foderhantering och förvaringsutrymmen. Inte i stall, boxar, burar etc. där djuren befinner sig).

Appliceringsdos:

Applicera Maxforce® Platin i droppar eller tunna strängar på ytor i identifierade målområden. Kan placeras i hörn, sprickor, springor och hålrum.

Appliceringsdosen anpassas efter angreppets omfattning.

En droppe = 0,1 g (ca 7 mm i diameter); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm).

En tunn sträng motsvarande en droppe kan alternativt appliceras.

En effekt av bekämpningen kan förväntas väldigt snabbt och döda insekter kan ses inom 24 timmar efter påbörjad behandling.

Maximal effekt uppnås mellan 6 dagar och 2 månader efter påbörjad bekämpning beroende på storleken på angreppet så länge det finns gel kvar.

Vid stora angrepp inspektera appliceringspunkterna regelbundet (en gång i månaden) och applicera mer gel vid behov.

Applicera inte mer än en gång per månad.

Mot kackerlackor:

Kackerlackarter	Appliceringsdos för given angreppsgrad per m²	
	Låg	Hög
Liten t.ex. tysk kackerlacka	1 droppe x 0,1 g	2 droppar x 0,1 g
Stor t.ex. orientalsk och amerikansk kackerlacka	2 droppar x 0,1 g	3 droppar x 0,1 g

Gelen ska lämnas kvar:

- i minst 14 dagar för små kackerlackor
- i minst 4 veckor för orientalsk kackerlacka
- i minst 12 veckor för amerikansk kackerlacka för att uppnå optimal effekt. Om kackerlackor fortfarande är synliga efter en månad så kan färsk gel appliceras.

Mot silverfisk:

Dos: 0,1g - 0,2g per m²

Applicera flera små droppar i områden där sivberfiskarna bor och gömmer sig, ex. under trösklar, lister, paneler etc.:

- 20 små droppar (ca 3 mm) eller
- 65 små droppar (ca 2 mm)

Gelen ska lämnas kvar i minst 8 veckor för att uppnå optimal effekt. Om silverfiskar fortfarande är synliga därefter så kan färsk gel appliceras.

Bruksanvisning

Maxforce® Platin doseras med lämplig gelapplikator.

Efter behandlingen ska den tomma patronen avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. Om patronen endast har använts delvis ska den tas bort från applikatorn, förseglas med det medföljande locket och därefter förvaras enligt anvisningarna.

Öppna inte eller försök att återfylla gelapplikator.

Före behandling ska området undersökas med lämplig metod för att identifiera var angrepp förekommer tex genom att använda fällor och/eller aerosoler för att jaga ut skadedjuren, leta efter spillning, ömsad hud, äggskal etc.

Alla andra födokällor för kackerlackor (avfall, madrester osv.) avlägsnas från det angripna området för att uppmuntra intag av gelen.

Produkten är speciellt användbar på områden där konventionella insekticider inte kan användas, såsom i närheten av elektriska eller elektroniska apparater.

På platser där man identifierat spridning av kackerlackor är det lämpligt att utöka appliceringen av produkten även till omkringliggande områden för att förbättra bekämpningen och undvika ytterligare spridning.

Undvik applicering på väldigt dammiga, fuktiga och smutsiga ytor.

Applicera inte produkten på ytor som våttorkas.

Applicera inte direkt på ytor där livsmedel eller djurfoder förvaras, hanteras eller förtärs.

Applicera enbart på platser som är oåtkomliga för barn och djur.

Applicera inte produkten i områden som nyligen behandlats med annan insekticid och undvik att kontaminera gelen med andra insekticider.

Undvik kontinuerlig användning av produkten.

Produkten ska inte användas i stallar, djurinhägnader eller burar.

Rekommenderas inte i byggnader där det finns insektsätande fåglar och reptiler.

Avlägsnande av gammal produkt/gel ska göras av professionell skadedjursbekämpare.

Undvik kontakt med huden.

Tvätta händer och exponerad hud innan du äter och efter användning.

LÄS ANVISNINGARNA NOGA INNAN ANVÄNDNING

INFORMERA REGISTRERINGSINNEHAVAREN OM EFFEKTEN UTEBLIR

APPLICERA INTE PÅ ABSORBERANDE YTOR

EXPONERA INTE BETET FÖR SOLLJUS ELLER VÄRME (T.EX. ELEMENT)

SKYDDA FRÅN VATTEN

Information: En del känsliga material såsom textilier kan fläckas av produkten. Prova först på en liten undanskymd yta om osäkerhet finns.

Skyddsutrustning

Använd CE-märkta (eller motsvarande) nitrilgummihandskar (minsta tjocklek 0,40 mm) och ögonskydd

Första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta kontaminerad hud med tvål och vatten, skölj därefter med vatten. Om irritation utvecklas och kvarstår, sök läkarhjälp.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikliga mängder ljummet vatten, även under ögonlocken, under minst 5 minuter. Glöm inte att ta ur eventuella kontaktlinser. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppträder och/eller om stora mängder har förtärs. Om personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framtupa sidoläge och sök omedelbart läkarhjälp.