



Racumin®
FOAM

GNAVERMIDDEL (PT14)

- ✓ **Bekæmper brun rotte**
- ✓ **Skummet holder sig stabilt i op til 12 dage**
- ✓ **Enkelt at dosere**

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang.

Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.

Mod rotter



500 ml e



FARE

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan skade det ufødte barn (H360D).
Kan forårsage organskader (blod) ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Yderst brandfarlig aerosol (H222).
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229).
Indhent særlige anvisninger før brug.
Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Indånd ikke skumaerosol.
Vask huden grundigt efter brug.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.
Bær øjenbeskyttelse.
Bær beskyttelseshandsker.
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (*Rattus norvegicus*) indendørs i aflåste bygninger, som ikke benyttes til beboelse og hvor børn, kæledyr og vilde dyr ikke har adgang.

Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med en R1 autorisation.

Bygningen, hvor bekæmpelsen foregår, skal afmærkes med en tekst, hvoraf det fremgår, at der bekæmpes rotter samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.

Behandlede områder i bygninger skal sikres for at forhindre adgang for børn, kæledyr og vilde dyr.

Må kun anvendes i særlige tilfælde hvor ikke-kemiske bekæmpelsesmidler og konventionel adgift ikke er effektivt.

Må kun anvendes indtil 2 meter fra steder hvor fødevarer, fødestoffer eller drikkevand anvendes, opbevares eller produceres for at forhindre kontaminering.

Må kun anvendes på lokaliteter, hvor der ikke er forekomst af resistens, og hvor der er problemer med rotter, der ikke er villige til at tage adgifte på grund af rigelige fødemængder.

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af rotter.

Må ikke anvendes udendørs.

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 20-30 g pr. hul/passage af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Døde rotter skal efterses og gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfulge og rovdyr.

Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen.

Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse.

Må ikke tømmes i kloakaffald.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og fødestoffer.

3 650

08/18 - ARTICLE 80926081

Bayer

Produktionsdato og Batchnummer angives på emballagen.
Produktet er holdbart indtil 2 år efter produktionsdatoen.

Gnavermiddel BPR-reg. nr. 18-607. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Præparattype: skum.
Indholder aktivstoffet coumatetralyl 0,4062 % w/w (4,062 g/kg).

Indeholder Isotridecanol, ethoxylated

Pakningsstørrelse 0,475 kg

Godkendelsesindehaver:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk

