



Harmonix®

Rodent Paste

Kotihiret ja/tai rotat – sisäkäyttöön – ulkotiloihin rakennusten ympärille, avoimille alueille ja kaatopaikoille. / Mot möss och råttor - inomhus - utomhus omkring byggnader, på öppna områden och soptippar.
Vain koulutetuille ammattilaisille / Endast för yrkesfolk med utbildning.
Käyttöohjeet: Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä.

Bekämpning av brunråttor och möss.
Endast för yrkesmässiga användare i överkanssäkra betesstationer (behörighetsklass 2).
Endast för yrkesmässiga användare med utbildning (behörighetsklass 1 So).
Bruksanvisning: läs medföljande anvisningar före användning.

Bekjemper husmus og brunrotte – kun tillatt innendørs og utendørs rundt bygninger.
Kun til bruk for godkjent skadedyrbekjemper og andre personer med særskilt autorisasjon
Åte klar-til-bruk, til bruk i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn. Åtestasjoner må brukes.
Bruksanvisning: Les pakningsvedlegg før bruk

Valmistetyyppi: tahna - RB - Syötti (käyttövalmis)/ pasta - RB - Bruksfärdigt bete
Annospusseissa oleva syötti: Älä avaa syöttiä sisältäviä pusseja
Bete i påsar: Öppna inte de påsar som innehåller betet
Åte i poser: Ikke åpne posene som inneholder åtet

Tehoaine / Verksam beståndsdel / Aktivt stoff: Kolekalsiferoli / Kolekalsiferol/Cholecalciferol 0,077 paino-% / vikt-% 0,77 g/kg (CAS-No. 67-97-0)

5 kg e



Käytetään vain SUOMESSA / Endast för användning i FINLAND

Käyttö sisätiloissa / Användningen inomhus:

- Käyttö vain kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa.
- Älä käytä valmistettua jatkuvasti jyrssiöiden ennaltaehkäisyyn tai jyrssiöiden esiintymisen seurantaan.
- Endast för användning i överkanssäkra betesstationer.
- Använd inte produkten som permanenta beten för att förebygga gnagarangrepp eller för att övervaka gnagaraktivitet.

Käyttö rakennusten ympärillä, avoimilla alueilla ja kaatopaikoilla / Användningen omkring byggnader, på öppna områden och soptippar:

- Käyttövalmis syötti, tarkoitettu käytettäväksi kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa tai muissa peitetyissä ja suojatuissa syöttipisteissä, mikäli ne antavat muulle kuin kohde-eläimille ja ihmisille saman suojatason kuin kestävästä materiaalista valmistetut syöttilaatit.
- Käyttövalmiin syöttin asettaminen suoraan jyrssiöiden kaivamiin koloihin.
- Jatkuva syöttitys (paitsi avoimilla alueilla ja kaatopaikoilla)
- Käyttö avonaisilla ulkoalueilla ja kaatopaikoilla.
- Bruksfärdigt bete för användning i överkanssäkra betesstationer eller i andra täckta och skyddade betespunkter som kan användas på ett sådant sätt att de ger samma skyddsnivå för ickekänsorganismer och människor som överkanssäkra betesstationer.
- Direkt applicering av färdigt bete i håligheter som gjorts av gnagarna.
- Permanent bete (utom i öppna områden och soptippar)
- Öppna utomhusområden och soptippar.

Muuta huomioitavaa käytettäessä suoraan jyrssiöiden kaivamiin koloihin:

- Syötti on asetettava siten, että muiden kuin kohde-eläinten ja lasten altistuminen voidaan vähintään 10 minuutin ajan.
- Peitä tai tuki niiden kolojen suut, joihin on laitettu syötti. Näin pienennetään riskiä, että jyrssiä työntää syöttin ulos kolosta ja levittää sitä ympäristöön.
- Ytterligare företeelser som ska beaktas för direkt användning i jordhålor:
• Placera beten så att det inte exponeras för arter som inte är föremål för betet eller för barn.
• Täck eller blockera ingångarna till hålor och bon med bete för att minska risken för att betet avvisas eller förspillas.

Ensiapu

Ihokosketus: pese iho ensin vedellä ja sitten vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin: huuhtelee silmät silmänhuuhtelunesteellä tai vedellä pitäen luumia auki vähintään 10 minuutin ajan.

Nieleminen: huuhtelee suu huolellisesti vedellä.

Älä anna tajuuttomalle henkilölle koskaan mitään suun kautta. Ei saa oksennuttaa. Jos valmistetta on niety, hakeudu välittömästi lääkärin ja näytä lääkärielle valmisteen pakkaus tai etiketti. Jos lemmikkieläin nielee valmistetta, ota yhteyttä eläinlääkärin.

Luvan haltija:

Tillståndets innehavare: Bayer A/S
Bayer AB c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13 - 2300 København
Danmark/Tanska
Tlf./Tel.: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se
www.environmentalscience.bayer.fi
www.environmentalscience.bayer.no

SUOMI / FINLAND:
Lupnumero / Tillståndsnr: FI-2020-0019

SVERIGE:
Reg nr. 5632

NORGE:
Godkjeningsnummer: NO-2020-0198

UF: TD41-Q04K-T00W-CJ4Y

FNS87363902D

Bayer



7 313067 667875

Valmistuserä ja –päivä: katso pakkausksesta.
Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä.
Sats-nr. och produktionsdatum: se förpackning.
Produkten är hållbar 3 år från produktionsdatum.

Soita vaaratilanteessa myrkytystietokeskukseen: tfn 09 471 977

Käyttöohjeet

- Lue valmistetiedot ja kaikki muut valmisteen mukana tulevat tai myyntipaikassa annetut ohjeet ennen valmisteen käyttämistä ja noudata niitä.
- Valmistetta tulee käyttää vain osana integroitua torjuntaa, joka sisältää muun muassa hygieniatomia ja fyysisiä torjuntamenetelmiä, jos mahdollista.
- Mikäli mahdollista, syöttilaatitot on kiinnitettävä maahan tai muihin rakenteisiin.
- Aseta valmiste lasten, lintujen, lemmikkieläinten, tuotantoeläinten ja muiden kuin kohteena olevien eläinten ulottumatomiin.
- Aseta valmiste etäälle elintarvikkeista, juomista ja eläinten ruhuista, sekä esineistä tai pinnoista, jotka ovat edellä mainittujen kanssa kosketuksissa.
- Syöttiasemat on merkittävä selvästi sen osoittamiseksi, että ne sisältävät jyrssiämyrkyä ja ettei niitä saa siirtää tai avata:

Ei saa koskea tai avata

- Sisältää jyrssiämyrkyä – Harmonix Rodent Paste

- Tehoaine Kolekalsiferoli

- Soita vaaratilanteessa myrkytystietokeskukseen 09 471 977

Vaarallista luonnonvaraisille eläimille

- Älä syö, juo tai tupakoi valmistetta käsitellessäsi. Pese kädet ja valmisteelle suoraan altistunut iho käytön jälkeen.
- Jos syöttin kulutus on vähäistä esiintymän arvioitua kokoon nähden, kannattaa harkita syöttiasemien paikan vaihtamista ja syöttin vaihtamista koostumukseltaan toisenlaiseen valmisteeseen.
- Jos syöttien kulutus jatkuu 35 päivän torjuntajakson jälkeen eikä jyrssiöiden aktiivisuus näytä vähenevän, todennäköisesti syyt tähän on määritettävä. Jos muut syyt on suljettu pois, jyrssiät ovat todennäköisesti resistenttejä. Tällöin kannattaa harkita (antikoagulantti) jyrssiämyrkyä käyttämistä. Myös loukkuja voi käyttää vaihtoehtoisena torjuntatona.

ANNOSTUS:

Tutki torjuttava alue ennen syöttien asettamista ja selvitä, mistä jyrssiälajeista on kysymys ja missä ne liikkuvat. Selvitä, mistä jyrssiöiden esiintymien johtuua ja määrätä esiintymän laajuus.

Poista ravinto, joka on helposti jyrssiöiden saatavilla (esimerkiksi maahan valuneet jyvät tai ruoantähteet). Tämän lisäksi älä siivoa käsiteltävää aluetta ennen torjuntaa, koska se häiritsee jyrssiöpopulaatiota ja vaikeuttaa syöttien hyväksymistä.

Rottien torjunta: 100–200 g syöttiä yhtä syöttipistettä kohti riippuen esiintymän suuruudesta.

Paljon rottia: Sijoita syöttiä 3 - 10 metrin välein

Vähän rottia: Sijoita syöttiä 10 - 20 metrin välein

Valmistetta on lisättävä 200 g, jos syötti on syöty kokonaan tarkastusten välissä.

Hiirien torjunta: 20 g Harmonix Rodent Paste per syöttipiste

Paljon rottia: Sijoita syöttiä 2 - 5 metrin välein

Vähän rottia: Sijoita syöttiä 5 - 20 metrin välein

Valmistetta on lisättävä 20 g, jos syötti on kulutettu kokonaan tarkastusten välissä.

- Syötti on kiinnitettävä siten, ettei sitä saa vedettyä pois syöttilaatikosta.
- Valmistetta tulee asettaa sellaisten paikkojen välittömään läheisyyteen, joissa on havaittu merkkejä jyrssiästä (esimerkiksi kulkureitit, pesimäpaikat, paikat, joissa jyrssiät ovat syöneet, reitit, kolot jne.).
- Ei saa käyttää alueilla, joilla epäillään esiintyvän resistenssiä tehoaineelle.
- Tarkista syöttilaatitot vähintään 1–2 päivän välein torjunnan aloittamisen jälkeen ja vähintään kerran viikossa sen jälkeen, jotta nähtäisiin, syövätkö tuholaiset syöttiä ja ovatko syöttilaatitot ehjiä ja jotta kuolleet jyrssiät voitaisiin poistaa. Lisää syöttiä tarvittaessa.
- Tämän valmisteen pitäisi hävittää jyrssiät 35 päivän kuluessa.
- Poista jäljellä olevat syöttiä ja syöttilaatitot torjuntajakson päätyttyä.
- Älä pese syöttilaatitot tai suojatuissa syöttipisteissä käytettyjä tarvikkeita vedellä tarkastuskertojen välillä
- Aseta syöttilaatitot alueille, jotka eivät ole tulva-altiita.
- Jos syöttilaatitot syötti on kastunut tai likaantunut, vaihda syötti.
- Valmistetta ei saa käyttää kauempaa kuin 35 päivää ilman esiintymän tilan ja torjunnan tehon arvioimista.
- Älä käytä valmistetta pulssisyöttötykkeen.

Jatkuva syöttitys:

- Jatkuva syöttitys on sallittu vain tilanteissa, joissa uuden jyrssiävaasoin todennäköisyys on suuri ja kun muut torjuntamenetelmät ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
- Jatkuvan syöttityksen strategia on tarkistettava säännöllisesti.

SÄILYSSUOSITUKSET

Säilytä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä pakkaus suljettuna ja suojattuna suoralla auringonvalolta. Säilytä paikassa, johon lasten, lintujen, lemmikkieläinten ja tuotantoeläinten pääsy on estetty. Säilyvyysaika: 36 kuukautta.

JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Torjunnan päätyttyä hävitä syömättä jäänyt syötti vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Hvåvita kullølett jyrjsjatt sekajatteena. Jyrjsjatt voivat olla taudinkantaja. Älä koske kulleisiin jyrjsjöihin paljain käsin, vaan käytä suojakäsineitä tai työkaluja, kuten pihleitä, niiden hävittämisessä.



Endast för användning i SVERIGE
Reg nr. 5632

Bekämpning av brunrättor och möss Endast för yrkesmässiga användare (behörighetsklass 2). Endast för användning i överkännsäkra besetstationer

För användning inomhus och utomhus omkring byggnader samt för att skydda infrastruktur så som konstruktioner och system för energiförsörjning och kommunikation. Ej för användning i parker, på öppna områden, utomhusbelägna avfallsanläggningar och deponier

Betet får endast placeras i överkännsäkra besetstationer.

Använd inte produkten som permanenta beten för att förebygga gnagarangrepp eller övervaka gnagaraktivitet.

Med hjälp av denna produkt ska gnagare avlägsnas inom 35 dagar. Produktinformationen (dvs. etikett och/eller folder) ska tydligt rekommendera användarna att vända sig till produktleverantören eller kontakta ett företag för skadedjursbekämpning vid misstänkt utebliven effekt vid behandlingstidens slut (dvs. om gnagaraktivitet fortfarande observeras).

Besetstationerna ska kontrolleras minst en gång om dagen eller varannan dag under behandlingens början och därefter minst varje vecka, för att kontrollera om betet har accepterats, besetstationerna är intakta samt för att avlägsna döda gnagare. Fyll på betet vid behov. Insatsen måste avbrytas om betet inte längre förtärs. Sök efter och avlägsna döda gnagare regelbundet under behandlingen, minst så ofta som besetstationerna inspekteras.

Endast för yrkesmässiga användare med utbildning (behörighetsklass 1 So). För användning inomhus och utomhus omkring byggnader, vid återvinningsplatser (sorteringsstationer) samt för att skydda infrastruktur så som konstruktioner och system för energiförsörjning och kommunikation.

Produkten får användas mot råttor vid anläggningar där råvara eller avfall lagras i återvinnings- eller förädlingsyfte. Produkten får även användas mot råttor i kvartersparker och andra liknande områden där allmänheten uppehåller sig samt vid högfrekventerade gångvägar i stadsmiljö.

Ej för annan användning i parker, på öppna områden, utomhusbelägna avfallsanläggningar och deponier.

Endast för användning i överkännsäkra besetstationer, förutom om täckta och skyddade betespunkter kan användas på ett sådant sätt att de ger samma skyddsnivå för icke-målorganismer och människor som överkännsäkra besetstationer.

Inte för applicering direkt i jordhålor.

Permanent beten

Första Hjälp

Hudkontakt: tvätta huden med vatten och sedan med vatten och tvål.

Ögonkontakt: skölj ögonen med ögonsköljvätska eller vatten, håll ögonlocken öppna i minst 10 minuter.

Förtäring: skölj munnen noggrant med vatten.

Administrera aldrig något via munnen till en medvetlös person. Framkalla inte kräkningar. Vid förtäring, uppsök genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Kontakta en veterinär om ett husdjur har förtärt en del eller hela produkten.

Vid olycksfall, kontakta giftinformationscentralen

Finland: 09 471 977

Sverige: 020 99 00 eller 112

Norge: +47 22 59 13 00

Bruksanvisning

Läs och följ produktinformationen liksom all information som följer med produkten eller som tillhandahålls vid försäljningstillfället innan produkten används.

Produkten får bara användas som del av ett integrerat bekämpningssystem (IPM-system), inbegripet bland annat hygienåtgärder och, där så är möjligt, fysiska metoder.

Där så är möjligt måste besetstationerna fästas i marken eller i andra objekt.

Placera produkten ömtåligt för barn, fåglar, sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur och andra icke-måldjur.

Placera produkten åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder, samt från föremål eller ytor som kommer i kontakt med dessa.

Besetstationer måste vara tydligt uppmärkta för att visa att de innehåller rodenticider och att de inte får flyttas eller öppnas:

Får inte flyttas eller öppnas

- innehåller en rodenticid - Harmonix Rodent Paste - Kolekalsiferol

- vid olycksfall, kontakta giftinformationscentralen

Finland: tfn 09 471 977 - Sverige: 020 99 00 eller 112

Farlig för djurlivet

• Undvik att äta, dricka och röka när du använder produkten.

• Tvätta händerna och direktexponerad hud efter användning av produkten.

• Vid liten åtgång av bete jämför med angreppets synbara storlek, överväg att flytta besetstationerna till andra platser och att eventuellt byta till en annan betesformulering.

• Om beten fortsätter att förtäras efter 35 dagars behandling och ingen nedgång ses i gnagaraktiviteten måste den troliga orsaken bestämmas. Om andra orsaker har uteslutits är det troligt att det finns resistenta gnagare. Överväg i så fall att använda en antikoagulerande rodenticid, eller att använda fällor som en alternativ åtgärd.

DOSERING:

Genomför en förbesundersökning av det angripna området och en bedömning på plats för att identifiera gnagararten, dess aktivitetsplatser och avgör den troliga orsaken till angreppet och dess omfattning.

Avlägsna livsmedel som är lätta att nå för gnagare (t.ex. utspillt sädeskorn eller livsmedelsavfall). Bortsett från detta, undvik att städa det angripna området direkt inför behandlingen, då detta bara stör gnagarpopulationen och gör det svårare att få dem att acceptera betet.

Råttor: 100- 200 g Harmonix Rodent Paste per betespunkt beroende av angreppets storlek.

Stort angrepp: Placera ett bete med 3 till 10 meters mellanrum
Liten angrepp: Placera ett bete med 10 till 20 meters mellanrum
Om betet konsumerats helt inom ett kontrollintervall ska 200 g bete tillsättas.

Möss: 20 g Harmonix Rodent Paste per betespunkt

Stort angrepp: Placera ett bete med 2 till 5 meters mellanrum
Litet angrepp: Placera ett bete med 5 till 20 meters mellanrum
Om betet konsumerats helt inom ett kontrollintervall ska 20 g bete tillsättas.

• Betet ska säkras så att det inte kan dras bort från besetstationen.

• Produkten ska placeras i omedelbar närhet av platser där gnagaraktivitet tidigare har noterats (t.ex. gångstigar, boplatser, uppfödningplatser, hål, jordhålor osv.).

• Använd inte produkten i områden där resistens mot det verkamma ämnet kan misstänkas.

• Besetstationerna ska kontrolleras var 1 till 2 dag under behandlingens början och därefter minst varje vecka, för att kontrollera om betet har accepterats, besetstationerna är intakta samt för att avlägsna döda gnagare. Fyll på betet vid behov.

• Att använda denna produkt bör eliminera gnagare inom 35 dagar.

• Avlägsna det återstående betet eller besetstationerna vid behandlingstidens slut.

• Rengör inte besetstationer eller verktyg som används i täckta eller skyddade betespunkter med vatten mellan applikationerna

• Placera betespunkterna på platser som inte riskerar att översvämmas.

• Ersätt allt bete i en betespunkt där betet har skadats av vatten eller förorenats av smuts.

• Produkterna får inte användas längre än 35 dagar utan att angreppets omfattning och behandlingens effekt utvärderas.

• Använd inte produkten för pulsbehandlingar.

Ytterligare företeelser som ska beaktas för permanent bete

• Permanent betningsbehandling är endast tillåten på platser där det är stor risk för en ny gnagarinvasion och när andra metoder har visat sig otillräckliga.

• Den permanenta betningsstrategin ska regelbundet ses över.

REKOMMENDATIONER FÖR LAGRING

Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara förpackningen stängd och skyddad från direkt solljus.

Förvaras ömtåligt för barn, fåglar, sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur. Hållbarhet: 36 månader.

AVFALLSHANTERING

Vid avslutad behandling ska överblivet bete och förpackningen kastas i enlighet med lokala regler.

Gör dig med vett om döda gnagare som blandavfall. Gnagare kan vara sjukdomsbärande. Vidror inte döda gnagare med bara händer, utan använd handskar eller verktyg såsom tänger när du bortskaffar dem.



Kun for bruk i NORGE

Godkjenningsnummer: NO-2020-0198

Bekjemp humus og brunrotte - kun tillatt innendørs og utendørs rundt bygninger.
Kun til bruk for godkjent skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon.

Åte klar-til-bruk, til bruk i solide åtestasjoner som ikke er mulig å åpne for barn. Åtestasjoner må brukes.

Førstehjelp:

Hudkontakt: Vask huden med vann og deretter med vann og såpe.

Øyekontakt: Skyll øynene med øyeskyllevæske eller vann med åpne øyne i minst ti minutter.

Svelging: Skyll munnen grundig med vann.

Gi aldri noe i munnen til bevisstløs person. Ikke fremkall brekninger. Ved svelging, må du kontakte lege eller GIFTINFORMASJONEN (+47 22 59 13 00) eller lege umiddelbart og vise produktets beholder eller etikett. Cholecalciferol forårsaker hyperkalsemi ved giftige doser. Utfør symptomatisk behandling. Behandle med lavt inntak av kalsium, saltholdig mat, mye drikke og unngå sollys. Overvåking av serum-kalsiumnivået kan gi bedre behandling. Kortison har vist seg å være effektivt i enkelte tilfeller.

Kontakt veterinær hvis et kjæledyr har svelget produktet.

Bruksanvisning

Les og følg produktinformasjonen samt eventuell informasjon som følger med produktet eller utleveres ved salgsstedet, før du bruker det.

• Produktet skal kun brukes som en del av en integrert bekjempelsesstrategi (IPM-system), der også hygienetiltak og fysiske bekjempelsesmetoder (om mulig) inngår.

• Vurder forebyggende tiltak (tetting av hull, fjerning av potensielle kilder til mat og drikke) for å øke gnagernes inntak av åte og for å redusere sannsynligheten for nye angrep.

• Der det er mulig, må åtestasjonene festes til underlaget eller andre konstruksjoner.

• Plasser produktet utenfor rekkevidden til barn, fugler, kjæledyr, husdyr og andre dyr det ikke er ment for.

• Hold produktet vekk fra mat, drikke og dyrefôr samt redskaper og overflater som kommer i kontakt med disse.

• Dersom produktet brukes på offentlige steder bør de behandlede områdene merkes i behandlingsperioden. Sammen med åtestasjonen skal det settes oppslag om risikoen ved primær- eller sekundærforgiftning med et rodenticid, samt en angivelse av førstehjelpstiltak ved forgiftning.

• Informer om mulig naboer og andre som berøres av gnagerbekjempelsen før bekjempelsen starter i overensstemmelse med god etablert praksis.

• Åtestasjoner må være merket på en måte som tydelig forteller at de inneholder rodenticider, og at de ikke må flyttes eller åpnes.

Må ikke fjernes eller åpnes

- Inneholder muse- eller rottegift - Harmonix Rodent Paste - Kolekalsiferol

- ved mistanke om forgiftning kontakt

Giftinformasjonen (22 59 13 00)

Farlig for dyrelivet.

• Du må ikke spise, drikke eller røyke når du bruker produktet.

• Vask hender og utlekket hud etter bruk av produktet.

• Dersom det spises lite av åtet sammenlignet med angreppets antatte omfang, bør det vurderes å flytte åtestasjonen og eventuelt bytte til en annen åteformulering.

• Dersom det fortsatt spises av åtet etter en behandlingstid på 35 dager og gnagaraktiviteten ikke går ned, skal årsaken til dette bestemmes. Dersom andre årsaker er ekskludert, bør du vurdere bruken av et rodenticid med en annen virkemåte. Vurder også bruk av feller som alternativt bekjempelsesstrategi.

PÅFØRINGSDOSE:

Før åten legges ut, må det infiserte området undersøkes for å lokalisere bolet, fastslå gnagerart, omfanget av angrepet og eventuelle årsaker.

Fjern kilder til mat og drikke som gnagere lett kan få tak i (f.eks. matavfall eller nøtter/frø/korn). Utover dette skal det infiserte området ikke rengjøres, for å unngå å forstyrre gnagere slik at de ikke spiser åtet.

Åtestasjoner må brukes: Åtestasjonene må være mekanisk stabile og barsmekke. Åtestasjonene skal være designet slik at de hindrer tilgang for arter som ikke er målorganismen så langt det lar seg gjøre.

Rotter: 100-200 g Harmonix Rodent Paste per åtepunkt, avhengig av angrepsgrad.

Høy angrepsgrad: 3 - 10 meter mellom stasjonene.

Lav angrepsgrad: 10 - 20 meter mellom stasjonene.

En produktmengde på 200 g må tilføres når åten er blitt fullstendig konsumert innenfor ett kontrollintervall.

Mus: 20 g Harmonix Rodent Paste per åtepunkt, avhengig av angrepsgrad.

Høy angrepsgrad: 2 - 5 meter mellom stasjonene.

Lav angrepsgrad: 5 - 20 meter mellom stasjonene.

En produktmengde på 200 g må tilføres når åten er blitt fullstendig konsumert innenfor ett kontrollintervall.

Dødelighet av gnagere vil inntreffe 3-7 dager etter at de har spist dødelig mengde åte.

• Åtet skal sikres slik at den ikke kan dras vekk fra åtestasjonen.

• Produktet skal plasseres i umiddelbar nærhet av steder der gnagaraktivitet på forhånd er registrert (f.eks. stier, bol, foringsplasser osv.).

• Skal ikke brukes på steder der det er mistanke om resistens mot virkestoffet.

• Ved starten av behandlingen, sjekk åtestasjonene etter minst 1-2 dager, og på ukentlig basis etterpå. Det samme gjelder bekjempelse som varer i mer enn 25 dager.

• Erstatt konsumert åte ved hver inspeksjon.

• Samle opp og avhendt allt åte som farlig avfall når behandlingen avsluttes for å unngå primærforgiftning.

• Ikke vask åtestasjonene med vann mellom utleggingene.

• Samle opp døde gnagere med en gang, pak de forsvarlig inn og kast i restavfall.

• Gnagere kan være sykdomsbærende. Du må ikke bære døde gnagere med bare hender, bruk hansker eller et verktøy som for eksempel en tang ved avhending av dem.

• Påse at åtet ikke kommer i kontakt med vann dersom åtestasjonen plasseres nær overflatevann (bl.a. elver, dammer, vannkanaler, demninger, diker eller grøfter) eller vannløpsystemer.

• Beskytt åtet mot været.

• Plasser åtestasjonene på steder som ikke oversvømmes

• Bytt ut åte som har blitt vått eller forurenset av jord.

• Produktene skal ikke brukes lenger enn 35 dager uten en vurdering av tilstanden til angrepet og virkningen av behandlingen.

• Ikke bruk produktet til intervallutlegging.

Permanent åteutlegging:

• Permanent åteutlegging er strengt begrenset til steder med stor sannsynlighet for nye angrep, når andre bekjempelsesmetoder har vist seg å være utiltrekkelige.

• I sammenheng med integrert skadedyrbekjempelse skal strategien med permanent åteutlegging og vurdering av risiko for nye angrep vurderes fortløpende.

• Det anbefales å inspisere det behandlede området minst hver fjerde uke for å unngå at det utvikles resistens.

• Følg eventuelt ytterligere anvisninger som følger god etablert praksis.

OPPEBEVARING OG HOLDBARHET

Oppbevares tørt og kjølig på et sted med god ventilasjon. Hold beholderen lukket og unna direkte sollys.

Oppbevares utliggjelig for barn, fugler, kjæledyr og husdyr.

Hold unna mat, drikke og dyrefôr.

Holdbarhet: 36 måneder.

AVFALLSHÅNDTERING

Etter endt behandling: Rester av gift skal leveres som farlig avfall. Det gjelder også emballasje hvor det kan være igjen små rester av gift. Døde mus/rotter skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig inn og kastes i restavfallet. Den ytre emballasjen som ikke har vært i kontakt med musegift, kan leveres til resirkulering.

Unngå hudkontakt ved avhending av rester.

Luvan haltija:

Tiliständets innehavare: Bayer A/S

Bayer AB c/o Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13 - 2300 København

Danmark/Tanska

Tlf./Tel.: +45 45 23 50 00

www.environmentalscience.bayer.se

www.environmentalscience.bayer.fi

www.environmentalscience.bayer.no

SUOMI / FINLAND:

Lupanumero / Tillståndsnr: FI-2020-0019

SVERIGE :

Reg nr. 5632

NORGE:

Godkjenningsnummer: NO-2020-0198

UF: TD41-Q04K-T00W-CJ4Y

FNS87363902D



Bayer

Valmistuserä ja -päivä: katso pakkauksesta.
Sällyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä.
Sats-nr. och produktionsdatum: se förpackning.
Produkten är hållbar 3 år från produktionsdatum.