

Dosis Aplikasi

Petunjuk penggunaan:

RACUMIN 0.75 TP

Waktu aplikasi bila ditemukan liang-liang aktif tikus di pematang sawah atau kerusakan buah sawit dan tanda-tanda keberadaan tikus.

Campurkan 1 : 19 untuk perbandingan **Racumin 0.75 TP** dan bahan umpan (beras, jagung, kedelai dan lainnya). Tambahkan minyak goreng pada bahan umpan jika diperlukan dengan perbandingan 1ml minyak goreng per 100 g bahan umpan

Setiap 1 kg **Racumin 0.75 TP** campurkan untuk 19 kg bahan umpan atau setiap 20 g **Racumin 0.75 TP** campurkan untuk 380 g bahan umpan, kemudian aduk campuran umpan hingga rata dengan alat bantu hingga warna biru merata.

Isilah tempat umpan dengan 20-40 g umpan yang telah dicampur dengan **Racumin 0.75 TP**, letakkan umpan pada jarak masing-masing 5-10 meter di tempat yang biasa dilalui tikus.

Berilah penanda apabila sedang dilakukan proses pengumpanan tikus.

Lakukan pengecekan setelah 1-2 hari, Ganti atau tambahkan bila umpan rusak atau habis dimakan tikus dengan umpan baru.

Lindungi umpan dari air atau hujan. Pemasangan umpan harus terus menerus sampai umpan tidak dimakan lagi. Hal ini menandakan bahwa tikus-tikus telah mati (biasanya terjadi beberapa hari setelah pemasangan umpan).

Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini.