

# Dosis Aplikasi

Petunjuk penggunaan:

## **RACUMIN WAXBLOCK 0.0375 BB**

### **Perkebunan**

- Letakkan rodentisida ini di sekitar batang bawah dekat akar tanaman sebanyak satu blok per pohon atau sesuai rekomendasi setempat.
- Jika umpan dimakan tikus, gantilah dengan umpan baru hingga tidak ditemukan adanya tanda buah sawit atau bagian tanaman lainnya yang dimakan tikus.
- Pengumpanan sebaiknya mulai dilakukan jika ditemukan gejala serangan tikus sedini mungkin.

### **Pertanian**

- Letakkan rodentisida ini pada jalan tikus, dekat liang aktif atau daerah yang sering dilalui tikus.
- Jika dimakan tikus, gantilah dengan umpan baru di sekitar tempat yang sama dengan umpan sebelumnya.
- Pengumpanan dihentikan jika umpan pengganti tidak lagi dimakan tikus atau sesuai dengan rekomendasi setempat.

### **Bangunan**

- Masukkan rodentisida ini pada kotak umpan atau *rat box* dan letakkan pada jalan tikus, dekat liang aktif atau daerah yang sering dilalui tikus.
- Jika umpan dimakan tikus, kotak umpan yang kosong sebaiknya dibalik posisinya sebelum diisi dengan umpan baru.
- Lakukan pengumpanan hingga umpan baru di dalam kotak umpan tidak dimakan tikus atau tidak ditemukan lagi kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas tikus.

Bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini.