



Maxforce[®]
IC

INSETTICIDA

- ✓ **Esca insetticida in gel**
- ✓ **Per uso professionale**



es.bayer.it



4 x 30 g e

Per il controllo degli scarafaggi



MAXFORCE[®] IC

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 2,15 g
coformulanti quanto basta a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene 1,2-Benzisothiazolin-
3-one. Può provocare una reazione
allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:

Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00649/MRP

Confezione: cartuccia da 30 g

Officina di produzione: Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia)

Lotto n del: vedi altra parte della confezione

Validità: 2 anni



ATTENZIONE

® Marchio registrato Gruppo Bayer

IT87283062A



Bayer

MAXFORCE® IC

Esca Insetticida in gel per il controllo degli scarafaggi

Per uso professionale – Categoria di utilizzatori: Professionisti

Per aree interne

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure di primo soccorso

Raccomandazioni generali: Allontanarsi dalla zona di pericolo. Adagiare e trasportare l'infortunato in posizione stabile (disteso su un fianco). Togliere immediatamente gli indumenti e le calzature contaminati e smaltirli in sicurezza. Tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Non lasciare l'infortunato da solo.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare liquidi né indurre il vomito. Se l'infortunato si trova in stato di incoscienza, adagiarlo in posizione di sicurezza. Se compaiono dei sintomi o vengono ingerite grandi quantità consultare un medico o un centro antiveleni.

In caso di contatto con la pelle: lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Se compare, persiste o un'irritazione, rivolgersi a un medico. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un centro antiveleni.

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente gli occhi anche al di sotto delle palpebre con acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MAXFORCE IC è un'esca pronta all'uso in gel. Si utilizza in aree interne, in ambienti come ad esempio locali industriali/commerciali (ad esempio industrie alimentari, ristoranti, bar...), ambienti domestici, ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura).

ORGANISMI TARGET/s

Scarafaggi o Blatte (adulti e forme giovanili): *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*.

MODALITÀ APPLICATIVE

Il prodotto viene erogato con un apposito applicatore di gel. Concluso il trattamento, rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla in sicurezza. Se la cartuccia è stata usata solo in parte, estrarla dall'applicatore, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla secondo le istruzioni.

INDICAZIONI PER L'USO e DOSI DI APPLICAZIONE

Prima del trattamento rimuovere dall'area infestata tutte le altre possibili fonti alimentari per le blatte (rifiuti, avanzi di cibo...) per incoraggiare l'ingestione del gel.

Usare solo in aree nascoste, in cui è difficile accedere e lontane dall'acqua, come ad esempio crepe, anfratti e cavità. Applicare MAXFORCE IC in gocce o sottili strisce sulle superfici delle aree bersaglio identificate. Si può applicare negli angoli, nelle fessure, nelle crepe e nelle cavità.

Il dosaggio va adattato sulla base del grado di infestazione.

Una goccia da 0,1 g equivale a una goccia di circa 7 mm di diametro. Può essere applicata una sottile striscia, equivalente a una goccia.

Dosi di applicazione

Piccole specie, come ad esempio:

Blattella germanica: bassa infestazione 1 goccia da 0,1 g /m², alta infestazione 2 gocce da 0,1 g/ m².

Grandi specie, come ad esempio:

Blatta orientalis, *Periplaneta americana*: bassa infestazione 2 gocce da 0,1 g/m², alta infestazione 3 gocce da 0,1 g/ m².

In ambienti domestici non superare l'applicazione di 6 g di prodotto, pari a 60 gocce da 0,1 g.

In edifici più grandi non superare l'applicazione di 27,9 g di esca, pari a 270 gocce da 0,1 g.

Se sono necessarie quantità maggiori di prodotto, utilizzare un contenitore di esca.

Non superare gli 11 trattamenti all'anno per edificio.

In caso di re-infestazione, applicare nuovamente il prodotto senza superare il numero massimo autorizzato di trattamenti per anno.

AVVERTENZE

ESCLUSIVAMENTE PER USO COME INSETTICIDA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Non applicare direttamente sulle superfici dove vengono conservati o preparati alimenti o mangimi.

Usare solo in posti inaccessibili a bambini e animali. Impedire l'accesso all'esca da parte di bambini e animali. Lavarsi le mani e la cute esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza.

Solo per uso in ambienti interni. Pericoloso per le api. Non eliminare il prodotto non utilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavandino, toilette...). Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Non utilizzare su aree soggette a pulizia con acqua. Se si asportano i residui solidificati del prodotto con spugne o panni inumiditi, smaltire il prodotto e i suddetti materiali (panni, spugne...) in sicurezza con i rifiuti domestici.

Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Non esporre le gocce di MAXFORCE IC alla luce solare o al calore (termosifoni, ecc.).

Usare solo in aree nascoste, in cui è difficile accedere e lontane dall'acqua, quali crepe e cavità.

Conservare nel contenitore originale.

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Proteggere dal gelo.

Conservare al riparo dalla luce.

ALTRE INFORMAZIONI

Non usare il prodotto in aree con sospetta o accertata resistenza al principio attivo. Se il trattamento risultasse inefficace, informare il titolare della registrazione. Evitare l'uso continuativo del prodotto. Utilizzare possibilmente anche prodotti alternativi con differente meccanismo d'azione. Adottare metodi integrati di controllo degli infestanti, quali la combinazione di metodi di controllo fisico e chimico e altre misure igieniche, tenendo conto delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso...).

CARTUCCIA	TAPPO	PUNTALE	ASTUCCIO	ETICHETTA MULTIPAGINA
Plastica (HDPE 2)	Plastica (HDPE 2)	Plastica (PP 5)	Plastica (PET 1)	CARTA (PAP 22)
Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo comune				