

## Insetticida

### 1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

imidacloprid (N° CAS 138261-41-3) 2,15 g

BIT (N° CAS 2634-33-5) 0,1 g

CMIT/MIT (N° CAS 55965-84-9) 0,003 g

coformulanti quanto basta a 100

### 2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

### 3 – Caratteristiche del prodotto

Esca Insetticida in gel per il controllo degli scarafaggi

Per uso professionale – Categoria di utilizzatori: Professionisti

MAXFORCE PRIME è un'esca pronta all'uso in gel.

### 4 - Spettro d'azione

Scarafaggi (Blattoidea) (adulti e forme giovanili): Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella longipalpa.

### 5 - Aree di impiego

Per aree interne. Si utilizza in aree interne, in ambienti come ad esempio locali industriali/commerciali, aree domestiche/private, ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura).

### 6 - Modalità di impiego

Il prodotto viene erogato con un apposito applicatore di gel. Concluso il trattamento, rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla in sicurezza. Se la cartuccia è stata usata solo in parte, estrarla dall'applicatore, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla secondo le istruzioni.

Prima del trattamento rimuovere dall'area infestata tutte le altre fonti alimentari e per le blatte (es. rifiuti, avanzi di cibo) per favorire l'ingestione del gel.

Usare solo in aree nascoste, in cui è difficile accedere e lontane dall'acqua, come ad esempio crepe, anfratti e cavità. Applicare MAXFORCE PRIME in gocce o sottili strisce sulle superfici delle aree bersaglio identificate. Si può applicare negli angoli, nelle fessure, nelle crepe e nelle cavità. Il dosaggio va adattato sulla base del grado di infestazione.

### 7 - Dosi di impiego

Piccole specie, come ad esempio Blattella germanica: bassa infestazione 1 goccia da 0,1 g/m<sup>2</sup>, alta infestazione 2 gocce da 0,1 g/m<sup>2</sup>

Grandi specie, come ad esempio *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*: bassa infestazione 2 gocce da 0,1 g/m<sup>2</sup>, alta infestazione 3 gocce da 0,1 g/ m<sup>2</sup>.

Una goccia da 0,1 g equivale a una goccia di circa 7 mm di diametro. In alternativa, può essere applicata una sottile striscia, equivalente a una goccia. Il dosaggio massimo è di 3 gocce da 0,1 g per metro quadrato, per un massimo di 11 volte all'anno per edificio. Non superare l'applicazione di 60 gocce da 0,1 g (cioè 6 g di prodotto) in abitazioni domestiche. Non superare l'applicazione di 270 gocce da 0,1 g (cioè 27 g di prodotto) in edifici più grandi. Se sono necessarie quantità maggiori di prodotto, utilizzare un contenitore di esca in ambienti interni. In caso di re-infestazione, applicare nuovamente il prodotto senza superare il numero massimo autorizzato di trattamenti per anno.

## 8 - Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2020/00658/MRP

## 9 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **ATTENZIONE**

## 10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti adatti. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P321 Trattamento specifico (vedere istruzioni su questa etichetta). P313+P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 Togliere gli indumenti contaminati. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## 11 - Informazioni per il medico

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure di primo soccorso

Raccomandazioni generali: Allontanarsi dalla zona di pericolo. Trasportare e adagiare la persona infortunata in posizione stabile (distesa su un fianco). Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Rivolgersi a un centro antiveleni. Se compaiono dei sintomi e/o sono state ingerite grandi quantità, consultare immediatamente un medico. In caso di compromissione della coscienza, adagiare la persona in posizione di sicurezza e rivolgersi immediatamente a un medico. Non somministrare liquidi né indurre il

vomito. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta. Se necessario, portare la persona in ospedale e mostrare l'etichetta o la confezione. Non lasciare la persona intossicata da sola.

In caso di contatto con la pelle: togliere le calzature e gli indumenti contaminati. Lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un centro antiveleni. Se compare un'irritazione persistente, consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere eventuali lenti a contatto.

## **12 – Avvertenze**

**ESCLUSIVAMENTE PER USO COME INSETTICIDA. SOLO PER USO PROFESSIONALE.** Non applicare direttamente sulle superfici su cui vengono conservati, preparati o consumati alimenti o mangimi. Usare solo in posti inaccessibili a bambini ed agli animali. Impedire l'accesso all'esca da parte di bambini e animali. Lavarsi le mani e la cute esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Solo per uso in ambienti interni. Pericoloso per le api. Non eliminare il prodotto non utilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (lavandino, toilette...) o nelle fognature. Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Non utilizzare su aree soggette abitualmente a lavaggio con acqua. Se si asportano i residui solidificati del prodotto con spugne o panni umidi, il prodotto e i suddetti materiali (panni, spugne...) vanno smaltiti in sicurezza con i rifiuti domestici. Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Non esporre le gocce di MAXFORCE PRIME alla luce solare o al calore (termosifoni, ecc.). Usare solo in aree nascoste, cui è difficile accedere e lontane dall'acqua, quali crepe e cavità. Conservare nel contenitore originale. Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere dal gelo. Conservare al riparo dalla luce.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Non usare il prodotto in aree con sospetta o accertata resistenza ai principi attivi. Se il trattamento è inefficace, informare il titolare della registrazione. Evitare l'uso continuativo del prodotto. Alternare prodotti contenenti principi attivi con differente meccanismo d'azione. Adottare metodi integrati di controllo degli organismi nocivi, quali la combinazione di metodi di controllo chimico e fisico e altre misure di igiene, tenendo conto delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso ecc.).

## **13 - Confezione**

scatola contenente 4 cartucce da 30 g

## **14 – Compatibilità**

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

## **15 - Informazioni**

Tel. 02/3972.1 – Internet: [es.bayer.it](http://es.bayer.it)

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer