

## Insetticida

### 1 - **Composizione**

100 g di Solfac Gel Scarafaggi contengono:

Imidacloprid (n° CAS 138261-41-3) 2,15 g

Coformulanti q.b. a 100 g

### 2 – **Sostanza attiva**

Imidacloprid

### 3 – **Caratteristiche del prodotto**

Insetticida Pronto all'uso in gel

Per uso professionale – Categoria di utilizzatori: Professionisti

Per aree interne.

SOLFAC GEL SCARAFAGGI è un'esca pronta all'uso (formulazione: RB) in gel di colore bianco.

### 4 - **Spettro d'azione**

Scarafaggi (adulti e forme giovanili): Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella longipalpa.

### 5 - **Aree di impiego**

Può essere applicato in ambienti come aree domestiche/private, ambienti pubblici (es. ospedali, case di cura) e locali industriali/commerciali.

### 6 - **Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego**

Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Il prodotto viene erogato con l'apposito applicatore di gel. Prima del trattamento, rimuovere dall'area infestata tutte le altre fonti alimentari per le blatte (rifiuti, avanzi di cibo...), per incoraggiare l'ingestione del gel.

Applicare SOLFAC GEL SCARAFAGGI in gocce o sottili strisce sulle superfici delle aree bersaglio identificate; si può applicare negli angoli, nelle fessure, nelle crepe e nelle cavità. Una goccia di circa 7 mm di diametro equivale a 0,1 g di prodotto. Può essere applicato anche in una sottile striscia, equivalente a una goccia.

Il dosaggio viene adattato al grado d'infestazione:

contro Blattella germanica, Supella longipalpa: bassa infestazione una goccia/m<sup>2</sup>, alta infestazione 2 gocce/m<sup>2</sup>

contro Blatta orientalis, Periplaneta americana: bassa infestazione 2 gocce/m<sup>2</sup>, alta infestazione 3 gocce/m<sup>2</sup>

Bassa infestazione: insetti raramente visibili di giorno

Alta infestazione: insetti frequentemente visibili di giorno

Applicare al massimo 3 gocce da 0,1 g per metro quadrato, da applicare per un massimo di 11 volte per anno per edificio. Non applicare più di 60 gocce da 0,1 g (pari a 6 g di gel) in abitazioni domestiche. Non applicare più di 270 gocce da 0,1 g (pari a 27,9 g di gel) in edifici più grandi. Se sono necessarie quantità maggiori di esca, usare un contenitore di esca in ambienti chiusi. Concluso il trattamento, rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla in sicurezza. Se la confezione è stata usata solo in parte, sigillarla con il cappuccio in dotazione e conservarla secondo le istruzioni.

## 7 - Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT 2020/00680/MRP

## 8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **ATTENZIONE**

## 9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene BIT (1,2-Benzisothiazolin-3-one). Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## 10 - Informazioni per il medico

Misure di primo soccorso

Informazioni generali: allontanarsi dalla zona di pericolo. Trasportare e adagiare la persona in posizione stabile (distesa su un fianco). Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza.

In caso di ingestione: sciacquare la bocca con acqua. Rivolgersi a un Centro Antiveleni. Se compaiono dei sintomi e/o vengono ingerite grandi quantità, consultare un medico. In caso di compromissione della coscienza, adagiare la persona in posizione di sicurezza e rivolgersi a un medico. Non somministrare liquidi né indurre il vomito. Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta. Se necessario, portare la persona in ospedale e mostrare l'etichetta o la confezione. Non lasciare la persona da sola.

In caso di contatto con la pelle: togliere le calzature e gli indumenti contaminati. Lavare la cute contaminata con acqua e sapone. Se compaiono dei sintomi, rivolgersi a un Centro Antiveleni. Se compare e persiste un'irritazione, consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente con molta acqua, anche al di sotto delle palpebre, per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere eventuali lenti a contatto.

## 11 – Avvertenze

ESCLUSIVAMENTE PER USO COME INSETTICIDA. SOLO PER USO PROFESSIONALE. Non applicare direttamente sulle superfici su cui vengono conservati, preparati o consumati alimenti o mangimi. Usare solo in posti inaccessibili ai bambini e agli animali. Impedire l'accesso all'esca da parte dei bambini e degli animali. Lavarsi le mani e la cute esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in sicurezza. Solo per uso in ambienti interni. Pericoloso per le api. Non eliminare il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, in tubature (lavandino, toilette...) o nei canali di scolo. Non utilizzare su aree sottoposte abitualmente a pulizia con acqua. Se si asportano i residui solidificati dell'esca con spugne o panni inumiditi, l'esca e i suddetti materiali (spugne, panni ecc.) vanno smaltiti in sicurezza con i rifiuti domestici. Non applicare il prodotto su superfici assorbenti. Non esporre le gocce dell'esca alla luce solare o al calore (es. termosifoni). Usare solo in aree nascoste, cui è difficile accedere e lontane dall'acqua, quali crepe e cavità. Conservare nel contenitore originale. Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato. Proteggere dal freddo. Conservare al riparo dalla luce.

## ALTRE INFORMAZIONI

### Gestione della resistenza

Non usare il prodotto su aree con sospetta o accertata resistenza ai principi attivi. In caso di re-infestazione, applicare nuovamente il prodotto, senza superare il numero massimo autorizzato di trattamenti per anno. Se il trattamento è inefficace, informare il titolare della registrazione. Evitare l'uso continuativo del prodotto. Alternare prodotti contenenti principi attivi con differente meccanismo d'azione. Adottare metodi integrati di controllo degli organismi nocivi, quali la combinazione di metodi di controllo chimico e fisico e altre misure di igiene, tenendo conto delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso ecc.).

## 12 - Confezione

Un applicatore da 20 g

## 13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc.- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

## **14 - Informazioni**

Tel. 02/3972.1 – Internet: [es.bayer.it](http://es.bayer.it)

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer