

SOLFAC Antilarvale

Scheda Tecnica 01 24

Aggiornamento 11/02/24 - Riassunto delle caratteristiche del prodotto

Insetticida

1 - Composizione

Principio attivo: S-Methoprene 4 g/kg

2 - Sostanza attiva

s-methoprene (CAS 65733-16-6)

3 - Caratteristiche del prodotto

Categoria di utilizzatori: professionisti

Il prodotto SOLFAC ANTILARVALE contenente il principio attivo S-Methoprene, regolatore di crescita degli insetti, inibisce lo sviluppo delle mosche adulte, riproduttive dalle larve della mosca domestica (*Musca domestica*), della mosca cavallina (*Stomoxys calcitrans*) e del tenebrione (*Alphitobius diaperinus*).

Le larve trattate entrano nello stato di pupa ma non ne sviluppano gli insetti adulti. Usandolo si può diminuire sostanzialmente il numero degli insetti appena nati. Grazie alla lenta liberazione del principio attivo, il prodotto ha un'azione persistente.

L'insetticida anti-larvale granulare SOLFAC ANTILARVALE inibisce la comparsa delle mosche adulte e dei tenebrioni, ma non influisce le mosche ed i tenebrioni che hanno raggiunto lo stadio di pupa o adulto già prima del trattamento. Per eliminare le mosche e i tenebrioni adulti presenti si consiglia l'uso di un insetticida di buon effetto abbattente.

Il prodotto impedisce il numero delle mosche adulte appena schiuse per 12 settimane rispettando le istruzioni d'impiego indicate.

4 - Spettro d'azione

Larve della mosca domestica (*Musca domestica*), della mosca cavallina (*Stomoxys calcitrans*) e del tenebrione (*Alphitobius diaperinus*)

5 - Aree di impiego

Può essere applicato nei porcili chiusi, negli allevamenti di pollame, nelle stalle di bovini, nei diversi fabbricati agricoli, e nei locali per la sistemazione degli animali, per prevenire lo sviluppo delle larve di mosche che ci vivono.

Non è autorizzato l'uso nel letame negli ovili delle pecore e capre.

Il prodotto può essere usato con ottimi risultati anche ad eliminare le larve dei tenebrioni (alfitobi) negli allevamenti avicoli.

Può essere applicato anche per il trattamento delle larve delle mosche e dei tenebrioni che si sviluppano nei depositi di letame esterni se il deposito è impermeabile e isolato.

6 - Modalità d'impiego

Per prevenire lo sviluppo delle nuove larve è consigliato applicare SOLFAC ANTILARVALE per la prima volta dopo la fase di vuoto sanitario, entro 3 giorni dalla data dell'introduzione del nuovo bestiame sulla superficie del letame / della lettiera. Seguire le istruzioni relative al trattamento del letame / della lettiera.

E' importante distribuire i granuli sulla superficie del letame entro 3 giorni dalla data dell'introduzione di nuove bestiame, e ripetere l'applicazione per ogni strato di 10 cm nuovamente formato. Distribuire i granulati in modo omogeneo sulla superficie del letame residuo a ogni occasione in cui il letame viene asportato. In caso di una lettiera molto secca (p. es. lettiera per pollami) il prodotto può agire più lentamente. Aggiungere alla lettiera 100-200 ml di acqua per ogni m² per aiutare l'azione del larvicida anche in un ambiente molto secco. Per evitare le nuove infezioni è consigliato fare un trattamento complementare, regolare e profondo con un prodotto progettato per insetti adulti (per esempio il trattamento delle pareti con un prodotto liquido) in edifici vuoti, chiusi, subito dopo l'eliminazione di tutti i reflui vecchi e di tutte le lettiere usate, dopo la pulizia, ma prima della data dell'introduzione di nuovo bestiame.

È consigliato eliminare i nascondigli delle forme adulte dei tenebrioni chiudendo le fessure di dilatazioni, le crepe e le aperture, e riparando l'isolamento ed i muri danneggiati durante il periodo di vuoto sanitario (la fase di pulizia fra i due periodi di allevamento).

Il numero massimo di applicazioni annuali è sei.

7 - Dosi di impiego

Il prodotto deve essere distribuito sulla superficie del letame con un misurino o uno strumento adeguato, p. es. con un distributore manuale di granuli secondo il seguente dosaggio:

*In caso di allevamenti di suini e bovini: 30 g/m²

Strutture con pavimento fessurato: applicare il prodotto al terzo giorno dalla data dell'introduzione di nuove bestiame. Distribuire i granuli su tutta la superficie del letame. Ripetere l'applicazione dopo ogni rimozione del letame.

Strutture con lettiera: applicare il prodotto per ogni nuovo strato di lettiera, e ripetere l'applicazione dopo ogni strato di 8-10 cm nuovamente formato.

*Allevamenti avicoli: 30 g/m²

Allevamento in gabbie: applicare i granuli sulle deiezioni raccolte sotto le gabbie (per ogni strato di 10 cm).

Strutture con lettiera: applicare il prodotto per ogni nuovo strato di lettiera, e ripetere l'applicazione dopo ogni strato di 10 cm.

In caso di reflui all'esterno: l'applicazione è autorizzata se il letame è conservato in un deposito di letame impermeabile e isolato, e il deposito è conforme anche agli altri requisiti dello stoccaggio di letame sicuro. Al trattamento del letame conservato all'aperto applicare il prodotto in una dose di 30 g/m².

Interrompere il trattamento del letame con il larvicida almeno due mesi prima della distribuzione / dell'incorporamento del letame nel terreno.

8 - Registrazione

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

Autorizzazione del Ministero della Salute IT/2022/00789/MRS

9 - Simboli di pericolo

10 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

EUH208 Contiene 15-idrossistearato di polietilenglicole. Può provocare una reazione allergica. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P501 Smaltire il prodotto in conformità alla normativa vigente in materia.

11 - Informazioni per il medico

Probabili effetti negativi, diretti o indiretti: In caso di esposizione ripetuta possono verificarsi sintomi allergici.

Misure di primo soccorso:

- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare gli occhi per 15 minuti con acqua corrente. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):** Rimuovere/togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante / getto d'acqua.
- **In caso di esposizione o di ingerimento:** consultare il medico.

12 - Avvertenze

Misure di mitigazione del rischio: seguire le regole previste durante l'applicazione per evitare i danni dell'ambiente e della salute.

Il prodotto deve essere utilizzato in modo che gli animali non vengano a contatto con il prodotto. In caso di difficoltà, spostare gli animali per tutta la durata dell'applicazione.

Applicare il prodotto sul letame raccolto sotto il pavimento fessurato, il grigliato, il sistema di lettiera profonda e le gabbie.

Non distribuire i granuli in prossimità dei mangimi e dei terreni irrigati, o dei luoghi in cui gli animali possono ingerire il prodotto.

Se esiste il pericolo che il mangime o l'acqua degli animali possano essere contaminati, svuotare o coprire le mangiatoie o gli abbeveratoi prima dell'applicazione del prodotto nel luogo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. NON conservare insieme ad alimenti, mangimi, sementi e concimi.

Non applicare il prodotto nelle strutture che servono alla sistemazione degli animali, in cui non si può evitare il contatto con l'impianto di depurazione delle acque reflue oppure il contatto diretto con acque superficiali.

Per impedire la formazione della resistenza è consigliata l'applicazione di altri insetticidi aventi meccanismi d'azione diversi nel corso del programma di controllo parassiti. Nel caso dell'insetticida anti-larvale granulare Solfac Antilarvale è consigliato utilizzare periodicamente prodotti adulticidi, trappole adesive e lampade UV dopo l'applicazione del prodotto anti-larvale. Le trappole adesive possono essere utilizzate anche per scopo di monitoraggio.

13 - Confezione

Secchiello da 15 kg

Secchiello: PP5

Misurino: PP5

Coperchio: PP5

14 - Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari - assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

15 - Informazioni

2022 Environmental Science FR SAS - filiale italiana

Tel. 800.166.071 - Internet: it.envu.com

Envu, il logo Envu e Solfac® sono marchi registrati di titolarità di 2022 Environmental Science U.S. LLC. o di una delle sue consociate.