

殺菌剤 芝用

ユキスター®

水和剤

これ1本で2つの効果
「雪腐病」防除はユキスター


登録商標 第6501088号



W効果で「雪腐病」を防除!


2つの有効成分を配合した「ユキスター水和剤」。幅広い防除効果をもつ2種類のパワーが生み出す独自の相乗効果で雪腐病を完全にコントロール。これ1本で大切な芝を確実にキープします

雪腐小粒菌核病



- 試験地 …メイプルポイントGCナセリー、1区5㎡、2反復
- 試験内容 …12月7日、12月19日にユキスター200倍希釈液を0.2L/㎡如雨露で散布
- 結果 …ユキスターは防除効果100%と高い効果を示し、薬害もなく実用性が高いと考えられた

紅色雪腐病



- 試験地 …平成17年度北海道北広島市輪厚ナセリー、1区4㎡、3反復
- 試験内容 …ユキスターを11月22日に背負い式動力噴霧器を使い200倍希釈液を0.2L/㎡散布した
- 結果 …紅色雪腐病甚発生条件下で、防除価99.8%と非常に高い防除効果を示した

適用病害虫の範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イプロジオンを含む農薬の総使用回数 | テブコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|----------------------------|------------------|------|------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 西洋芝(ベントグラス) 西洋芝(ブルーグラス) | 雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病 | 200倍 | 根雪前 | 3回以内 | 1㎡当たり 0.2L散布 | 8回以内 | 6回以内 |

- 種類名：イプロジオン・テブコナゾール水和剤
- 成分：イプロジオン…50%
テブコナゾール…5%
- 性状：類白色水和性粉末(45μm以下)
- 有効年限：3年
- 毒性：普通物
- 荷姿：(1kg×5袋)×2

効果・薬害等の注意事項

- 散布直後の降雨は効果を減ずる可能性があるため、天候を見極めてから散布してください
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため過度の連用を避けてなるべく作用性の異なる薬剤と合わせてローテーションで使用してください
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特にはじめで使用する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです

安全使用上の注意事項



- 誤飲、誤食などのないように注意してください
- 桑葉にかからないようにしてください
- 眼に入らないように注意。散布液調製時には保護眼鏡を着用してください
眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(強い刺激性)
- 皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付着した場合は直ちに石けんでよく洗い流してください(弱い刺激性)
- 散布時は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください
- 散布器具、容器の洗浄水および残りの薬液は河川に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください
保管…密閉し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵・乾燥した場所に保管してください
- 食べられません
- 有効年月日内に使用してください
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲食後等は取り扱い及び作業をしないでください



エンバイロサイエンスジャパン株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-6-1
www.jp.envu.com



お問い合わせ先