

# デディケート®

## フロアブル

殺菌剤


農林水産省登録 第22585号  
 テブコナゾール・  
 トリフロキシストロピン水和剤

殺菌剤分類 3,11

芝用

ダラースポット病・  
 炭疽病などに

登録商標 第5233403号



1ℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
 本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu™

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体  
 成分 テブコナゾール(化管法1種)……………18.2%  
 [(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)]  
 ペンタン-3-オール  
 トリフロキシストロピン(化管法1種)……………8.8%  
 [メチル-(E)-メトキシイミノ-{(E)-α-[1-(α,α,α-トリフルオロ-m-トリル)-エチリデン]  
 [アミノオキシ]-o-トリル]}アセタート  
 界面活性剤、水等……………73.0%

### 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	使用方法(1m <sup>2</sup> 当り)
西洋芝 (ベントグラス)	ダラースポット病	200~250	発病前~ 発病初期	0.1ℓ散布
	炭疽病、赤焼病、ピシウム病 葉腐病(ブラウンパッチ)	1,000~1,250		0.5ℓ散布
	フェアリーリング病	2,000		1ℓ散布
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) ダラースポット病	400		0.2ℓ散布

総使用回数：本剤6回以内、テブコナゾール剤6回以内、トリフロキシストロピン剤6回以内

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- はくさい、だいこん、いちご、なしに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意する
- 高温時に薬害(黄緑化)を生じるおそれがあるので注意する
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

### ⚠ 安全使用上の注意

- 桑葉にかからないようにする(蚕毒)
- 誤飲に注意
- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 散布時は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをし、衣服を換える
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意

○公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(魚類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場 バイエルクロップサイエンス株式会社  
 大田工場 大韓民国テジョン=グァンヨク市  
 テドク区テジョン路1331-141

小分 バイエルクロップサイエンス株式会社  
 製造場 防府工場 山口県防府市新田築地2061

### ■ 開封方法



JP80872941F

最終有効年月(西暦下2桁)

目盛りは目安