

グラッチェ®

顆粒水和剤

除草剤

農林水産省登録 第20393号

エトキシスルフロン水和剤 除草剤分類 2

芝用

性状 褐色水和性細粒

成分 エトキシスルフロン……………60.0%

〔1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)
-3-(2-エトキシフェノキシスルホニル)
尿素〕

鉱物質微粉、界面活性剤 等…40.0%

登録商標 第3339664号

広葉雑草から難防除雑草まで防除

100g入

製造 バイエルクロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
東京都千代田区大手町1-6-1



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない

グラッチェ®顆粒水和剤(エトキシスルフロロン水和剤)

■ 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	エトキシスルフロロンを含む農薬の総使用回数
			薬量(g)	希釈水量(l)			
日本芝	一年生広葉雑草	雑草発生前 (芝生育期)	15~30	200 ~300	3回以内	散布	3回以内
	多年生広葉雑草		30~60				
	ヒメクグハマスゲ	雑草生育初期 (3葉期まで)	45~75				
西洋芝 (ベントグラス)	一年生及び多年生広葉雑草	(芝生育期)	30~60	200 ~300	3回以内	散布	3回以内
西洋芝 (ブルーグラス)	ヒメクグハマスゲ		45~75				

⚠ 効果・薬害等の注意


- 雑草の発生前から生育初期に有効なので時期を失ないように散布する
- イネ科雑草の優占する圃場ではこれに有効な薬剤と組み合わせて使用する(効果)
- 芝生の中にある草花や花木、畑作物など周辺作物に薬液がかからないように散布する(薬害)
- 散布に用いた機具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならぬよう注意する
- 使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や、異常気象時は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる

空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理する

最終有効年月
(西暦下2桁)

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食等のないよう注意する
 - 眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)
 - 散布時は農業用マスク、手袋、長ズボン、 長袖の作業衣などを着用し、散布液を浴びたり吸い込んだりしないように注意する
 - 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
- 魚毒性等… 散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。空袋などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
- 保管… 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所

- 食べられません ● 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場

バイエル社 フランクフルト工場

ドイツ国フランクフルト(マイン)市ヘキスト区

小分製造場

尾道クミカ工業株式会社 尾道工場

広島県尾道市長者原2-160