

## 殺菌剤

農林水産省登録 第23367号

ペンフルフェン水和剤 殺菌剤分類 7

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

成分 ペンフルフェン(化管法1種) ……22.7%

2'-[(RS)-1,3-ジメチルブチル]-5-フルオロ-1,3-ジメチルピラゾール-4-カルボキサニリド

水、界面活性剤等 ……77.3%

ラージパッチ防除に


登録商標 第4241222号

500ml入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
 本社 東京都千代田区大手町1-6-1



## 芝用



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

### 適用病害虫と使用方法

使用方法：散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(1㎡当り)	使用時期	総使用回数*
日本芝	葉腐病(ラージパッチ) 疑似葉腐病(春はげ症) 疑似葉腐病(象の足跡) ダラースポット病	666~ 1,000	0.2ℓ	発病前~ 発病初期	2回
	カープラリア葉枯病	1,000			
	フェアリーリング病	666			
西洋芝 (ペントグラス)	炭疽病 ダラースポット病 フェアリーリング病	200 400 1,000	0.1ℓ 0.2ℓ 0.5ℓ	4回	
	西洋芝 (ライグラス) 西洋芝 (バーミューダグラス)	200	0.1ℓ		
		400	0.2ℓ		
	ダラースポット病	1,000	0.5ℓ		

\*印は本剤及びその有効成分を含む農業の総使用回数の制限を示す

### △ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- ゴルフ場のバッティンググリーンで使用する場合、一年生のブルーグラス類に対しては薬害を生じるおそれがあるため十分に注意する
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

### △ 安全使用上の注意

- 桑葉にかからないようにする(蚕毒) ○誤飲に注意
- 散布時は、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、衣服を換える
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(魚類)。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する  
 保管…密栓し、直射日光をさげ、食品と区別して、冷涼な所

- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う

### 製造場

バイエル社 ドルマーゲン工場  
 ドイツ国ドルマーゲン市 D-41538

バイエル社 フランクフルト工場  
 ドイツ国フランクフルト(マイン)市ヘキスト区

小分製造場  
 バイエルックロップサイエンス株式会社  
 防府工場 山口県防府市新田築地2061

### ■ 開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。

キャップ1杯  
 約40ml



JP817273681  
 最終有効年月(西暦下2桁)