

プロキシ® 液剤

植物成長調整剤

農林水産省登録 第22933号

エテホン液剤

性状 無色透明水溶性液体

成分 エテホン……………21.5%

【2-クロロエチルホスホン酸】

水 等……………78.5%

登録商標 第5233405号

1ℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu™

芝用

スズメノカタビラ出穂抑制



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届くところには置かない。空容器(空ビン)は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる

使用目的と使用方法

作物名	使用目的	使用量		使用時期	使用方法	総使用回数*
		薬量	希釈水量			
西洋芝(ベントグラス、 ケンタッキーブルーグラス)	スズメノカタビラ 出穂抑制	1.0~1.5 ml/m ²	100~200 ml/m ²	スズメノカタビラ 出穂前	雑草茎葉 散布	3回以内

* 印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- スズメノカタビラ出穂前に有効なので、時期を失しないように均一に散布する
- 効果を安定させるために反復処理を行う場合は、1ヵ月程度の間隔で反復処理する
- その日の天候に留意し、降雨が予想される時には使用をさける
- 踏圧、すり切れ、高温、低温、多雨、早魃、極端な少肥条件など芝がストレス状態にある時は、使用をさけるか少なめの薬量を使用する
- 散布後に芝に黄変などの薬害を生じることがあるが、一過性のもので次第に回復し、その後の生育には影響を与えない
- 本剤の散布に用いた機具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗浄し、他の用途に使用する場合は薬害の原因にならないよう注意する
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

最終有効年月(西暦下2桁)

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意
- 誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる
- 散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける(原液は強い刺激性)
- 皮ふに付着しないよう注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(弱い刺激性)
- 公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管
- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場 PTバイエルインドネシア スラバヤ工場
インドネシア ジャワティモール州 スラバヤ市
スラバヤ工業団地 ルンクットインダストリー通り 1/12

小分製造場 ハヤシアグロサイエンス株式会社 赤穂工場
兵庫県赤穂市加里屋1125

JP80557299H C1