

## 殺虫剤

農林水産省登録 第24467号  
テトラニリプロール水和剤

殺虫剤分類 28

性状 類白色水と性粘稠懸濁液体  
成分 テトラニリプロール ..... 4.0%  
[1-(3-クロロ-2-ビリジル)-4'-シアノ-2'-メチル-6'-メチルカルバモイル-3-[(5'-トリフルオロメチル)-2H-テトラゾール-2-イリメチル]ピラゾール-5-カルボキサニド]  
水、界面活性剤等 ..... 96.0%

登録商標 第6245411号

## 芝用

チョウ目害虫と  
甲虫目害虫を同時に防除



1ℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu™

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

### 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(mL/m <sup>2</sup> )	使用時期	使用方法	総使用回数*
芝	スジキリヨトウ	200~250	50	発生初期	散布	2回
		400~500	100			
		800~1,000	200			
		2,000	500			
芝	シバツトガ タマナヤガ	200	50			
		400	100			
		800	200			
		2,000	500			
芝	コガネムシ類幼虫 シバオサゾウムシ	800	200			
		2,000	500			

\*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(沈殿)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

### ⚠ 安全使用上の注意

- 桑葉にはからないように注意(蚕毒)
- ミツバチに対する注意
  - 巣箱及びその周辺にからないようにする
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける
  - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に関する情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める
- 誤飲に注意。使用中に異常を感じた場合には直ちに医師の手当をうける
- 敷設時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する
- 作業時に着用していた衣服等は他のものは分けて洗濯する
- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄張りや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵な所

- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場 バイエル クロップサイエンス社

カンサス工場

米国 ミズーリ州 カンサス市 ホーソンロード8400

小分製造場 バイエル クロップサイエンス株式会社

防府工場

山口県防府市新田築地2061

### ■開封方法



JP86713314C  
最終有効年月(西暦下2桁)