



## 除草剤

農林水産省登録 第23750号

フルフェナセット水和剤 除草剤分類 **15**

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体  
成分 フルフェナセット(化管法2種) ..... 42.4%  
〔4'-フルオロ-N-イソプロピル-2-(5-(トリフルオロメチル)-1,3,4-チアジアゾール-2-イルオキシ)アセトアニリド〕  
水、界面活性剤等 ..... 57.6%

登録商標 第6501092号

## 1ℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
本社 東京都千代田区大手町1-6-1



## 芝用

異なる作用性でスズメノカタビラに高い効果!



## 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	1m <sup>2</sup> 当り使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量(mℓ)	希釈水量(mℓ)		
日本芝	一年生雑草	秋冬期芝生育期 (雑草発生初期)	0.15~0.2	100~300	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	1回

\*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- 一年生雑草の発生初期に有効で、遅効性で効果発現に時間を要するので、時期を失ないように均一に散布する
- 十分に活着した日本芝に使用する
- 寒地型西洋芝では薬害を生じるので飛散しないよう注意して散布する。特にゴルフ場においては、寒地型西洋芝を使用しているグリーンやティーグラウンド周辺では使用しない
- 処理後に大量の降雨が予想される場合は使用をさける
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

### ⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる
- 使用中に異常を感じた時には直ちに医師の手当を受ける
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

最終有効年月(西暦下2桁)

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(藻類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切る。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

製造場 バイエル社 フランクフルト工場  
ドイツ国 フランクフルト(マイン)市ヘキスト区  
バイエルS.A.S グランジュールージュ工場  
フランス国 ヴィルフランシュシュールソヌ 69400  
リマ エドゥアールエリオ通り 1番地

小分製造場 ハヤシ アグロサイエンス株式会社 赤穂工場  
兵庫県赤穂市加里屋1125