

トップチョイス

フロアブル

殺虫剤

農林水産省登録
第23970号

フィプロニル水和剤

殺虫剤分類 2B

医薬用外劇物

独自作用性でシバツガ、ケラを防除

250ml入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
本社 東京都千代田区大手町1-6-1

envu™



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
成分 フィプロニル(化管法1種)……………9.1%
[(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル]水、界面活性剤等……………90.9%

製造場 バイエル クロップサイエンス Pty Ltd ピンケンバ工場
オーストラリア クイーンズランド州 ブリスベン ピンケンバ ティンギラ ストリート261

小分製造場 バイエル クロップサイエンス株式会社
本社 東京都千代田区丸の内1-6-5
防府工場 山口県防府市新田築地2061

JP84454133D

最終有効年月(西暦下2桁)

開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。
キャップ1杯 約40ml



トップチョイスフロアブル フィプロニル水和剤 250ml入

医薬用外劇物

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ml/m ²)	使用時期	使用方法	総使用回数*
芝	シバツガ ケラ	3,000~ 4,000	200	発生初期	散布	5回
		7,500~ 10,000	500			

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(沈殿)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意

- 桑葉にかからないようにする(蚕毒)
- ミツバチを放飼している地域では使用をさける
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受ける

治療法…フェノバルビタール製剤の投与が有効(動物実験で報告)



○散布時は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして、衣服を換える



○作業時の衣服などは他と分けて洗濯する

○かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する



○公園などで使用する場合、使用区域に縄囲いや立て札をたて、使用中および使用後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する



魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。カギをかける。盗難・紛失の際は、警察に届ける

●火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める

●漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する

●移送取扱いは、ていねいに行う

●飲めません

●有効年月内に使用する

●体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない