

ユキスター[®]

水和剤

殺菌剤

農林水産省登録 第21641号

イプロジオン・テブコナゾール水和剤 殺菌剤分類 2,3

性状 類白色水和性粉末 45μm以下

成分 イプロジオン……………50.0%

[(3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド)
テブコナゾール……………5.0%

[(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール]
鉱物質微粉、界面活性剤等……………45.0%

〈化管法〉 1種 テブコナゾール…5.0%

1種 イプロジオン…50.0%

登録商標 第6501088号

芝用

雪腐小粒菌核病・紅色雪腐病

1kg入

製造 バイエル クロップサイエンス株式会社
東京都千代田区丸の内1-6-5

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社
東京都千代田区大手町1-6-1

- ★ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない
- ★使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる
- ★空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する

ユキスター[®] 水和剤(イプロジオン・テブコナゾール水和剤)

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釀倍数 (倍)	使用時期	使用方法 (1m ² 当たり)	本剤の 使用回数	イプロジオンを含む 農薬の総使用回数	テブコナゾールを含む 農薬の総使用回数
西洋芝 (ベントグラス) (ブルーグラス)	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	200	根雪前	0.2 ℥ 敷布	3回以内	8回以内	6回以内

!**効果・薬害等の注意**

- 散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めてから散布する(効果)
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤とのローテーションで使用する(耐性菌出現回避)
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

!**安全使用上の注意**

- 桑葉にかかるないようにする(蚕毒)
- 誤飲、誤食に注意
-  ●散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける(強い刺激性)
-  ●皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(弱い刺激性)
-  ●散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を換える
- 公園等で使用する場合、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に、小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意する
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川に流さない。空袋は環境に影響を与えないよう適切に処理する

保管……密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 食べられません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場 ホクサン株式会社
北広島工場 北海道北広島市北の里27番地4

最終有効年月(西暦下2桁)