使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる


製造場
バイエルクロップサイエンス社
フランクフルト工場
ドイツ国フランクフルト(マイン)市
ヘキスト区

小分製造場
株式会社サンエイム 武雄B工場
佐賀県武雄市若木町大字川古
武雄工業団地内

●飲めません
●有効年月内に使用する
●体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

最終有効年月
(西暦下2桁) 16.10

■開封方法
キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。
キャップ1杯 約40㎖



JP81755191A-
ARTICLE80926898

Bayer

エスプラネード™ フロアブル

除草剤

農林水産省登録 第23183号
インダジフラム水和剤

500㎖入

バイエルクロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業本部
本社 東京都千代田区丸の内 1-6-5
お客様相談室 0120-575-078
(9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日をのぞく)



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
成分 インダジフラム……19.1%
〔N-{(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}-6-{(1RS)-1-フルオロエチル}-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン
(N-{(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}-6-{(1R)-1-フルオロエチル}-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン…18.0%以上
N-{(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル}-6-{(1S)-1-フルオロエチル}-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン…1.1%以下)〕
水、界面活性剤等……80.9%

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量 薬量(㎖)	10アール当り使用量 希釈水量(ℓ)	使用方法	総使用回数*
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草発生前	35~75	100	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	2回

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠効果・薬害等の注意
○使用前に容器をよく振る(分離)
○一年生雑草の発生前に有効なので、時期を失しないように均一に散布する
○既に雑草が発生している場合には茎葉処理型除草剤と組み合わせて使用する
○激しい降雨が予想される場合は使用を控える
○散布液の飛散、流出による有用作物への薬害に注意する
○使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠安全使用上の注意
○誤飲に注意
○眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(弱い刺激性)
○散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
○作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする
○街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等…散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
保　管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管

400
300
200
100