



インターフェース フロアブル

殺菌剤

農林水産省登録 第23359号

イプロジオン・トリフロキシストロビン水和剤

性状 青緑色水和性粘稠懸濁液体

成分 イプロジオン……………23.1%

[3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド]

トリフロキシストロビン…1.4%

[メチル=(E)-メトキシイミノ-[(E)- α -[1-

(α , α , α -トリフルオロ-m-トリル)-エチル]

[デンアミノオキシ]-o-トリル]アセート]

界面活性剤、水等……………75.5%

〈PRTR〉1種 イプロジオン…23.1%

1種 トリフロキシストロビン…1.4%

®はバイエルグループの登録商標
第5549638号

1ℓ入

バイエル クロップサイエンス株式会社

エンバイロサイエンス事業部

本社 東京都千代田区丸の内1-6-5

お客様相談室 ☎0120-575-078

(9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く)

芝用

ダラスポット病に

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(1㎡当り)	使用時期	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	ダラスポット病 炭疽病 葉腐病 (ブラウンパッチ)	100	0.1ℓ	発病前～ 発病初期	散布
		250	0.5ℓ		

総使用回数：本剤6回以内、イプロジオン剤8回以内、トリフロキシストロビン剤6回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

○使用前に容器をよく振る(分離)

○いちご、なしに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意する

○使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意

○桑葉にかからないようにする(蚕毒)

○誤飲に注意

○眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)

○皮ふに付着しないよう注意。皮ふに付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(弱い刺激性)



○散布時は、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する

○作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをし、衣服を換える

○作業時の衣服などは他と分けて洗濯する

○かぶれやすい人は取扱いに十分注意



○公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等 … 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(魚類)。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

保管 … 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲みません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場

バイエルクロップサイエンス社

カンサス工場 米国 ミズーリ州 カンサス市
ホーソンロード 8400

小分製造場

バイエルクロップサイエンス株式会社

防府工場 山口県防府市新田築地2061

■開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。
キャップ1杯
約40mℓ



JP80878524E

最終有効年月(西暦下2桁)

Bayer

目盛りは目安