■ラベルをよく読む　■記載以外には使用しない　■小児の手の届く所には置かない
■使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる
■空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

適用雑草と使用方法

作物名	使用目的	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		総使用回数＊	使用方法
				薬量	希釈水量		
日本芝	－	一年生雑草	雑草発生前（芝生育期）	100～200mℓ	200～300ℓ	2回	全面土壌散布
日本芝（こうらいしば）	張芝の根の生育促進	－	張芝後	200mℓ	200ℓ		

＊印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

⚠効果・薬害等の注意

○使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出す
○一年生雑草の発生前に有効なので、時期を失しないように均一に散布する
○ナデシコ科（ツメクサ・ミミナグサなど）には効果が劣るので、それらが優占する圃場では使用をさける
○寒冷地型芝には薬害が生じるので使用しない
○日本芝の生育期には地上部に黄化や生育抑制などの影響が生じる場合があるが、1～2週間程度で回復する
○張芝の根の生育促進に使用する場合は、張芝約1週間後に散布すると効果的である
○使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

●飲めません　●有効年月内に使用する
●体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

最終有効年月（西暦下2桁）

⚠安全使用上の注意

○誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる



○散布時は、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
○作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする



○かぶれやすい人は取扱いに十分注意
○公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する（藻類）。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する
保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

製造場　バイエルS.A.S
グランジュルージュ工場
フランス国 ヴィルフランシュ シュール ソーヌ
69400 リマ エドゥアールエリオ通り 1番地
バイエルS.A.S
マーレ工場
フランス国 マーレ市
BP2 ルー アントワーヌ ローラン ドゥ ラボアシエ
小分　ハヤシ アグロサイエンス株式会社
製造場　赤穂工場 兵庫県赤穂市加里屋1125

JP58618644E
B4

Bayer

フェナックス®
フロアブル

除草剤

農林水産省登録 第22393号
オキサジアルギル水和剤

芝用

性状　淡褐色水和性粘稠懸濁液体
成分　オキサジアルギル……35.4%
［5-tert-ブチル-3-［2,4-ジクロロ-5-（プロパ-2-イニルオキシ）フェニル］-1,3,4-オキサジアゾール-2（3H）-オン］
水、界面活性剤 等……64.6%

®はバイエルグループの登録商標
第4191380号

一年生雑草に



500mℓ入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本社　東京都千代田区丸の内1-6-5
お客様相談室 0120-575-078
（9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日を除く）