

保 管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、
冷涼・乾燥した所
製造場 バイエル社 フランクフルト工場
ドイツ国フランクフルト(マイン)市ヘキスト区
小分 株式会社サンエイム 武雄B工場
製造場 佐賀県武雄市若木町大字川古武雄工業団地内



最終有効年月
(西暦下2桁) 23.02

- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

JP80874618M-
ARTICLE80021062

Bayer



除草剤

農林水産省登録
第23066号

インダジフラム水和剤

⑥はバイエルグループの登録商標
第5307230号

250mL入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本社 東京都千代田区丸の内1-6-5
お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、
3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

成分 インダジフラム……………19.1%

[N-(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル]-6-[(1RS)-1-フルオロエチル]-1,3,5トリアジン-2,4-ジアミン

[N-(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル]-6-[(1R)-1-フルオロエチル]-1,3,5トリアジン-2,4-ジアミン…18.0%以上]

[N-(1R,2S)-2,3-ジヒドロ-2,6-ジメチル-1H-インデン-1-イル]-6-[(1S)-1-フルオロエチル]-1,3,5トリアジン-2,4-ジアミン…1.1%以下]
水、界面活性剤等……………80.9%

*印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量 (mL)	希釈水量 (ℓ)		
日本芝	一年生 雑草 発生前		20 ～30	200 ～300	全面 土壌 散布	2回

⚠効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- 一年生雑草の発生前に有効なので、時期を失しないように均一に散布する
- 充分に活着した日本芝に使用する
- 以下の条件では使用をさける
 - 極端な砂質土壤
 - 生育が不良な芝
- 寒冷地型芝には使用しない(薬害)
- 周辺の有用植物に飛散、流入しないよう十分注意して散布する
- 激しい降雨の予想される場合は使用をさける



- 誤飲に注意
- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(弱い刺激性)
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをする
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄張いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する
- 魚毒性等…散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する