



テトリノ[®] フロアブル

殺虫剤

農林水産省登録 第24467号

テトラニプロール水和剤

®はバイエルグループの登録商標 第6245411号

芝用

1ℓ入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本社 東京都千代田区丸の内1-6-5
お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

チョウ目害虫と甲虫目害虫を同時に防除



ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切る。
空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
成分 テトラニプロール……………4.0%
〔1-(3-クロロ-2-ヒリジル)-4'-シアノ-2'-メチル-6'-メチルカルバモイル-3-[[5-(トリフルオロメチル)-2H-テトラゾール-2-イル]メチル]ピラゾール-5-カルボキサニリド
水、界面活性剤等……………96.0%〕

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (mℓ/m ²)	使用時期	使用方法
芝	スジキリヨトウ	200~250	50	発生初期	散布
		400~500	100		
		800~1,000	200		
		2,000	500		
	シバツトガ タマナヤガ	200	50		
		400	100		
		800	200		
		2,000	500		
	コガネムシ類幼虫 シバオサソウムシ	800	200		
		2,000	500		

総使用回数：本剤2回以内、テトラニプロール剤2回以内

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする
- ミツバチに対する注意
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める
- 誤飲などに注意し、本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける
- 散布時は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する
- 公園等で使用する場合は、使用区域に縄囲いや立札を立て、使用中及び使用後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

- 飲めません
- 有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲食後等は取り扱い及び作業をしない

製造場 バイエル クロップサイエンス株式会社
カンサス工場
米国 ミズーリ州 カンサス市 ホーソンロード8400

小分 バイエル クロップサイエンス株式会社
製造場 防府工場 山口県防府市新田築地2061

■ 開封方法



Bayer

JP86713314B

最終有効年月(西暦下2桁)

目盛りは目安