



# エクステリス®

フロアブル

殺菌剤

芝用

農林水産省登録 第24642号

トリフロキシストロビン・フルオピラム水和剤

殺菌剤分類 11,7

性状 暗青緑色水和性粘稠懸濁液体

成分	トリフロキシストロビン	1.92%
	フルオピラム	1.19%
	界面活性剤、水等	96.89%

2成分で効く、ストレスガード製剤

〈化管法〉 1種 ホリ(オキエチレン)＝アルキル－アル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(407) 2.2%

1種 メチル＝(E)－ホキシイミド [2- [[ [(E)- 1- [3- (トリフロロメチル)フェニル]エチレン]アミノ]オキシ]メチル]アセート(444) …… 1.92%

登録商標 第6513518号

5ℓ入

販売 エンバイロサイエンスジャパン株式会社  
本社 東京都千代田区大手町1-6-1



JP86711427A

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用する

## 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (1㎡当り)	使用時期	使用方 法	トリプロキシストロピ ンを含む農薬の総使 用回数	本剤およびフルオピラム を含む農薬の使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	ダラースポット病 炭疽病	50	0.1ℓ	発病前～ 発病初期	散布	6回	2回
		100	0.2ℓ				
西洋芝 (パーミュアダグラス)	ダラースポット病	50	0.1ℓ				
		100	0.2ℓ				

### △ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- 散布後、散布液が乾燥する前にゴルフプレイヤーなど他者が立ち入ると、靴や衣服および所有物を汚損(着色)するおそれがあるので注意する
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

### △ 安全使用上の注意

- 薬液にからないようにする(蚕毒)
- 誤飲に注意
- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(弱い刺激性)



- 散布時は農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをし、衣服を換える
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する
- かぶれやすい人は作業しない。施用した作物などに触れない
- 夏期高温時の使用を避ける
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜などに留意する

**魚毒性等**・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する(魚類)。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器などは水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

**保管**・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていないに行う
- 飲めません ● 有効年以内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱いおよび作業をしない

**製造場** ヘレナ・インダストリーズ社

コーデレ工場 米国 ジョージア州 コーデレ フェンロード 434

最終有効年月(西暦下2桁)

# 28.01