APLICACIÓN URBANA

FMC

Ally® 60 WG

metsulfuron metil
Herbicida
Gránulos Dispersables
sulfonilurea

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Ingrediente Activo:	**% en peso**
metsulfuron metil: metil 2-[[[[(4-metoxy-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)amino]carbonil] amino]sulfonil]benzoato ..... (Equivalente a 600 g/Kg).	60.0
Ingredientes Inertes:	
Humectantes, dispersantes y compuestos relacionados.....	40.0
Total.....	100.0%

Registro único: RSCO-URB-HEDE-276-302-034-60

Contenido Neto: 1 Kg

Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Titular del registro, importador y distribuidor:
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

Número de lote: Ver en el envase.

Fecha de fabricación: Ver en el envase.

Fecha de caducidad: 2 (dos) años después de su elaboración

HECHO EN E.U.A. / ARGENTINA/ PUERTO RICO
ENVASADO EN MÉXICO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

ALMXU1181F / A01830825

PRECAUCIÓN

330mm

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
El herbicida urbano marca **Ally® 60 XP** causa irritación a los ojos.

Equipo de protección y seguridad: Camisa de manga larga y pantalón largo (overol), zapatos y calcetines. **Medidas de prevención:** Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. Evite respira el polvo a las nebulizaciones. Lavarse las manos profundamente con agua y jabón después del manejo y antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y detergente por separado de otra ropa. Mantenga el producto alejado del calor o fuentes de ignición. El polvo puede formar mezclas explosivas en el aire. Almacene el producto en el contenedor original y mantenga herméticamente cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO
- **NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.**
- **NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.**
- **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**
- **LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.**
- **NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.**
- **NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.**
- **LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.**
- **NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.**
- **NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.**
- **AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**
- **NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS
- **Si hay contacto con la piel:** Retire toda la ropa contaminada inmediatamente. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos. Llame al Servicio de Información Toxicológica SINTOX o a un médico para el tratamiento.
- **Si hay contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15 a 20 minutos. Después de 5 minutos quite los lentes de contacto, si están presentes y continúe enjuagando los ojos. Llame al Servicio de Información Toxicológica SINTOX o a un médico para el tratamiento.
- **Si se inhala:** No se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por inhalación. Llame al Servicio de Información Toxicológica SINTOX o a un médico para el tratamiento.
- **Si se ingiere:** No se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por ingestión. Llame al Servicio de Información Toxicológica SINTOX o a un médico para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
Grupo químico: sulfonilureas.
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcione tratamiento sintomático.
Síntomas de intoxicación: Irritación de los ojos con lagrimeo, dolor o visión borrosa. Irritación a la piel con comezón, ardor, enrojecimiento, inflamación o salpullido.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA DEL SINTOX: 01-800-00-928-00, 01 (55) 5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
- **DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.**
- **MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.**
- **EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).**
- **EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.**
- **CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).**

GARANTÍA
FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **Ally® 60 WG** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

El herbicida urbano marca **Ally® 60 WG** de FMC está formulado como gránulos dispersables para ser mezclado con agua y aplicado como aspersión foliar para el control de malezas leñosas no deseables y maleza de hoja ancha anuales y perennes, además del control preemergente y postemergente de maleza en áreas no cultivadas y áreas industriales.

No aplique este producto en lagos, reservas de agua, ríos, arroyos y estuarios; tampoco en áreas como pantanos, charcos y ciénegas mientras esté presente el agua. Las altas temperaturas y la humedad seguidas del tratamiento promueven la actividad del herbicida; mientras que las bajas temperaturas y las condiciones de sequía pueden reducir o retardar su actividad. La maleza y los arbustos endurecidos por heladas o sequías pueden no ser controladas. El grado de control y la duración del efecto depende de la dosis usada, la sensibilidad y tamaño de la maleza, además de la humedad y temperatura del suelo. El herbicida urbano marca **Ally® 60 WG** no es corrosivo, no es inflamable y no es volátil.

Modo de acción: Ally® 60 WG detiene rápidamente el crecimiento de especies susceptibles, sin embargo los síntomas (decoloración) pueden observarse varias semanas después de la aplicación, dependiendo de las condiciones de crecimiento de la maleza y la susceptibilidad. La maleza absorbe **Ally® 60 WG** a través de las raíces y el follaje resultando una inhibición del crecimiento, coloración rojiza-purpúrea, clorosis, necrosis, decoloración intervenal y muerte de la maleza. Los efectos iniciales se observan generalmente de 2 a 3 semanas seguidas de la aplicación; sin embargo los efectos finales en la maleza son evidentes de 4 a 6 semanas después de la aplicación. En los arbustos los efectos finales observados son todavía más lentos.

Usos no Agrícolas: Control de malezas en áreas no cultivadas. El herbicida urbano marca **Ally® 60 WG** se recomienda para el control de maleza dehoja ancha tanto anuales como perennes, y algunas malezas leñosas en áreas no cultivadas, áreas industriales tales como aeropuertos, instalaciones militares, instalaciones de bombeo, vías de tren, áreas de almacenaje entre otros.

Cuando se aplica en dosis bajas **Ally® 60 WG** provee controles de poca duración de las malezas enlistadas. El empleo de dosis altas incrementa la duración y el grado de control de la maleza. La combinación con otros herbicidas de uso urbano incrementa el espectro de control de maleza. Para obtener el objetivo de control total, es necesario usar dosis altas de **Ally® 60 WG** combinado con herbicidas de tipo residual.

Ally® 60 WG puede ser aplicado pre-emergente o post-emergente a la maleza, pero para mejores resultados aplíquelo en la post-emergencia de la maleza joven y en crecimiento activo (menos de 2 pulgadas de alta y de ancha) en cualquier momento del año exceptuando cuando esté helando. **Ally® 60 WG** debe ser usado durante la época de lluvias para tener la humedad requerida para mover el herbicida a la zona radicular de la maleza. Los tratamientos de pre-emergencia controlan a la maleza por absorción por las raíces, en cambio los tratamientos post-emergentes controlan a la maleza por absorción por las raíces y hojas. La dosis se basa en las especies de maleza, su tamaño y la textura de los suelos. Utilice las dosis más altas en plantas establecidas y en suelos de textura pesada y, las dosis bajas en maleza pequeña y suelos de textura arenosa.

Debido a que el grado y la duración de control varían de acuerdo a la cantidad del herbicida aplicado, la textura, pH y el contenido de materia orgánica del suelo; tamaño de maleza, lluvia y otras condiciones; se sugiere que si va a aplicarlo por primera vez, se haga en un área pequeña.

Para aplicaciones de cobertura total aplique **Ally® 60 WG** con un mínimo de 100 L de agua por ha; volúmenes de 200 a 400 L de agua y presiones de 25 a 35 psi son sugeridos, además del uso de las boquillas de gota grande.

ALMXU1181B / A01830807

Utilice las siguientes dosis de **Ally® 60 WG** (incluyendo 0.25 a 0.5 % v/v de surfactante) para controlar las siguientes malezas:

Nombre común	Nombre científico	Dosis (g/ha)
Aster Ortiga muerta Mastuerzo Bledos Borraja Hierba del caballo Mostaza Moco de guajolote Abrojo Llantén Achicoria Quelites Trébol Agujitas Cadillo Trébol dulce Hierba pajarera Epazote Buenvarón Jaramago gigante Gordolobo Acedera Verdolaga Vara de oro Colleja Vallico Vallico de vaca Diente de león Hierba peluda Bolsa de pastor	*Aster* spp. *Lamium amplexicaule* *Cardamine* spp. *Chenopodium* spp. *Sonchus oleraceus* *Conyza canadensis* *Brassica* spp. *Polygonum pensylvanicum* *Diodia* spp. *Plantago major* *Cichorium intybus* *Amaranthus* spp. *Trifolium pratense* *Erodium cicutarium* *Xanthium* spp. *Melilotus* spp. *Stellaria media* *Descurainia pinnata* *Senecio vulgaris* *Sisymbrium altissimum* *Verbascum thapsus* *Oxalis* spp. *Portulaca oleracea* *Solidago* spp. *Silene conica* *Agrostemma githago* *Vaccaria segetalis* *Taraxacum officinale* *Descurainia sophia* *Thlaspi arvense*	25 a 50
Frambueso Llantén menor Cardo blanco Lengua de vaca Girasol Lengua de pájaro Escobilla Hierba de pollo Mastuerzo	*Rubus* spp. *Plantago lanceolata* *Circium arvense* *Rumex crispus* *Helianthus* spp. *Polygonum aviculare* *Sida accuta* *Commelina diffusa* *Lepidium* spp.	50 a 75
Cardo del toro Correhuela Espuela Acacia	*Cirsium vulgare* *Convolvulus arvensis* *Delphinium* spp. *Acacia cornigera*	75 a 100
Pueraria	*Pueraria lobatorem*	210 a 280

Control de arbustos: Las aplicaciones foliares deben hacerse cuando el arbusto esté completamente lleno de hojas. La efectividad puede ser reducida si la lluvia ocurre 24 hrs. después de la aplicación.

Aplicaciones terrestres con altos volúmenes de agua: Aplique hasta cubrir por completo el arbusto usando dosis de más de 3000 L de agua por hectárea aunque depende de las especies arbustivas, altura, densidad de crecimiento y el tipo de aspersión usado. En arbustos altos, densos, es frecuentemente necesario asperjar por ambos lados para obtener una cobertura adecuada. Utilice las siguientes cantidades de **Ally® 60 WG** por cada 1000 L de agua (incluye una dosis de 1 L de surfactante / cada 1000 L de agua).

Nombre común	Nombre científico	Dosis (g/ha)
Fresno Alamo Frambueso Cerezo Olmo Tejocote Zarzamora Sauce Zarza	*Fraxinus* spp. *Populus* spp. *Rubus* spp. *Prunus serotina* *Ulmus* spp. *Crataegus* spp. *Rubus spectabilis* *Salix* spp. *Mimosa albida*	50 a 75
Sauco Roble Arce rojo Alamo	*Sombucus* spp. *Quercus* spp. *Acer rubrum* *Populus* spp.	76 a 60

Para ampliar el espectro de control, **Ally® 60 WG** puede ser mezclado en el tanque con productos registrados para uso urbano.

Aplicaciones terrestres con bajos volúmenes de agua: Aplicar de 75 a 225 g /ha de **Ally® 60 WG** en 250 a 450 L de agua. A esta mezcla se le agrega 0.25 % v/v de surfactante para el control de fresnos, cerezos, olmos, y otros arbustos.

Preparación de la aspersión: Llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con el agitador en movimiento, adicione la cantidad de **Ally® 60 WG** necesaria, finalmente llene con la cantidad de agua necesaria el tanque de la aspersora. Se requiere la agitación constante para mantener el producto en suspensión. Para las aplicaciones post-emergentes se requiere de un surfactante con al menos 80% de ingrediente activo para mejorar la actividad de mojado y de contacto.

Para minimizar la deriva se debe agregar un agente anti-deriva de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. Las preparaciones de **Ally® 60 WG** pueden degradarse en soluciones ácidas con pH por debajo de 7 si no se usa en las 24 horas siguientes a su preparación. Son estables en antes de usarlo. Las mezclas de tanque con otros herbicidas deben ser evaluadas para su compatibilidad. Después de la agitación inicial no exceda el movimiento en las próximas agitaciones ya que puede ocasionar un exceso de espuma. Para evitar esto, use un agente antiespumante.

Tiempo de re-entrada a las zonas tratadas: No entre o permita que otras personas entren al área tratada sin el equipo de protección adecuado hasta que la aspersión esté completamente seca (consulte el apartado de "Equipo de Protección" en esta etiqueta).

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado del equipo de aspersión antes y después de usar el producto, los residuos de este producto en la aspersora, pueden causar daños a otros cultivos.

Prelavado del equipo de aplicación: Asegúrese que el equipo de aplicación esté limpio y libre de residuos de otros plaquicidas antes de usar **Ally® 60 WG.**
1. Enjuague bien el tanque de la aspersora, las mangueras y puntas pulverizadoras con agua limpia.
2. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y agregue un litro de amonia de uso casero por cada 100 L de agua de capacidad del tanque. Llene el tanque totalmente con agua. Haga circular esta solución por las mangueras y puntas pulverizadoras por un mínimo de 15 minutos.
3. Enjuague bien el tanque de la aspersora, el aguilón, puntas pulverizadoras y mangueras con agua limpia.
   Mezcla: Llene el tanque de la aspersora a la mitad con agua limpia. Haga una pre-mezcla de **Ally® 60 WG** con la cantidad necesaria para obtener una mezcla uniforme y libre de grumos.

Agregue esta pre-mezcla al tanque y agite la solución con un agitador mecánico (nunca directamente con las manos). Termine de llenar el depósito con agua sin dejar de agitar la suspensión. Al final agregue un surfactante no iónico a la mezcla.

Lavado del equipo de aplicación: Después de hacer aspersiones de **Ally® 60 WG** y antes de hacer otras aplicaciones con el mismo equipo, se recomienda:
1. Vacíe el tanque y enjuáguelo con agua limpia a presión junto con las mangueras y puntas pulverizadoras por un mínimo de 5 minutos.
2. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y agregue un litro de amonia de uso casero por cada 100 L de agua de capacidad del tanque. Llene el tanque totalmente con agua. Haga circular esta solución por las mangueras y puntas pulverizadoras por un mínimo de 15 minutos.
3. Lave las boquillas y filtros por separado en una solución igual a la usada para lavar el tanque. Después deberá enjuagarlas profusamente con agua limpia.
4. Repita los pasos 1 al 3.
5. Vacíe el tanque y enjuáguelo perfectamente con agua limpia por un mínimo de 5 minutos, eliminando el agua a través de las mangueras y puntas pulverizadoras.
6. Elimine la solución de limpieza en forma apropiada y en áreas libres de todo cultivo.

NOTA: Durante temporadas en que el equipo de aplicación se use para varias jornadas de aplicación del producto, al final de cada jornada se recomienda enjuagar el tanque con agua limpia; después, llenarlo parcialmente y hacer circular el agua por el aguilón, las mangueras y las puntas pulverizadoras.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar sobre ningún cuerpo de agua incluyendo riachuelos, pozos de agua y agua de riego. No aplicar durante periodos de intensa lluvia o cuando haya saturación en los suelos. No permita que la deriva de la aplicación entre en contacto con cultivos adyacentes. No aplique este producto a través de ningún sistema de riego. No utilice el equipo después de haber hecho aplicaciones con **Ally® 60 WG.** Siga las instrucciones de lavado antes de hacer aplicaciones en cultivos agrícolas. No utilice **Ally® 60 WG** en suelos de zonas de temporal que sean alcalinos o calcáreos (con un pH > 7.9).

220mm

ETIQUETA DE MUESTRA