

FICHA TÉCNICA



Fecha de elaboración:	23.07.2018	Fecha de actualización:	23.07.2018
Elaboró	GDIEI	Revisó	GDIEI
Identificación de la empresa:	Bayer de México S.A. de C.V. Unidad de Negocio Environmental Science Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México		
Teléfonos de emergencia:	Bayer de México: (55) 5713 7011 Seguridad Industrial, Planta Santa Clara: (55) 5699 14 82 SINTOX: (55) 5598 6659 Lada sin costo: 01 800 009 2800		
MAXFORCE PRIME®			
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”		% en peso	
Ingrediente activo:			
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-Piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina: (Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg)		2.15	
Ingredientes inertes:			
Cebo, amortiguadores, espesantes, emulsificantes, anticongelante, conservadores, dispersante, amargante, antiespumante, disolventes, humectante.		97.85	
TOTAL		100.00	
RSCO-INAC-199-0174-382-2.15			
Titular del registro: Bayer de México, S.A. de C.V. Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540 Tel.: 01 (55) 5713 2001 “HECHO EN FRANCIA” © Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5		Importado y distribuido por: Bayer de México, S.A. de C.V Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Granada. C.P. 11520, Ciudad de México. Lada sin costo 01-800-229-37-27 servicioalcliente.crop@bayer.com www.saludambiental.com.mx	
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”			
“PRIMEROS AUXILIOS”			
Consejo general: retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y trasportar al afectado en posición lateral estable. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos cuidadosamente con agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consúltese al médico inmediatamente.			
“RECOMENDACIONES AL MEDICO”			
Insecticida del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. Antídoto: no existe antídoto específico. Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado, así como laxantes salinos.			
URGENCIAS			
En caso de intoxicación por nuestros productos, llame al Servicio de Información Toxicológica (SINTOX), servicio las 24 horas, los 365 días del año: ÁREA METROPOLITANA: 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01-800-0092800.			
GARANTIA			
Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.			
“INSTRUCCIONES DE USO”			
Maxforce Prime® a base de imidacloprid, es un cebo cucarachicida listo para usarse, con alto grado de aceptación por las cucarachas. Recomendado en esquemas de manejo integrado de cucarachas y con gran eficacia aún en cepas resistentes a grupos químicos convencionales.			

FICHA TÉCNICA



PLAGAS		RECOMENDACIONES
CUCARACHAS		
Nombre común	Nombre científico	
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>	Según el grado de infestación, aplicar de 1 a 3 gotas de gel por m ² o metro lineal. (Una gota de gel de 5 mm de diámetro equivale aproximadamente a 0.1 g de producto).
Cucaracha oriental o cucarachón	<i>Blatta orientalis</i>	
Cucaracha americana o de alcantarilla	<i>Periplaneta americana</i>	
Cucaracha de banda café o de los circuitos	<i>Supella longipalpa</i>	Previa inspección minuciosa, aplíquese en esquinas, rincones, cerca de grietas y hendiduras y bajo muebles donde habitan y transitan las cucarachas.
Cucaracha australiana	<i>Periplaneta australasiae</i>	Verifique el consumo y estado del cebo y reemplace el cebo deteriorado.
Cucaracha ahumada	<i>Periplaneta fuliginosa</i>	
Cucaracha de Surinam	<i>Pycnoscelus</i> spp.	Continúe la aplicación hasta la desaparición de los signos de infestación.
Cucaracha gigante	<i>Blaberus</i> spp.	Se recomienda aplicar tratamiento de mantenimiento para evitar reinfestaciones.
Cucarachas de la madera	<i>Parcoblatta</i> spp.	

Elimínense los factores que favorecen la presencia de cucarachas: basura, alimento y agua. Realícese previamente la limpieza del área a tratar.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS

En virtud del tipo de aplicación focalizado el reingreso es inmediato.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Utilice **Maxforce Prime**® en áreas urbanas, tales como: casas-habitación (incluyendo cocinas); edificios públicos: hospitales, hoteles, oficinas, escuelas, iglesias, cines, teatros; lugares donde se manejen alimentos: plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, bodegas, mataderos; y en general todos aquellos lugares donde las cucarachas habitan y se desarrollan las cucarachas: grietas y esquinas de paredes, marcos de ventana, rincones, cerca de grietas y hendiduras, bajo muebles, debajo y atrás de equipos eléctricos y electrónicos.

CONTRAINDICACIONES

Maxforce Prime® es un producto listo para su uso. No se mezcle con otros plaguicidas. No asperjar plaguicida sobre el cebo ya colocado.

©Marca Registrada por Bayer Group