

“APLICACIÓN URBANA”



bendiocarb INSECTICIDA, polvo humectante, carbamato

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| Ingrediente activo: | % en peso |
|---|--------------|
| Bendiocarb: 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbamato. (Equivalente a 800 g de i.a./Kg) | 80.0 |
| Ingredientes inertes: Dispersante, humectante y portador. | 20.0 |
| TOTAL | 100.0 |

RSCO-URB-INAC-166-309-002-80

Contenido neto: 12 g



Tóxico en caso de ingestión

No. de lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación

Títular del registro, importador y distribuidor:

2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V.

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 259, Granada, 11520, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. <https://www.envu.com.mx/>



“HECHO EN ESPAÑA” “ENVASADO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

PELIGRO



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo y aplicación de **Ficam® W** utilice el equipo de protección personal adecuado: overol de algodón de manga larga; pantalón, guantes y botas de caucho; mascarilla contra polvo; protección para cara y ojos (gafas o lentes de seguridad resistentes a químicos). Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Al terminar los labores diarios, bañese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa y calzados utilizados deberán destinarse a este uso único y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Manténgase el producto alejado del fuego y el calor. Evite la inhalación directa del producto. Manténgase el lugar de trabajo bien ventilado para evitar la aspersión del producto.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.” • “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.” • “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.” • “LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.” • “NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.” • “NO ALMACENAR EN OVAS HERMÉTICAS.” • “NO DESTAPE LAS BOLSILLAS CON LA BOCA.” • “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.” • “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.” • “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA.” • “NO SE INGIERA, NUNCA.” • “EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS.” • “PEL.”

• “EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.”

“PRIMEROS AUXILIOS”

Manténgase el paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Inscripción carnal: **Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel: causa**

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”, **INFORMACIÓN GENERAL**
Ficam® W es un insecticida del grupo de los carbamatos, posee buen efecto inicial y residual, que actúa por contacto e ingestión sobre las plagas de insectos y arácnidos aquí indicados. Aplíquese con cualquier aspersor convencional. Asegúrese de que el equipo se encuentre limpio y en buen estado.

| Nombre común | Nombre científico | PLAGAS | Dosis |
|--------------|--|--------|---|
| MOSQUITOS | <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia</i> spp., <i>Stomoxys calcitrans</i> | | Diluir 12 g de Ficam® W en 5 L de agua |
| MOSQUITOS | Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp. | | |
| CUCARACHAS | <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> | | |
| HORMIGAS | <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis</i> spp., <i>Monomorium pharaonis</i> | | |
| CHINCHES | <i>Cimex lectularius</i> | | |
| PULGAS | <i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> | | |
| GRILOS | <i>Acheta domestica</i> | | |
| ARAÑAS | <i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa</i> spp. | | |
| ALACRANES | <i>Centruroides</i> spp., <i>Velipis</i> spp. | | |

Dosis especial para el control de plagas en situaciones extremas como: infestaciones altas y condiciones poco higiénicas o donde se requiere un largo periodo de control (de hasta 60 días), así como para superficies altamente porosas y absorbentes como adobe, bagareque, palma o bardas de piedra.

| | | |
|------------|--|---|
| CUCARACHAS | <i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> | Diluir 24 g de Ficam® W en 5 L de agua |
| HORMIGAS | <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis</i> spp., <i>Monomorium pharaonis</i> | |
| CHINCHES | <i>Cimex lectularius</i> | |
| PULGAS | <i>Pulex irritans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> | |
| GRILOS | <i>Acheta domestica</i> | |
| ARAÑAS | <i>Latrodectus mactans</i> , <i>Lycosa</i> spp. | |
| ALACRANES | <i>Centruroides</i> spp., <i>Velipis</i> spp. | |

inhalación de la piel: **por contacto con los ojos** causa irritación de los ojos y **por inhalación** causa irritación de las membranas mucosas, **por ingestión** causa salivación y fibrilación. Los signos y síntomas por irritación ocular, visión borrosa, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración profusa, salivación, diarrea, espasmos musculares y alabes. **Tratamiento:** se recomienda el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Adminístrese tratamiento sintomático y suflido de atropina como antídoto, por vía endovenosa o intramuscular hasta lograr la anticonvulsión del paciente. Evite el cepillado para ser útil para controlar las convulsiones. **Antídoto:** suflido de atropina.

“URGENCIAS”

En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año), Teléfonos **(55) 538-6659 (65) 5611-2634; LADA SIN COSTO 800 000 0000**

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

• “Cualquier manejo del producto, evita la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no hacerlo o verterlo en ellos resulta de plaguicidas o venenos volátiles.” • “Mantenga el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en el Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y el Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.” • “El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejar cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).” • “En caso de cada accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogido en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.” • “Este producto es altamente tóxico para animales (peces, aves, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).” • “Este producto es altamente tóxico para abejas. No aplique cuando el cultivo o las miezcas están en flor y controla las abejas se encuentran blandas.” • “**GARANTÍA**”

2022 Environmental Science S. de R.L. de C.V. (Envu México) garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Envu de su localidad.

Rendimiento: la mezcla preparada rinde para 100 m² de superficie en banda o directamente en grates y rindes.

Preparación de la mezcla y método de aplicación

Determine la superficie del área a tratar para calcular la cantidad de mezcla a preparar. **Ficam® W** se puede aplicar con cualquier aspersor convencional. Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua, iniciar la aplicación y agregar la dosis indicada de **Ficam® W** al tanque. Continuar con la aplicación y adicionar la cantidad restante de agua para lograr la concentración deseada. Mantener la mezcla en constante agitación para asegurar una aplicación uniforme. Antes de cada tratamiento, se deberá preparar nuevamente la mezcla.

Ficam® W debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agítelo bien hasta lograr una suspensión homogénea. **Ficam® W** deberá aplicarse en lugares frecuentados por las plagas, en sus refugios y áreas por las que transitan.

Frecuencia de aplicación: el intervalo de aplicación depende del grado de infestación, se recomienda una aplicación cada 30 a 80 días.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: se deberá esperar 30 minutos posteriores tras la aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar en contra del viento.

FRONT

BACK