

FICHA TÉCNICA

Fecha de elaboración:	05.04.2024	Fecha de actualización:	05.04.2024
Elaboró	T. SÁNCHEZ	Revisó	T. GONZÁLEZ
Identificación de la empresa:	2022 Environmental Science S. de R. L. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 259 Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México		
Teléfonos de emergencia:	Local: +52 55 8524 4930 Emergencias 24 horas (global): 800 681 9531 SINTOX: (55) 5598 6659 Lada sin costo: 800 009 2800		
RODILON® MINIBLOQUE			
Difetialona: 3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il) -1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxi-1-benzoti-in-2-ona. (Equivalente a 0.025 g de i.a/Kg)	00.0025		
Ingredientes inertes: Cebos, aglutinante, saborizantes artificiales, conservadores, antioxidante, colorante y amargante	99.9975		
TOTAL	100.0000		
RSCO-RODE-0516-305-418-0.0025			
Titular del registro: 2022 Environmental Science S. de R. L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Granada. C.P. 11520, Ciudad de México. 1-800-331-2867 "HECHO EN E.U.A." RFC: DMV210819NP6	Importado y distribuido por: 2022 Environmental Science S. de R. L. de C.V. Oficinas: Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Granada. C.P. 11520, Ciudad de México. 1-800-331-2867		
"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"			
"PRIMEROS AUXILIOS" Manténgase al paciente abrigado y en reposo, llámese al médico. En caso de contacto con los ojos enjuáguese abundantemente con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión provóquese el vómito, siempre y cuando el paciente esté consciente, introduciéndole un dedo en la garganta. Alternativamente y a criterio médico se sugiere el lavado gástrico. Consúltese al médico inmediatamente.			
"RECOMENDACIONES AL MÉDICO" La difetialona es un rodenticida anticoagulante perteneciente al grupo de las hidroxibenzotipiranonas. Signos y síntomas de intoxicación: inapetencia, cansancio, apatía y vértigo. Aproximadamente 2 días después de la ingestión se presentan hemorragias mucocutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, epistaxis, hemoptisis, hematomas y manifestaciones purpúreas de la piel. Tratamiento y antídoto: adminístrese vitamina K1 (fitomenadiona) como antídoto específico por vía oral, intramuscular o endovenosa, tal como se indica para tratar sobredosis de bishidroxicumarina. Repítase el tratamiento cuando sea necesario, basándose en la observación del tiempo de protrombina. La dosis máxima de vitamina K1 es de 40 mg al día. De ser necesario, realícese transfusión sanguínea.			
Recomendaciones al Médico Veterinario: los signos en los animales intoxicados son similares a los del humano, se recomienda administrar vitamina K1 como antídoto a la dosis de 5 a 10 mg/ Kg SC u oral durante 3 semanas. En casos graves se recomienda transfusión sanguínea previa prueba cruzada de compatibilidad sanguínea.			
URGENCIAS En caso de intoxicación llamar al SINTOX (24 horas, 365 días del año). Teléfonos (55) 5598-6659 y (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 800 0092800.			
En caso de ingestión accidental por animales domésticos provóquese inmediatamente el vómito, llévase al animal con el Médico Veterinario y muéstrele esta etiqueta.			

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

2022 Environmental Science S. de R. L. de C.V. (Envu) garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. Consulte al distribuidor Envu de su localidad.

“INSTRUCCIONES DE USO”

RODILON® MINIBLOQUE es un rodenticida anticoagulante monodósico del grupo de los hidroxibenzotiopiranonas, eficaz contra las principales especies de roedores que dañan el cultivo de la caña de azúcar.

Utilícese de acuerdo con las recomendaciones que se dictan a continuación:

Cultivo	Plaga	Dosis (Kg/Ha)	Observaciones
Caña de azúcar (0)	Rata cañera o de campo: <i>Sigmodon hispidus</i> y <i>Sigmodon arizonae</i> Rata arrocera tropical: <i>Oryzomys couesi</i>	2.5	Para realizar aplicaciones convencionales: Colocar el producto perimetralmente a lo largo del área a tratar 5 metros hacia adentro del cultivo, distribuyendo la dosis recomendada en estaciones de cebado de 50 g de Rodilon® minibloque cada una.

Intervalo de seguridad (IS): 0 días, debido a que el producto no se aplica directamente al cultivo.

TIEMPO DE RE-ENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: Debido a que este producto es un rodenticida anticoagulante, presenta un amplio margen de seguridad para el humano, por lo que es posible reingresar a las áreas tratadas inmediatamente.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

RODILON® MINIBLOQUE es un producto listo para su uso. Se recomienda realizar dos tratamientos a lo largo del año: El primero durante los meses de marzo a mayo y el segundo entre agosto a octubre, periodos que corresponden a la mayor actividad reproductiva de estos roedores.

El cebo deberá colocarse en el interior del cultivo a 5 m aproximadamente del borde de las parcelas, en la base de la cepa de la caña.

Colocar el producto en estaciones de cebado a una dosis de 50 g de RODILON® MINIBLOQUE por estación (10 bloques por estación). Monitorear el consumo una vez por semana durante 3 a 4 semanas. El producto consumido deberá ser repuesto durante el monitoreo semanal con la finalidad de mantener constante la dosis durante este periodo. Es posible redistribuir el producto de los puntos de cebado donde no esté siendo consumido a aquellos donde haya mayor consumo.

Recoger y disponer adecuadamente de los roedores muertos y del producto no consumido.

Se recomienda utilizar este producto como parte de un Programa de Manejo Ecológico de las poblaciones de roedores en agroecosistemas cañeros.

CONTRAINDICACIONES

De acuerdo con la naturaleza del producto, este puede ser aplicado en cualquier etapa fenológica del cultivo de caña, independientemente de las condiciones ambientales y naturaleza del terreno.

INCOMPATIBILIDAD

RODILON® MINIBLOQUE es un cebo rodenticida listo para su uso por lo que no debe mezclarse con ningún otro tipo de producto, ya que el contacto con otros plaguicidas puede modificar el grado de aceptación o apetencia por parte de los roedores.

FICHA TÉCNICA

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

© Marca Registrada por Envu