



Maxforce[®]

PLATIN

PROFESSIONEEL GEBRUIK

30 g e


Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 1.026 % w/w (1% concentratie) clothianidine (CAS 210880-92-5)

INSECTICIDE

- ✓ Tegen papiervisjes en kakkerlakken
- ✓ Verbeterde voedingsmatrix



Toelatingsnummer Nederland: NL-0020305-0000
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen



WAARSCHUWING

MAXFORCE[®] PLATIN

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-isothiazool-3-on en 2-methyl-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, overeenkomstig de lokale voorschriften. ZIE STORL.

Toelatingshouder - distributeur:

Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1 - Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
(Tel: 0297-280413)

® trademark of Bayer Group

NL85827731A - ARTICLE 86736012

Chargenummer: zie verpakking

Houdbaarheidsdatum: zie verpakking (productiedatum + 2 jaar)



UN3082



Bayer



Maxforce[®]

PLATIN

✓ Tegen papiervisjes en kakkerlakken
✓ Verbeterde voedingsmatrix



Toelatingsnummer: NL-0020305-0000

Lokmiddel, klaar voor gebruik (RB) op basis van 1.026 % w/w (1% zuiver) clothianidine (CAS 210880-92-5)

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen

INSECTICIDE

PT18 –Gebruiksklare lokaasgel voor de bestrijding in gebouwen van kakkerlakken (nimfen en adulten) en papiervisjes.



WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-isothiazool-3-on en 2-methyl-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen :

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorst stof opruimen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, overeenkomstig de lokale voorschriften. ZIE STORL.

1. TOEGELATEN GEBRUIKEN

Gebruikstabel

Breng Maxforce Platin aan als druppels of dunne lijntjes op oppervlakken in de vastgestelde doelgebieden. Het kan worden aangebracht in hoeken, naden en kieren en verborgen ruimtes.

De dosis is aangepast aan de intensiteit van de plaag en de aangetroffen soort.

Maximaal 1 toepassing per maand.

Toepassingsgebied	Doelorganismen*	Dosering
Binnen: - Woonruimten; - Bedrijfsruimten; - Openbare gebouwen; - Kleinschalige dierenverblijven d.v.z. dierenruimten, dierenwinkels, kennels, diergeneeskundige praktijken, dierenverblijven van onderzoeksinstellingen enz. (alleen gebouwen, voedselverwerkende en opslagruimten, behalve stallen, dierenhokken en kooien waarin zich dieren bevinden).	Kleine soorten: Duitse kakkerlak (<i>Blattella germanica</i>)	Lage plaagomvang: 1 druppel** van 0,1 g per m ² of een lijntje ter grootte van 1 druppel Hoge plaagomvang: 2 druppels** van 0,1 g per m ² of een lijntje ter grootte van 2 druppels
	Grote soorten: Oosterse kakkerlak (<i>Blatta orientalis</i>) Amerikaanse kakkerlak (<i>Periplaneta americana</i>)	Lage plaagomvang: 2 druppels** van 0,1 g per m ² of een lijntje ter grootte van 2 druppels Hoge plaagomvang: 3 druppels** van 0,1 g per m ² of een lijntje ter grootte van 3 druppels
	Papiervisje (<i>Ctenolepisma longicaudatum</i>)	20 druppels met 3 mm diameter (≈ 0.007g) of 65 druppels met 2 mm diameter (≈ 0.002g) met name 0,1422 g/m ²

* Ontwikkelingsstadium: nimfen en adulten

** Een druppel = 0,1 g (ongeveer 7 mm diameter).

Minimale aanwezigheid van de lokaasgel voor een optimale werkzaamheid:

- Duitse kakkerlak: 2 weken
- Oosterse kakkerlak: 4 weken
- Amerikaanse kakkerlak: 12 weken
- Papiervisje: 8 weken

Indien de kakkerlakken of papiervisjes nog steeds zichtbaar zijn, kan na één maand opnieuw product worden aangebracht.

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksvoorschrift

- Maxforce Platin wordt aangebracht met behulp van een geschikt gelpistool. Wanneer de behandeling voltooid is, verwijdert u het lege patroon en voert u die veilig af. Indien de patroon slechts gedeeltelijk is gebruikt: verwijder deze uit het gelpistool, sluit met de meegeleverde sluitdop en bewaar volgens de aanwijzingen.
- Vóór de behandeling moeten professionele gebruikers het te behandelen gebied inspecteren om de vindplaatsen van kakkerlak- en papiervisjesplagen te identificeren, bijv. met behulp van vallen en/of uitdrijvende aerosols, door op zoek te gaan naar uitwerpselen, vervellingshuiden en ei-omhulsels, enz.
- Voor een maximale doeltreffendheid moet Maxforce Platin in en rond de schuilplaatsen van de kakkerlakken worden geplaatst en, indien mogelijk, tussen deze gebieden en voedselbronnen.
- Daarnaast dienen voor een optimale doeltreffendheid alle natuurlijke voedselbronnen, die aantrekkelijk zijn voor kakkerlakken, te worden verwijderd uit het aangetaste gebied, om de inname van het lokaas te bevorderen.
- Maxforce Platin dient als plaatselijke behandeling te worden gebruikt in de buurt van hoeken, naden en kieren (bijv. achter of onder apparaten en meubilair zoals keukenbladen, koelkasten, fornuizen, gootstenen, baden enz.), lege ruimtes, servicekanalen, liftschachten, leidingen,
- Maxforce Platin is vooral waardevol in gevoelige zones waar het gebruik van traditionele insecticideformuleringen beperkt is, d.w.z. in de buurt van elektrische of elektronische apparatuur, enz. Waar migratie van kakkerlakken is geïdentificeerd, zal het plaatsen van extra lokaas in de gebieden rond de plaats de bestrijding helpen.
- Breng het product direct aan in druppels of in dunne lijntjes op oppervlakken in de geïdentificeerde doelgebieden.
- Het biocide moet uit het zicht worden geplaatst en op plaatsen waar de lichtintensiteit laag is.
- Plaats de lokaasdruppels op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen of huisdieren.
- Vermijd aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen.
- Niet aanbrengen op plaatsen die nat worden gereinigd.
- Niet aanbrengen op plaatsen die recent werden behandeld met andere insecticiden en besmet het lokaas niet met andere insecticiden.
- Het effect op de kakkerlakpopulatie kan heel snel worden verwacht met dode kakkerlakken binnen 24 uur na de behandeling. Maximale bestrijdingsniveaus worden bereikt tussen zes dagen en 2 maanden na de behandeling, afhankelijk van het besmettingsniveau en hoelang de gel aanwezig is. Indien de graad van besmetting erg hoog is, controleert u de plaatsen waar het biocide is aangebracht regelmatig (één keer per maand) en brengt u waar nodig nieuw product aan. Echter niet vaker dan één keer per maand aanbrengen.
- Voor gebruik tegen papiervisjes: breng veel kleine druppels aan in zones waar papiervisjes zich verbergen en leven. Deze zones kunnen zich bevinden onder/ achter plinten, onder houten bekleding of op andere plaatsen die afscherming bieden.
- Niet voor permanent gebruik.
- Niet aanbrengen in hokken en kooien van dieren.
- Oud lokaas-/geldruppels moeten door een professionele ongediertebestrijder worden verwijderd.

- Maxforce Platin kan vlekken maken op bepaalde gevoelige materialen, zoals textiel. Indien u twijfelt, het product eerst aanbrengen op een kleine, onopvallende plaats.

LEES ALLE VOORZORGSMATREGELEN VÓÓR GEBRUIK

BRENG DE TOELATINGSHOUDER OP DE HOOGTE ALS DE BEHANDELING NIET WERKT

NIET AANBRENGEN OP ABSORBERENDE OPPERVAKKEN

LOKAASDRUPPELS NIET BLOOTSTELLEN AAN ZONLICHT OF WARMTEBRONNEN
BESCHERM TEGEN REGEN

Risicobeperkende maatregelen

- Vermijd aanbrengen van het product op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen. Alleen aanbrengen op plaatsen die niet nat worden gereinigd. Let vooral op naden en kieren en andere openingen die gewoonlijk door insecten worden gebruikt en ook op plaatsen achter of onder machines, keuken- en badkamerinrichting of leidingen. Het product kan in lege ruimtes, servicekanalen, liftschachten, elektrische en elektronische apparatuur, enz. worden geplaatst.
- Niet bedoeld voor gebruik in stallen, hokken of kooien voor dieren. Niet aanbevolen voor gebruik in voorzieningen voor insectenetende vogels en reptielen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Draag geschikte veiligheidshandschoenen bij het gebruik van het product.
- Vermijd contact met de huid.
- Was handen en blootgestelde huid vóór de maaltijd en na gebruik.
- Niet aanbrengen op oppervlakken waarop voedsel of voer wordt bewaard, bereid of gegeten.
- Alleen toepassen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren.
- Probeer de patronen niet te openen of hervullen.

Resistentiebeheer

Vermijd de mogelijke ontwikkeling van resistentie met de volgende beheersmaatregelen (maar deze dienen hiertoe niet beperkt te zijn):

- Goede hygiëneprocedures en alle andere maatregelen die de ontwikkeling van besmettingen voorkomen (d.w.z. niet-chemische maatregelen), moeten worden ingesteld.
- Producten moeten altijd worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen op het etiket over de te gebruiken dosis en behandelingsintervallen. De werkzame dosis moet worden aangehouden en mag niet worden verhoogd of verlaagd.
- Behandelingen dienen te worden afgewisseld met producten met verschillende werkingsmechanismen, d.w.z. vermijd afwisseling van verschillende neoncotinoiden. Het is raadzaam om het exclusieve en continue gebruik van Maxforce® Platin te vermijden als het enige product om kakkerlakken te bestrijden. Maxforce® Platin dient te worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd bestrijdingsplan dat gelformuleringen bevat met andere voedselbasissen en producten van andere chemische klassen met andere toepassingsmethoden.
- Werkzaamheidsniveaus moeten worden gemonitord (periodieke controles) en voorvallen van verminderde doeltreffendheid moeten worden onderzocht op mogelijk bewijs van resistentie, waarbij dient te worden opgemerkt dat sanitaire omstandigheden en de nabijheid van onbehandelde toevluchtslocaties kunnen bijdragen tot het risico op hernieuwde besmetting.

In gevallen waarin de op het etiket vermelde doseringen, correct gebruikt, er niet in slagen om het verwachte niveau van bestrijding te bieden en er resistentie is aangetoond, dient het gebruik van elk product met hetzelfde werkingsmechanisme, in het bijzonder neoncotinoiden, te worden vermeden.

- Indien tekenen van resistentie optreden (zoals aangegeven door mislukte bestrijding of door de testprocedure), dan dienen kosten noch moeite worden gespaard om de plaagpopulatie uit te roeien. De nodige maatregelen voor uitroeiing variëren in verschillende situaties en kunnen een aantal procedures omvatten die zowel chemische als niet-chemische maatregelen gebruiken.

3. OVERIGE AANWIJZINGEN

Instructies voor eerste hulp:

Algemeen advies: Indien aanzienlijke hoeveelheden worden gemorst, geldt het volgende advies. Verlaat de gevarenszone. Plaats en vervoer slachtoffer in een stabiele positie (stabiele zijligging). Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en voor deze veilig af. Breng de betrokkene, indien nodig, naar een arts/ziekenhuis en neem de verpakking of het etiket mee indien mogelijk.

LAAT HET SLACHTOFFER NOOIT ALLEEN!

Contact met de huid: Was grondig met veel zeep en water, spoel daarna af met water. Indien huidirritatie of gevoeligheid van de huid optreedt, aanhoudt of verergert, vraag dan medisch advies.

Contact met de ogen: Spoel de ogen onmiddellijk met veel, lauw water. Controleer of er contactlenzen zijn en verwijder deze. Blijf minimaal 5 minuten spoelen. Als de symptomen aanhouden, vraag dan medisch advies.

Inslukken: Arts raadplegen die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum.. Spoel de mond met water. Breng het slachtoffer in de frisse lucht en laat hem/haar rusten in een positie waarin hij/zij gemakkelijk kan ademen. Als het product is ingeslikt en de blootgestelde persoon bij bewustzijn is, geef dan kleine hoeveelheden water om te drinken.

Advies voor medisch en verzorgende personeel: Geef symptomatische en ondersteunende behandeling.

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

- Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, overeenkomstig de lokale voorschriften.
- Ongewenste geldruppels kunnen, indien vers aangebracht, verwijderd worden met een spons en een natriumchlorideoplossing van 5%. Gebruikte sponzen/papieren zakdoekjes moeten als vast (huishoudelijk) afval worden afgevoerd.
- Oude geldruppels kunnen met spatels worden verwijderd en als vast (huishoudelijk) afval worden afgevoerd.

Voorwaarden voor opslag

Opslagvoorwaarden: vorstvrij bewaren; op een veilige plaats bewaren.

4. AANBEVELINGEN

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Toelatingshouder - distributeur:

Bayer CropScience SA-NV,

Energieweg 1

Postbus 231,

3640 AE Mijdrecht

(Tel: 0297-280413)

Web : www.environmentalscience.bayer.nl

© trademark of Bayer Group



UN3082

Chargenummer: zie verpakking
Houdbaarheidsdatum: zie verpakking
(productiedatum + 2 jaar)

NL86801515A - ARTICLE 86736012

Bayer