

Kontroller åtestedene én gang per uke.
 Unngå kontinuerlig bruk av produktet.
 Antall og tidspunkt for behandling:
 Maksimalt 1 dråpe (200 mg, diameter 1 cm) per kvadratmeter eller 1 dråpe (200 mg, diameter 1 cm) per løpemeter maursti.
 For behandling av reir brukes 2 g, som tilsvarer en halv tube eller 10 dråper, direkte i inngangen til reiret.

Bekjempelse av faraomaur:

For å oppnå et godt resultat i forhold til faraomaur bør behandlingsområdet undersøkes før en gitt behandling igangsettes. Dette gjøres ved å legge ut giftfri lokkemat (for eksempel svinelever eller proteinbasert lokkemat) helt til det har dannet seg et klart bilde av faraomaurens tilholdssteder.
 Faraomauren er kjent for å oppholde seg på steder med høy temperatur, ca. 27–30°C, og det vil ofte finnes flere reir som lever i sameksistens.
 Når faraomaurens utbredelsesområde er avdekket, startes behandlingen på de stedene der faraomauren er lokalisert, og rett ved reirene. Faraomaurenes reir er ofte veldig vanskelige å finne. De kan for eksempel være lokalisert bak kjøkkenbenker, i hulrom i vegger, under gulvpaneler og i elektriske installasjoner og apparater.
 I forbindelse med bekjempelse av faraomaur (og maur generelt) er det viktig at Maxforce® Quantum legges ut rett ved maurreiret slik at maurene bærer lokkematen med gift ned i reiret, og dermed bekjemper reiret innenfra med utryddelse av dronningen.

Bekjempelse av svart jordmaur:

For den svarte jordmauren legges det ut sirup i de revner og sprekker der maurene kommer inn i bygningen, og på stiene maurene bruker.

Maurreir på terrasser:

Finn maurenes inngang, og legg ut sirup i hvert inngangshull. Bruk 2 gram sirup per maurreir, og fordel denne mengden i alle inngangshullene til maurreiret.
 Sperrebelte langs husets sokkel:
 Dersom maurreiret ikke klart kan identifiseres på terrasser og lignende, kan Maxforce® Quantum brukes som et sperrebelte langs husets sokkel.
 En sirupsklatt på 200 mg legges ut per løpende meter i revner og sprekker der mauren kan tenkes å trenge inn.

Merk!

SKAL KUN BRUKES AV PROFESJONELLE.
 UNNGÅ OMFATTENDE FORURENSNING AV OVERALLER.

- Produktet påføres med en egnet gelapplikator.
- Når behandlingen er fullført, skal den tomme patronen fjernes og kastes på sikker måte.
- Hvis patronen bare er delvis brukt, skal den tas ut av applikatoren, forsegles med hetten som følger med og oppbevares som angitt.
- Lukk tuben etter bruk.
- Les alltid etiketten eller pakningsvedlegget før bruk, og følg de oppgitte instruksjonene.
- Informer godkjenningssinnehaveren hvis behandlingen ikke virker.
- Maxforce® Quantum inneholder et bitterstoff som motvirker inntak hos mennesker og husdyr.
- Behandlingen utføres utenfor rekkevidden til barn og husdyr. Behandlingen må ikke utføres på eller i nærheten av matvarer eller på steder der mat tilberedes.
- Maxforce® Quantum vil holde seg frisk og kontrollere maurene i opptil 12 uker etter utleggelsen.
- Det er viktig at det ikke ligger andre matvarer fremme til maurene mens behandlingen utføres.

- Det anbefales at det ikke behandles med andre midler på de stedene der det legges ut Maxforce® Quantum.
- Skal ikke brukes der mat, fôr eller vann kan bli forurensnet.
- Plasser åte utilgjengelig for barn og dyr.
- Vask hender og eksponert hud før måltider og etter bruk.
- Produktet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.
- Skal ikke brukes på jord eller plener eller i blomsterbed.
- Farlig for bier.
- Ved utendørs bruk skal dette insektmiddelet kun plasseres i sprekker eller direkte i maurens reir. Beskytt mot bier og vær ved å dekke til for eksempel med en blomsterpotte eller en keramikkflis. Påse at maurene fremdeles har tilgang til åtet. Skal ikke påføres på harde overflater eller bar jord der det finnes maurstier.
- Hvis angrepet ikke blir bekjempet, kan ny behandling være nødvendig.

Verneutstyr

Bruk CE-merkede (eller tilsvarende) nitrilgummihansker (minimumstykkelse 0,4 mm) og beskyttelsesbriller.

Førstehjelp

Generelt:
 Forlat det farlige området. Plasser og transporter den berørte i stabilt sideleie (liggende på siden).
 Fjern forurensede klær umiddelbart, og kast dem på en trygg måte.
 Hudkontakt:
 Fjern forurensede klær og sko. Vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt Giftinformasjonen hvis det forekommer symptomer. Søk legehjelp hvis irritasjonen øker eller vedvarer.
 Kontakt med øynene: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
 Merknader til legen: Behandles symptomatisk.

Overvåk: Respirasjons- og hjertefunksjoner.
 Svelging: Skyll munnen med vann. Kontakt GIFTINFORMASJONEN [+47 22 59 13 00]. Søk legehjelp straks hvis det forekommer symptomer og/eller store mengder er svelget. Ved redusert bevissthet skal personen legges i stabilt sideleie og legehjelp søkes straks. Ikke gi vedkommende væske, og ikke fremkall brekninger. Ha beholderen eller etiketten tilgjengelig.
 Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare vurderes de første 2 timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat anbefales alltid.
 Det finnes ingen spesifikk motgift.
 Ved KONTAKT MED GIFTINFORMASJONEN ELLER LEGE, HA EMBALLASJEN ELLER ETIKETTEN TILGJENGELIG.

Avfallshåndtering

Forurens ikke vann med produktet eller dets beholder.
 Produktet og dets beholder skal kastes på en sikker måte.
 Ubrukte og ikke-resirkulerbare produkter leveres til godkjent avfallsmottak.
 Kassering av dette produktet, oppløsninger og eventuelle biprodukter skal alltid oppfylle kravene i miljø- og avfallsbehandlingslovgivning og eventuelle krav fra lokale myndigheter.
 Unngå spredning av sølt materiale og avrenning, og unngå kontakt med jord, vannveier, avløp og kloakk.
 Beholderen skal ikke brukes på nytt.

Oppbevaring

Oppbevares i originalbeholderen og på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.
 Beskyttes mot frost. Beskyttes mot lys.
 Holdbart opptil 36 måneder.



Insektmiddel

☐ ✓ Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger. Midlet er også fundet effektivt til indendørs bekæmpelse af flere eksotiske myrearter bl.a. faraomyrer.

🇳🇴 ✓ Til bekjempelse av maur. Kun for profesjonell bruk.



Indhold :
 4 x 30 g e

envu



Myrer • Maur



⚠ ADVARSEL
 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamlles. Giftig for bier. Vask huden efter arbejde.
 Brugsanvisning: Læs først vedlagte brugsanvisning.
 Insektmiddel BPR-reg. nr. 1070-10 Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).
 Præparattype: Gel
 Aktivstof: Imidacloprid 0,3 g/kg (0,03 % w/w)
 ⚠ Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Samle opp spill. Unngå utslipp til miljøet.
 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.
 Farlig for bier.
 Bruksanvisning: Læs pakningsvedlæg før bruk.
 Godkjenningssnummer: NO-2018-0144
 Formuleringstype: Åte (klar til bruk)
 Virkestoff: Imidacloprid 0,3 g/kg (0,03 % w/w)
 UFI: A4S1-30VW-800R-H2ST

Produktionsdato/Batch nr : påtrykt emballagen
 Produktet er holdbart 3 år fra produktionsdato.
 Beskyttes mod frost.
 2022 Environmental Science FR S.A.S.
 1 place Giovanni Da Verrazzano
 69009 LYON
 Frankrike/Frankrig
 Tel: +45 80889560
 www.envu.com
 Envu, the Envu logo and Maxforce® are trademarks owned by Environmental Science U.S. LLC, or one of its affiliates.
 DKN81785198H
 5 701363 010419

 **Dansk**

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til erhvervsmæssig bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger. Midlet er også fundet effektivt til indendørs bekæmpelse af flere eksotiske myrearter bl.a. faraomyrer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Ved indendørs brug placeres produktet langs myrestier og i områder utilgængelige for børn og husdyr.

Ved udendørs brug må midlet kun anvendes i sprækker og revner eller direkte i myreboet langs beboelse.

Ved udendørs anvendelse skal midlet tildækkes f.eks. med en blomsterkrukke eller en flise for at forhindre, at bier kan komme i kontakt med midlet og for at beskytte midlet mod vejrforhold.

Må ikke bruges i eller omkring afløb.

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Brugsanvisning

Maxforce® Quantum applikeres let med "udlægningspistol", er lugtfri, farver ikke, og fremstår som en klar drypfri sirup, der kan placeres både vertikalt og horisontalt, alt efter hvor myrerne trænger ind og er et problem.

Maxforce® Quantum kan anvendes i fødevareindustrien, så som køkkener, slagterier, varehuse.

I offentlige og private bygninger, så som hospitaler, hoteller og lejlighedskomplekser.

Dosering:

Sirup-klatter med en diameter på 1 cm placeres, hvor myrerne færdes og kun på steder, der er utilgængelige for børn og andre dyr. Doseringen er 1 klat gel svarende til 200 mg produkt pr. løbende meter eller pr. m², eller maksimalt 10 klatter gel svarende til 2 g produkt pr. myrebo. I et køkken på 10 m² som ønskes behandlet udlægges der 10x200 mg sirup-klatter. Myrene bekæmpes i løbet af 14 dage, men det kan tage op til 2 måneder. Maxforce® Quantum er virksom i op til 12 uger.

Bekæmpelse af faraomyre:

For at opnå et godt resultat mod faraomyrerne bør behandlingsområdet først undersøges før en given behandling. Dette gøres ved der at der udlægges giftfri lokkemad (så som svinelever eller proteinbaseret lokkemad) indtil et klart billede er skabt over faraomyrernes tilholdssteder. Faraomyrerne er kendt for at opretholde sig tæt på steder med høj temperatur, ca. 27-30°C, og der vil oftest være flere bo der lever i sameksistens.

Efter lokalisering af faraomyrenes udbredelsesområde behandles der på de steder hvor faraomyrerne er lokaliseret, samt tæt på de myrebo der er lokaliseret. Faraomyrebo er ofte meget svære at finde, f.eks. bagved en køkkenbordsplade, inde i et hulrum i en væg, bagved gulvpaneler, inde i elektriske installationer og apparater. I henhold til bekæmpelse af faraomyrerne (og myre generelt) er det vigtigt at "Maxforce® Quantum" udlægges tæt ved myreboet, således myrerne får båret lokkemaden med gift ned i boet og boet dermed bliver bekæmpet indefra med udryddelse af dronningen.

Bekæmpelse af sort havemyre:

For den sorte havemyrer udlægges der i de revner og sprækker myrerne entrere bygningen, samt på de stier myrerne bruger. Udlæg en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter i områder med myre.

Myrebo på terrasser:

Find myrernes indgange og appliker sirup i hvert indgangshul. Der anvendes 2 gram sirup pr myrebo, og denne mængde fordeles i alle myreboets indgangshuller.

Spærrebælte på hussokler:

Såfremt myreboet ikke klart kan identificeres på terrasser o. lign. kan "Maxforce Quantum" anvendes som et spærrebælte på hussoklen. Der placeres en 200 mg sirup-klat pr. løbende meter, samt der behandles i de revner og sprækker hvor myrerne tænkes at trænge ind.

Bemærk!

- Maxforce® Quantum indeholder et bitterstof der modvirker indtagelse for mennesker og husdyr.
- Behandlingen udføres uden for rækkevidde for børn og husdyr.
- Der bør ikke behandles på eller nær fødevarer, eller hvor fødevare tilberedes.
- Maxforce® Quantum vil holde sig frisk og kontrollere myrerne i op til 12 uger efter udbringning.
- Luk altid tuben tæt efter anvendelse.
- Det er vigtigt, der ikke ligger andre fødeemner fremme for myrerne mens behandlingen udføres.
- Det anbefales at der ikke behandles med andre midler de steder der udlægges Maxforce® Quantum.

Værnemidler

Brug CE-mærkede nitrilgummihandsker (min. 0,4 mm) og beskyttelsesbriller.

Førstehjælp

Hudkontakt: Vask forurennet hud med vand og sæbe, skyl derefter med vand. Kontakt læge hvis der opstår vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Indtagelse: Skyl munden med vand. kontakt giftlinien. Kontakt læge hvis der opstår symptomer eller store mængder er indtaget. Giv ikke drikke til personer der ikke er ved bevidsthed.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyttes mod frost.

 **Norsk**

Norsk Bruksanvisning

Til profesjonell bekjempelse av maur

- Svart jordmaur, Argentinamaur
- Spøkelsesmaur og Faraomaur (kun innendørs bruk)

Maxforce® Quantum påføres enkelt ved hjelp av en "påførings pistol", er lugtfri, avgir ikke farge og fremstår som en klar og dryppfri sirup som kan påføres både vertikalt og horisontalt, alt etter hvor maurene trenger inn og er et problem. Plasser produktet beskyttet mot direkte sollys og varmekilder (skal f.eks. ikke plasseres under en radiator).

Ved innendørs bruk plasseres produktet langs maurstier.

Ved utendørs bruk skal Maxforce® Quantum plasseres i sprekker eller direkte i maurens reir. Beskytt mot bier og vær ved å dekke til for eksempel med en blomsterpotte eller en keramikkflis. Påse at maurene fremdeles har tilgang til åtet. Skal ikke påføres på harde overflater eller bar jord, plen eller i blomsterbed.

Ved bruk rundt bygninger skal produktet ikke legges i nærheten av avløp. Hvis området som behandles er knyttet til drenering av regnvann eller kloakk, må produktet bare brukes på steder som ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelse og vann fra rengjøring.

Maxforce® Quantum kan brukes i matvareindustrien, for eksempel i slakterier, varehus og kjøkkener. I offentlige og private bygninger, for eksempel på sykehus og hoteller og i leilighetskomplekser.

Dosering:

Leg ut en sirupsklatt - Maksimalt 1 dråpe (200 mg, diameter 1 cm) per m² eller per løpemeter maursti. Hvis for eksempel et kjøkken på 10 m² skal behandles, legges det ut 10 x 200 mg sirupsklatter.

Ved behandling av reir injiseres 2 g produkt direkte i inngangen til reiret.